

BWUR



PRIX-COURANT DES PLANTES  
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE,

[parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été,  
à décorer les parterres à l'air libre.

AMARYLLIDÉES, AROIDÉES, BÉGONIAS HERBACÉS, SEMI-LIGNEUX ET TUBÉREUX,

BROMÉLIACÉES, CACTÉES, CANNA, COLEUS, CYCADÉES, DAHLIA, ERYTHRINA,

FUCHSIA, FOUGÈRES, GERANIUM, GESNÉRIACÉES, HÉLIOTROPES,

LANTANA, GILLETTS, PELARGONIUM, PENSTEMON, SALVIA,

ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDA NUS,

PASSIFLORÉES, SCITAMINÉES, SARRACÉNIÉES, PLANTES CARNIVORES,

PLANTES UTILES, OFFICINALES, ETC.,

PLANTES NOUVELLES OU RARES,

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

**LOUIS VAN HOUTTE,**

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,  
à GAND (BELGIQUE).

✂ Nous informons les personnes à qui nous envoyons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

N. B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'Établissement,  
à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL et non à des INTERMÉDIAIRES.



# AVIS IMPORTANT.

## Conditions de vente et d'expédition.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins. Les personnes qui reçoivent nos Catalogues sont instamment priées de les conserver, spécialement ceux paginés 1 à.... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.

Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leur nom et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande, de bien indiquer la GARE où les marchandises doivent être rendues, la voie par laquelle ils désirent que l'expédition soit faite, AINSI QUE LE TARIF, GRANDE OU PETITE VITESSE. Ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieuse à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. A défaut de ce dernier renseignement, nous expédions par la voie qui nous paraît la plus avantageuse pour nos clients, soit par chemin de fer, soit par bateau, sans accepter aucune réclamation ultérieure, à ce sujet.

En cas de retard ou d'avaries, les réclamations devront être faites au chemin de fer ou au commissionnaire chargé de l'expédition, lesquels en demeurent seuls responsables.

Si nos clients croyaient devoir réclamer pour tout autre motif, ils sont priés de le faire aussitôt après l'arrivée du colis.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Établissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes en dessous de 5 francs.

L'affranchissement pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 CENTIMES ou son équivalent, et non de 15 centimes, comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

L'Établissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice produit par ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

## Colis Postaux. — Grande vitesse.

Les envois à prix réduit par COLIS POSTAUX ne dépassant pas 3 et 5 kilogr., POUR TOUS LES PAYS ÉTRANGERS avec lesquels la Belgique a des conventions, seront faits en port payé, et le montant en sera porté en compte :

Les Catalogues suivants, comprenant toutes les cultures de l'Établissement, sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande affranchie :

N° 223, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes, etc. ainsi que les graines à semer en Automne.

N° 224, comprenant les Azalea, Camellia, Rhododendron et autres Plantes de terre de Bruyère.

N° 225, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre, les Arbustes d'ornement, les Arbres fruitiers de tout genre, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, etc.

N° 226, comprenant les Graines en général, les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.



## CULTURES

DE

## LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.  
à GAND (Belgique).

## SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

## PLANTES NOUVELLES OU RARES.

	Fr. C.
<b>Abutilon Emperor</b> . . . . .	5 "
— <b>Lustrous</b> . . . . .	5 "
<b>Aglaonema pictum</b> . . . . .	3 à 50 "

Espèce naine, feuillage vert sombre velouté, ponctué de blanc.

<b>Alocasia Regina</b> . . . . .	25 à 75 "
----------------------------------	-----------

Plante magnifique, à feuilles coriaces, d'un vert foncé luisant à la page supérieure, d'un beau rouge pourpre en dessous, avec les nervures vertes et pubescentes. Les pédoncules glabres, vert-pâle, sont légèrement comprimés et tachetés de brun pourpre; les spathes, dont le tube est également tigré de pourpre, sont blanches et se détachent vigoureusement sur la couleur foncée de l'ensemble.

— <b>Sanderiana</b> . . . . .	20 à 40 "
-------------------------------	-----------

Superbe Aroïdée, remarquable par ses dimensions et par la beauté de son feuillage panaché. Les pétioles sont érigés et d'un vert brun; les jeunes feuilles sont d'un beau vert glacé, acquérant des reflets métalliques bleuâtres sur les feuilles plus âgées. Ces feuilles sont en forme de fer de lance et profondément denticelées, elles sont entièrement bordées de blanc pur ainsi que les nervures, qui, elles-mêmes, sont d'un blanc jaunâtre.

— <b>Van Houttei, belles plantes</b> . . . . .	10 à 100 "
--	------------

Sans contredit le plus beau de tous les *Alocasia*. Port imposant, feuilles énormes, cordiformes, atteignant jusqu'à 1m25 de longueur sur 80 centimètres de largeur, vert clair, nervures bordées de blanc argenté. Cette plante est un digne pendant de l'*Alocasia Thibautiana*, qu'il surpasse encore en vigueur.

<b>Amasonia punicea</b> . . . . .	10 "
-----------------------------------	------

Incontestablement un des arbustes florifères les plus beaux qui aient été introduits depuis bien des années. Originaire de la Guyane anglaise, il est d'un port érigé, avec des feuilles bordées de blanc étalées; celles-ci sont elliptiques, lancéolées, d'une longueur de 20 à 25 centimètres.

L'inflorescence très-brillante est surtout remarquable par une série de bractées violet-cramoisi, se développant par paires, comme celles du *Poinsettia*, tout le long des racèmes de 50 centimètres de longueur. Ces bractées, dont les inférieures ont 10 centimètres de long, sont très-persistantes et se tiennent parfaitement pendant au moins 2 mois. A la base de chaque bractée naissent des fleurs tubuleuses, pendantes, par 2 et par 5, d'une couleur blanc crème, offrant un contraste frappant avec le restant de l'inflorescence.

<b>Ananassa Cochinchinensis, fort</b> . . . . .	25 à 50 "
---	-----------

Superbe variété se distinguant de l'*A. Sativa* par le vert gai du fond et la panachure jaunâtre des feuilles. Les épines, au lieu d'avoir la couleur de la panachure, conservent la couleur rose qu'elles avaient sur les jeunes feuilles.

	Fr. C.
<b>Anthurium Andreanum carneum</b> . . . . .	15 "
— <b>Chantrieri</b> . . . . .	15 "
— <b>ferrierense</b> . . . . .	5 à 100 "

Les trois variétés nouvelles ci-dessus proviennent de l'*A. Andreanum* et de l'*A. ornatum*; elles sont très-robustes et très-florifères.

Les exemplaires mis en vente sont de force à fleurir.

— <b>Gustavi</b> . . . . .	40 à 500 "
----------------------------	------------

Magnifique espèce à grandes feuilles vertes et de croissance très-rapide.

— <b>leodiense</b> . . . . .	5 à 15 "
------------------------------	----------

Hybride remarquable issu du croisement de l'*A. Andreanum* avec l'*A. Veitchii*. Il a les feuilles longues de sa dernière avec une inflorescence dont les spathes grandes, ondulées, d'un rouge sang foncé, sont du plus bel effet.

— <b>Scherzerianum Rothschildianum</b> (FLORE, XXIII, 85) . . . . .	75 "
--	------

Charmante variété obtenue par M. Bergmann, à spathe blanche couverte de macules et de points d'un rouge cinabre du plus brillant effet, spadice jaune orangé.

— <b>Schmidtscheni</b> . . . . .	10 à 50 "
----------------------------------	-----------

— <b>Splendidum</b> . . . . .	10 à 25 "
-------------------------------	-----------

Espèce très-mignonne, à magnifique feuillage entièrement gaufré, très-distinguée.

— <b>Veitchii, très-fort</b> . . . . .	15 à 2000 "
--	-------------

Espèce de tout premier ordre, de grand effet, à feuilles excessivement allongées, atteignant 1m40 de longueur sur 50 centimètres de largeur, retombantes, très-coriaces, d'un vert foncé reflété d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.

— <b>Wallisii</b> . . . . .	10 à 25 "
-----------------------------	-----------

— <b>Waluwewi</b> . . . . .	25 "
-----------------------------	------

— <b>Warocqueanum</b> . . . . .	10 à 25 "
---------------------------------	-----------

*très-fort* . . . . . 150 à 300 "

Nouveauté de tout premier ordre, la plus belle des Aroïdées, les feuilles atteignant 1m20 de longueur sur plus de 45 centimètres de largeur; elles sont d'un très-riche vert velouté, contrastant avec les nervures médianes et secondaires, qui sont d'un vert plus pâle.

<b>Apelandra Louissæ</b> . . . . .	25 "
------------------------------------	------



Fr. C.

**Aphelandra Macedoana** . . . . . 20 "   
 Jolie espèce trapue gracieusement panachée de blanchâtre le long des nervures principales.

— **Margaritæ** . . . . . 3 "

Port trapu, tige et feuilles pubescentes, ces dernières elliptiques, roses à la pigne inférieure, vert métallique en dessus, avec des lignes blanches suivant les nervures latérales; fleurs orange vif accompagnées de bractées laciniées.

**Aristolochia elegans** . . . . . 5 "

— **Goldiciana** . . . . . 10 "

*Aristolochia* de serre très-rare, à feuilles cordiformes, fortement nervurées, ressemblant à celles de l'*A. Sypho* et donnant la plus belle fleur du genre.

**Begonia John Heal** . . . . . 6 "

— **Louise Closon** . . . . . 5 "

C'est certainement une des plus belles variétés du *B. rex*, obtenues jusqu'à ce jour, et de coloris tout à fait nouveau. La plante est robuste et se forme très-bien; les feuilles, de moyenne grandeur, ont le centre presque noir, entouré d'un disque composé de larges macules bullées d'un violet clair satiné à teintes argentées et changeantes, tandis que le bord extérieur est parsemé de points violets.

— **Mad. Joseph Bégosse** . . . . . 4 "

— **Hardy** . . . . . 4 "

— **Lionnet** . . . . . 4 "

— **Président Bourreuille** . . . . . 4 "

**Bignonia regalis** . . . . . 5 "

Très-belle plante grimpante de serre, à feuilles elliptiques, lancéolées, opposées, à très-grandes fleurs jaune et rouge, d'une beauté exceptionnelle.

**Cochlostema Jacobianum albolineatum, fort** . . . . . 20 à 100 "

Cette variété, gagnée dans l'Établissement L. Van Houtte, a des feuilles lignées de blanc; elle a obtenu le premier prix, comme plante nouvelle de semis, à l'exposition nationale de Bruxelles, en 1880.

**Cocos Yatai (vrai)** . . . . . 40 à 150 "

Digne rival du *C. Bonneti*, ce magnifique Palmier est parfaitement rustique dans le midi de la France, mais l'espèce vraie est très-rare. Les plantes que nous offrons au public sont arrivées directement du pays d'origine; elles sont bien rétablies, fortes et robustes; nous donnons force par correspondance.

**Corynocarpus lævigatus aureo marginatus** . . . . . 15 "

**Costus mosaïcus** . . . . . 3 "

Feuilles lancéolées de 6 à 8 cent. de longueur, arrangées en spirale le long des tiges charnues, au centre se trouve une bande irrégulière vert foncé, tandis que le reste de la feuille est occupé par une mosaïque argentée. Originaire du Congo.

**Croton Empereur Alexandre III** . . . . . 15 "

— **Eugène Chantrier** . . . . . 15 "

**Cypripedium ananthum** . . . . . 60 à 100 "

— **superbum** . . . . . 150 "

Un des *Cypripedium hybrides* les plus remarquables.

Les fleurs ont grandes et comme vernissées, le sépale dorsal d'un rouge foncé est couvert de larges stries formées de macules d'un noir pourpre, devenant d'un beau mauve pourpre en entrant dans la large zone blanche servant de bordure; le sépale inférieur est verdâtre strié à demi, en partant de la base, de points noirâtres.

Les pétales sont d'un rouge vineux avec des stries plus foncées, sauf à la base et à la pointe où ils sont vert pâle. Le labelle est d'un rouge vineux foncé ombré de brun et le staminode jaune d'or teinté de rouge.

— **albo purpureum** . . . . . 100 "

— **album** . . . . . 100 "

— **amandum** . . . . . 200 "

— **amesianum** . . . . . 175 "

— **Arthurianum** . . . . . 200 "

Les fleurs ont l'apparence du *C. insigné*, mais à pétales recourbés et veinés de carmin foncé.

Fr. C.

**Cypripedium Augusti Regnieri** 25 à 50 "

— **Bartetii** . . . . . 200 "

— **cardinale** . . . . . 225 "

Hybride de *C. Sedeni* et de *C. Schlimii albiflorum*.

Le sépale dorsal est d'un blanc d'ivoire parfois teinté de rose pâle, les pétales sont blancs teintés de rose pâle à la base et sur les bords. Le labelle qui se rapproche de celui du *C. Schlimii* est d'un rose carmin foncé et les bords en ourlet sont alternativement striés de rose et de blanc.

— **concolor chlorophyllum** . . . . . 140 "

— **euryandrum (FLORE, XXII, 19)** . . . . . 75 "

Très-grande fleur à labelle lilas pourpre, à sépales blanchâtres lignés et tachetés de pourpre noirâtre.

— **expansum** . . . . . 200 "

— **gemmaferum** . . . . . 250 "

— **Godefroyæ, vrai** . . . . . 50 "

Variété nouvelle, proche parente des beaux *Cypripedium niveum* et *concolor*, desquels elle se distingue par son feuillage et par les remarquables mouchetures de ses fleurs blanches, recouvertes dans toutes les parties d'un pointillé magenta.

— **Harryanum vivicans** . . . . . 200 "

— **javanicum majus** . . . . . 50 à 75 "

— **Leeanum** . . . . . 75 à 150 "

Hybride du *C. spicerianum* et du *C. insigné*, se rapprochant du premier par la forme des fleurs et du second par leurs dimensions.

Le sépale dorsal, principal ornement de la fleur, est presque rond et a plus de 5 centimètres de largeur, il est du blanc le plus pur, à l'exception de la base où se trouve une tache vert clair; la partie centrale du sépale, y compris la tache, est traversée par des lignes de mouchetures mauve-pourpre.

Le sépale inférieur est plus petit que le dorsal et d'un vert pâle. Les pétales ondulés sur les bords sont d'un jaune brun verdâtre veiné de pourpre foncé; le labelle, plus foncé et plus tranché que dans le *C. spicerianum*, est d'un brun jaunâtre avec des veines et des réticulations plus obscures; le staminode est jaune-chamois pâle.

— **superbum** . . . . . 125 à 200 "

Issu comme la précédente du *C. spicerianum* et du *C. insigné*, cette variété lui est en tous points supérieure comme forme et comme coloris.

— **marmorophyllum** . . . . . 50 "

Hybride du *C. Hookera* et du *C. barbatum*, qu'il rappelle par le feuillage. Les pétales sont ceux du *C. Hookera*, mais retombants, bordés de cils, avec deux taches sur le limbe supérieur. Cet intéressant hybride a obtenu une prime de première classe.

— **Meirax** . . . . . 100 "

— **Morganæ** . . . . . 375 "

Hybride remarquable obtenu par le croisement des *C. superbiens* et *C. Stonei*; plante robuste et de croissance vigoureuse, dont le feuillage garde des traces de l'élégante moucheture de celui du *C. superbiens*.

Les fleurs sont parmi les plus grandes et les plus belles comme coloris de tous les *Cypripedium*. Le sépale dorsal a 6 centimètres de long sur 4 de large, blanc avec 4 ou 5 des stries pourpres, qui caractérisent le *C. Stonei*, le sépale inférieur est plus petit et a moins de stries; les pétales pendants ont 12 centimètres de long sur 2 1/2 dans la partie la plus large, ils sont blanchâtres à la base avec des mouchetures rouge brun devenant de plus en plus denses vers la pointe; le labelle est grand, proéminent, rose-veiné de cramois, blanchâtre en dessous; le staminode est brun clair.

— **Mrs. Canham** . . . . . 375 "

— **nitens superbum** . . . . . 100 "

Fleur dans le genre du *C. Maulei*, dont il provient du reste, mais beaucoup plus parfaite; c'est une variété hors ligne.

— **Petri** . . . . . 75 "

— **plunerum** . . . . . 400 "

— **politum** . . . . . 75 "

Sépale dorsal vernissé, blanchâtre, lavé de rouge avec des nervures vertes et une bande centrale rouge partant de la base; les pétales linéaires, satinés et légèrement couverts de poils fins, sont d'un rouge pourpre, mais verdâtres avec des taches pourpres vers la base. Le labelle est teinté de rouge pourpre sur le devant et nervure de vert.



	Fr. C.
<i>Cypripedium præstans</i> . . . . .	75 "
— <i>Regnieri (vrai)</i> . . . . .	50 "
— <i>Sallieri</i> . . . . .	125 "
— <i>Sanderianum</i> . . . . .	150 "

Le labelle ressemble beaucoup par sa forme à celui du *C. Stonci*, mais est d'une couleur bronze verdâtre. Le sépale dorsal est magnifiquement rayé de rouge brun sur un fond vert-jaunâtre et les pétales, qui forment le trait saillant de la fleur, sont rejetés en arrière, puis descendent en spirale et enfin s'allongent, comme ceux du *C. caudatum*, en ruban de 45 à 60 centimètres.

— *Schrœderæ* . . . . . 250 "

Hybride du *C. caudatum* fécondé par le *C. Sedeni*, ce dernier étant lui-même un hybride.

Le sépale dorsal est blanchâtre teinté de rose pâle, le sépale inférieur est plus grand et plus blanc; les pétales, de 10 centimètres de long, pendent en rubans tordus et sont d'un rose pâle avec des veines plus foncées. Le staminode est blanc d'ivoire frangé de poils cramoisis sur le bord supérieur.

— *Sedeni Candidulum* . . . . . 75 "

Perfectionnement du *C. Sedeni*. Les sépales et les pétales sont d'un blanc d'ivoire, les premiers veines de jaune verdâtre pâle les seconds teintés de rose vers la pointe; le labelle en forme de pantoufle est rose pâle.

— *Selligerum majus* . . . . . 100 à 150 "

— *Spicerianum* . . . . . 20 à 100 "

Cette espèce, restée longtemps très-rare, peut être considérée comme une des plus belles du genre.

— *Thibautianum* . . . . . 500 "

— *vernixum* . . . . . 20 à 60 "

— *vexillarium* . . . . . 75 "

Très-bel hybride obtenu du *C. Fairieanum* et du *C. barbatum*, ce dernier comme porte-graines.

Grandes fleurs; le sépale supérieur blanchâtre avec des veines rouge foncé lavé de pourpre et un peu de vert à la base remontant en légères nervures; le sépale inférieur plus court, plus étroit et plus pâle; les pétales défilés, obtus, avec des poils et quelques verrues autour du limbe; le labelle à peu près le même que celui du *C. Fairieanum*.

*Davallia tenuifolia Veitchiana* . . . . . 30 "

Cette Fougère est probablement la plus gracieuse et la plus finement découpée que l'on connaisse.

Les frondes ont de 75 centimètres à 1 mètre de longueur, elles sont élégamment recourbées en tous sens et la partie foliée est largement lancéolée et finement découpée.

Elle diffère du *Davallia tenuifolia* par la courbure des frondes, presque retombantes, et par le feuillage qui ressemble à une dentelle; les pennules sont aussi plus longues et plus grêles.

Le port élégamment retombant de cette fougère en fait une des meilleures plantes de serre à cultiver en corbeille.

*Dendrobium Breymerianum* . . . . . 30 à 50 "

— *stratiotes* . . . . . 50 "

*Dracæna australis aureo striata*  
spécimen unique . . . . . 400 "

Le *Dracæna australis* est une plante de serre froide et d'orangerie, passant parfaitement l'été en plein air tout comme son congénère le *D. indivisa*. Les feuilles sont plus grandes et surtout plus larges que celles de ce dernier et sont d'un effet magnifique.

Dans la variété *aureo striata* les feuilles bien luisantes sont striées de vert clair et de jaune d'or sur un fond vert sombre.

— *indivisa Doucetti* . . . . . 50 "

Variété à feuilles d'un vert tendre bordées de blanc pur. Le *Dracæna indivisa* est cette plante de serre froide et d'orangerie qui résiste si bien au plein air l'été.

— *Lindeni* . . . . . 5 à 50 "

Une des plus brillantes introductions faites en ces dernières années; tige dressée, simple; feuilles rassemblées régulièrement, largement engainantes à la base; limbe canaliculé, atténué en pétiole ailé, plus élargi, lancéolé, acuminé, bordé de blanc et de rose, largement parcouru par des bandes régulières, blanc et jaune pâle, nuancé et entremêlé de zones vertes avec d'autres bandes au milieu.

— *Massangeana (Wacheana), fort*  
5 à 50 "

	Fr. C.
<i>Echeveria Froebeli tricolor</i> . . . . .	3 "

Magnifique rosace de feuilles vertes au milieu, largement bordées de blanc et teintées de rose vers la pointe. Cette variété se distingue non seulement de tous les autres *Echeveria*, mais c'est une des plus belles plantes à feuillage coloré que l'on puisse voir.

*Encholirion speciosum, fort* . . . . . 15 "

*Globba alba* . . . . . 5 "

*Gymnogramma schizophylla* var.  
*gloriosa* . . . . . 5 à 15 "

Variété très-vigoureuse du *G. schizophyllum*, et de beaucoup supérieure par l'ampleur de ses frondes et la beauté de son port. Cette charmante et gracieuse fougère convient surtout pour la culture en corbeille.

*Himantophyllum Louise Kreme*  
20 à 200 "

*Ipomœa Horsfalliæ Lady Briggs* . . . . . 10 "

— *Thompsoniana* . . . . . 8 "

Variété nouvelle ressemblant, pour le port, à l'*I. Horsfalliæ*, mais à feuillage plus coriace et à fleurs deux fois plus grandes et du blanc le plus pur.

*Licuala grandis (Pritchardia), extra fort*  
2500 "

Palmier nouveau de tout premier ordre, d'un port superbe, d'une élégance de feuillage sans pareille.

*Maranta iconifera* . . . . . 10 "

Admirable feuillage d'un caractère très-décoratif, les feuilles atteignant environ 50 centimètres de longueur sur d'un vert jaunâtre marqué à chaque côté de la nervure principale de taches oblongues vert foncé, ce qui simule une feuille de fougère se détachant bien sur le fond.

*Marattia Mooreana* . . . . . 50 "

Pétiole noirâtre, feuilles très-incisées.

*Masdevallia macrura* . . . . . 100 "

— *Trochilis* . . . . . 25 à 50 "

*Nepenthes bicalcarata* . . . . . 100 à 300 "

Une de forte texture et de forme élégante, de 10 à 15 centimètres de longueur sur 7 à 10 centimètres de largeur, d'un cramoisi foncé marqué de lignes parallèles; dessous de l'opercule armé de deux éperons, d'où son nom de *bicalcarata*. C'est une des plus belles espèces introduites jusqu'à ce jour.

— *lanata, très-rare* . . . . . 50 "

— *Mastersi* . . . . . 40 à 200 "

Hybride du *N. distillatoria* et du *N. sanguinea*, ce dernier étant porte-graine; incontestablement ce que l'on a obtenu de plus beau jusqu'ici.

Les urnes sont aussi richement colorées que celles du *N. sanguinea*, mais se distinguent facilement de cette grande espèce par les macules caractéristiques du *N. distillatoria*, se détachant sur le fond rouge sang. Elles sont de forme cylindrique, légèrement renflées à la base et étranglées vers le milieu où se trouve un anneau ou côte, et atteignent une longueur de 20 centimètres avec un diamètre de 5, et même plus, quand la plante est très-vigoureuse. Chaque feuille produit une urne, présentant, dans sa vive coloration, un contraste frappant avec le vert pâle des feuilles et des pétioles.

— *Northiana* . . . . . 150 "

Les urnes de cette variété nouvelle sont de dimensions tout à fait extraordinaire; elles atteignent jusque 50 et même 40 centimètres de longueur, dans les plantes adultes, et sont d'un beau vert rougeâtre maculé de pourpre.

— *Outramiana* . . . . . 15 à 100 "

Urne de 12 centimètres de longueur, d'un vert jaunâtre fortement tacheté de rouge sang.

— *paradisæ* . . . . . 25 à 75 "

Urnes très-étranglées au milieu, de 10 à 15 centimètres de longueur sur 3 à 7 centimètres de largeur à la partie la plus renflée, d'un riche cramoisi tacheté de vert pâle. L'opercule vert en dessous, est tacheté de cramoisi à l'extérieur.

— *Veitchi* . . . . . 50 "

Espèce toute particulière, à feuilles coriaces couvertes en dessous de courts poils rouges.

Les urnes, remarquables par leurs dimensions, peuvent atteindre 25 à 30 centimètres et sont d'un beau vert gai.



**Nephrolepis Bausei** . . . . . 5 "

*Fougère* remarquable par ses frondes nombreuses de plus de 50 centimètres de long, feuillues depuis la base et d'un beau vert tendre.

Les frondes étant bipennées au lieu d'être entières, comme dans les autres espèces du genre, la plante a un aspect particulièrement gracieux qui, joint à son port trapu, la rend éminemment propre à la culture en corbeille.

**Nidularium acanthocrater** . . . . . 10 à 20 "

Feuilles larges, coriaces, garnies de fortes épines d'un vert mat passant au violet aniline à la floraison; bractées vertes; fleur blanche en capitule.

**Ormosia superba** . . . . . 10 "**Osmunda japonica corymbifera** . . . . . 15 "

Belle et remarquable *Fougère* du Japon, incontestablement le meilleur des *Osmunda* comme plante d'ornement, surtout pour la culture en pots. Les frondes forment groupe, leurs stipes sont érigés ou sous-érigés, très-lisses, grêles et d'un beau rose, ils atteignent une hauteur de 10 centimètres et supportent des expansions foliées de forme deltoïde ou triangulaire, qui s'étendent horizontalement dans toutes les directions.

**Pandanus d'Haenei** . . . . . 100 "

Magnifique espèce ornementale, d'un port trapu, très-décorative.

Les feuilles, d'un vert gai, légèrement ombrées en dessous, sont plus larges que celles du *P. utilis*, mais moins longues, et les épines sont d'un blanc jaunâtre.

**Philodendron corsinianum** . . . . . 40 "

Le plus ornemental de tous les Philodendron; il est issu du croisement des *P. Lindenii* et *lucidum*, et forme une plante de grandes dimensions. Les pétioles très-solides sont ronds, d'un vert pourpre atteignant 70 à 80 centimètres de longueur; les feuilles entières, sont longues d'environ 80 à 90 centimètres et larges d'environ 50 à 60 centimètres, bien étalées et assez fortement échancrées. Dans leur jeune âge, elles sont transparentes, d'un vert olive clair à nervures vert jaunâtre clair à la partie supérieure, pourpre olivâtre, à nervures blanc verdâtre, au revers. Plus tard elles sont d'un vert foncé à nervures renfoncées et plus claires à la partie supérieure, d'un pourpre clair nervuré vert clair au revers. Les fleurs sont curieusement conformées à spathe rouge pourpre.

— **Mamei** . . . . . 5 à 10 "— **Sodiroi** . . . . . 4 à 10 "

Remarquable *Aroïdée*, à rhizomes rameux, rampants, rouge fauve. Les feuilles, portées sur un pétiole vert teinté de rouge, sont cordiformes et atteignent une longueur de 20 à 50 centimètres sur 15 à 20 de largeur, sur les plantes adultes; elles sont d'un vert gai et abondamment couvertes de mouchetures argentées, sur la page supérieure. L'ensemble est étalé, trapu et d'un grand effet décoratif.

**Piper ornatum** . . . . . 5 "

Cette élégante plante de serre, à feuillage gentiment coloré est originaire des Célèbes, dans l'Archipel de Malaisie. Les tiges flexueuses sont vert pâle et garnies de nombreuses feuilles cordiformes d'un beau vert glacé moucheté de rose, à pétiole rose pâle.

Elle convient admirablement pour garnir les parois de la serre.

**Saccolabium illustre, fort** . . . . . 25 à 50 "

Très-belle espèce de la Cochinchine, très-robuste, à grandes grappes de fleurs blanches maculées de pourpre violacé.

**Schismatoglottis purpurea** . . . . . 5 à 10 "— **Robeleni** . . . . . 3 à 150 "

Charmante *Aroïdée* dont les feuilles ovales sont ornées d'une panachure d'un blanc métallique, régulièrement étendue entre la nervure médiane et la périphérie du limbe.

**Selaginella grandis, extra fort** . . . . . 3 à 50 "

Superbe *Selaginelle* d'un port très-élégant, à feuilles excessivement grandes, gracieusement retombantes, d'un beau vert luisant.

**Tillandsia Lindenii var. latispatha**

25 à 50 "

NOUVEAUTÉ obtenue en 1884 de graines reçues de Costa-Rica.

Feuilles en rosette, de 35 à 40 centimètres de long sur 1 1/2 à 2 cent. de large, gracieusement recourbées, lisses sur les bords et se terminant en pointe, d'un beau vert bronze légèrement strié de pourpre à la base.

Inflorescence en épi fortement comprimé, en ovale allongé de 16 centimètres de long sur 7 centimètres de large, émergeant du centre des feuilles et pour ainsi dire sans tige. Les bractées sont d'un vert clair sur la partie non fleurie et d'un beau rose chair sur la partie fleurie; les fleurs, qui se présentent en plus grand nombre à la fois que chez le type, sont aussi plus grandes, plus rondes et d'une belle couleur mauve azurée avec une grande macule blanche au centre.

— **Lindenii vera** . . . . . 35 "

Espèce trapue, fleurissant étant petite, à large inflorescence.

— **macropetala** . . . . . 15 à 40 "— **Musaica** . . . . . 20 à 100 "

Feuilles en lanières, ployées en gouttière vers la base, marquées en dessus, sur un fond vert clair, de nombreuses bandes transversales vert foncé, auxquelles correspondent en dessous autant de bandes noires; fleurs d'un jaune orangé avec le tiers supérieur blanc, sortant de l'aisselle de grandes bractées d'un vermillon vif.

— **Pastuchoffiana, extra-fort** 50 à 200 "

Feuilles larges de 7 à 8 centimètres, légèrement recurvées, acuminées, de couleur vert clair luisant et irrégulièrement rubanées, transversalement ou en mosaïque, de lignes d'un vert plus foncé.

**Vriesia Barilletti** . . . . . 8 à 15 "

Inflorescence en épi, s'allongeant successivement; bractées jaune-olivâtre, pointillées de brun; fleurs jaunes, floraison continue.

— **bellula** . . . . . 15 "

Port nain, feuilles pourprées, fleurs disposées en houppe courte d'un brun rougeâtre, bractées moitié carmin, moitié blanc, fleurs blanches.

— **hieroglyphica** . . . . . 3 à 200 "

Feuilles longues, larges, surtout à la base, minces, coriaces, très-raides plus ou moins arquées, canaliculées, lisses, brusquement arrondies à leur extrémité qui est terminée en une pointe retournée et déjetée sur le côté.

Sur un fond vert brillant se détachent des bandes transversales plus ou moins larges, rapprochées, irrégulières et interrompues de manière à figurer des arabesques ou des caractères hiéroglyphiques d'un vert foncé à la face supérieure et d'un violacé, presque noir, à la face inférieure. Sur les jeunes plantes, dont les feuilles sont étroites et lancéolées, les bigarrures sont inégales et parfois d'une belle couleur rouge poncé.

— **psittacina Morreni** . . . . . 15 "

Hybride des *Vriesia psittacina* et *brachystachis*; feuilles vertes en vase; fleurs jaunes, très-grandes, bractées moitié rouge vif et disposées en épi allongé.

**Washingtonia robusta, jeunes plantes**

5 à 10 "

très-fort . . . . . 50 à 300 "

Palmier remarquable au sujet duquel nous ne pouvons mieux faire, que de rapporter ce que nous écrivait, il y a quelques années, l'homme le plus compétent de notre époque en fait de Palmiers, M. Hermann Wendland, de Herrenhausen. « La plante que vous venez de m'envoyer est précieuse et surpasse tous les autres Palmiers. Je ne saurais trop la recommander pour le midi de la France et le nord de l'Italie où elle résistera fort bien en pleine terre, en plein air; à mon avis, elle est préférable au *Latania borbonica* comme plante d'appartement. C'est le Palmier le plus méritant qui ait paru en ces dernières années; il égale les *Brahea dulcis* et *Roettii*, c'est une perle de premier ordre et je ne saurais en dire trop de bien. »

**Zamia Van Houttei** . . . . . 25, 50 à 150 "

Espèce à très-larges feuilles.

— **Skinneri ovata** . . . . . 15 à 75 "



**AVIS.** — A la demande de nombreux clients, la maison met en vente les planches, hors-texte, de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ainsi que quelques planches inédites, au prix de 50 centimes la planche simple et 75 centimes la planche double.

Le prix pour cent exemplaires, à notre choix, sera réduit respectivement à 40 et 65 fr. Une liste de ces planches sera envoyée franco à toute personne qui en fera la demande.

1888-1889.

(Avril.)

N° 227.

## CULTURES

DE

# LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

à GAND (Belgique).

## SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

N. B. Les plantes marquées d'un :

- b* sont bulbeuses ou tuberculeuses;
- c* peuvent passer l'été dehors, en pots;
- t* peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
- g* sont grimpantes;
- or* se plaisent dans la serre à Orchidées, c'est-à-dire chaude et humide;
- pt* sont des plantes qui, mises en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent à l'ornementation des jardins;
- aq* sont des plantes aquatiques.

L'indication (FLORE...) placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide recueil publié dans l'Établissement, dont 23 Volumes ont paru et dont les prix et conditions de vente se trouvent rappelés sur la couverture du présent catalogue.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées.

Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en caractères gras.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>c</i> <b>Abutilon Sellowianum variegatum.</b> 2 "		<i>pt</i> <b>Achyranthes acuminata.</b> . . . . .	50
Le plus beau de tous les <i>Abutilon</i> connus. Feuilles très-grandes, richement panachées, de toute beauté.		" — <b>aureo-variegata.</b> . . . . .	50
<i>t</i> <b>Acalypha Macafeeana.</b> . . . . . 2 "		" — <b>Emersoni</b> . . . . .	50
Espèce à belles feuilles richement colorées dans leur jeunesse.		<i>pt</i> — <b>Lindenii</b> . . . . .	50
" — <b>macrophylla.</b> . . . . . 2 à 6 "		" — <b>Verschaffelti</b> (FLORE, XV, 191) . . . . .	50
		" — <b>aureo-variegata.</b> . . . . .	50



Fr. C.

*pt Achyranthes Wallisi* . . . . . 50 "

Les *Achyranthes* sont de jolies plantes basses, rameuses, à beau feuillage coloré de noir, de rouge, etc., excellentes à employer dans les parterres d'été.

*c Adamia versicolor* . . . . . 2 "

*or Adelaster albo-venosus* . . . . . 5 "

Plante ornementale légèrement grimpante, à grandes feuilles elliptiques d'un vert pourpré, à nervures blanches en-dessus, rouges en dessous.

*gt Allamanda Hendersoni* . . . . . 4 "

" — *neriifolia* . . . . . 3 "

" — *nobilis* (FLORE XVIII, 25) . . . . . 5 "

" — *Schottii* . . . . . 3 "

" — *Wardleiana* . . . . . 5 "

Les *Allamanda* sont des plantes grimpantes, produisant de grandes et belles fleurs jaunes, campanulées.

*pt Alternanthera amabilis* . . . . . 50 "

" — *latifolia* . . . . . 50 "

" — *versicolor* . . . . . 50 "

" — *amena* . . . . . 50 "

" — *paronichioides* . . . . . 50 "

" — *aurea major* . . . . . 50 "

*N. B.* Les *Alternanthera* sont livrables au printemps à 15 francs le cent.

*t Amasonia punicea* . . . . . 10 "

*gt Antigonon guatemalense* . . . . . 2 "

" — *leptopus* . . . . . 2 "

*or Aphelandra aurantiaca Roezlii*

(FLORE, XVII, 53) . . . . . 2 "

Magnifique Acanthacée à feuillage de texture opaque et marmoréenne, de coloris vert et blanchâtre, surmonté d'un superbe épi de nombreuses fleurs d'un rouge orangé foncé des plus intenses.

" — *fascinator* . . . . . 3 "

" — *Louisæ* . . . . . 25 "

" — *margaritæ* . . . . . 3 "

" — *nitens* . . . . . 2 "

" — *Porteana* (FLORE, X, 4t) . . . . . 2 "

Port trapu, tiges robustes, feuilles amples, épaisses, ondulées et panachées; inflorescence d'un orange vif avec mélange de fleurs d'un jaune soufre.

" — *squarrosa Leopoldi* (FL., IX, 85). 2 "

Feuilles très-grandes, dont les nervures sont superbement couvertes de blanc d'ivoire; fort épi de brillantes fleurs jaunes.

*t Apodytes dimidiata* . . . . . 3 "

*c Aralia Chabrierii (Etodendron),*

*branches* . . . . . 2 à 5 "

*lêles* . . . . . 6 à 100 "

Charmant arbuste d'appartement, d'un port élégant, d'une culture facile, à feuilles très-étroites et très-longues, d'un beau vert foncé avec la veine médiane bruniâtre.

" — *dactylifolia* . . . . . 5 à 10 "

" — *elegantissima* . . . . . 6 à 15 "

*e* — *Guilfoylei* . . . . . 3 à 6 "

" — *Humboldtii* . . . . . 10 "

" — *Kerchovei* . . . . . 5 à 10 "

" — *leptophylla* . . . . . 3 "

" — *monstrosa* . . . . . 5 à 10 "

Superbe espèce à feuilles d'un vert foncé bordé de blanc, avec des déchiquetures sur les bords.

" — *nobilis* . . . . . 6 à 15 "

*pt* — *papyrifera* (FLORE, VIII, 153) 2 à 5 "

*e* — *reticulata* . . . . . 2 "

" — *sonchifolia* . . . . . 2 "

Fr. C.

*e Aralia Veitchii* . . . . . 3 à 10 "

*t* — *Victoria (Panax)* . . . . . 3 à 15 "

Espèce très-élégante, feuilles nettement bordées de blanc et fortement laciniées, plante de grand effet.

" *Ardisia crenulata* . . . . . 2 "

" — *fructu albo* . . . . . 2 "

" — *Groenewegeni* . . . . . 3 "

" — *Oliveiri* . . . . . 2 "

" — *polyccephala* . . . . . 2 "

Les *Ardisia* sont de très-beaux arbustes d'un port élégant, à jolies fleurs blanches ou roses en corymbes, auxquelles succèdent des fruits diversement colorés.

*gt* 5. *Aristolochia barbata* . . . . . 5 "

" 2. — *Duchartrei* (FL., XVIII, 35). 3 "

" 21. — *elegans* . . . . . 5 "

Espèce nouvelle importée du Brésil, à tiges très-minces et à feuilles cordiformes, lisses en dessus, glaucescentes en dessous.

Les fleurs, d'une élégance remarquable, sont portées sur de longs pédoncules et s'allongent en tube, lequel se relève brusquement, pour s'étaler en un large pavillon cordiforme d'un riche pourpre foncé, orné de mouchetures irrégulières d'un blanc crème, avec un oeil jaune bordé de pourpre velouté.

Les fleurs sont abondantes, même sur de jeunes sujets, et sont entièrement exemptes de l'odeur désagréable particulière au genre.

" 17. — *galeata* . . . . . 3 "

" 3. — *gigas* . . . . . 3 "

" 4. — *Goldieana* . . . . . 10 "

" 6. — *labiosa* . . . . . 3 "

" 8. — *ornithocephala* (FL., XVII,

145). . . . . 3 "

" 9. — *ringens* . . . . . 3 "

" 12. — *trilobata* . . . . . 3 "

Feuillage tout marbré. Les *Aristolochia* sont de grandes lianes volubiles, d'une végétation luxuriante, à feuillage ample et à fleurs bizarres de couleur sombre.

*t Arrabidaea rosea* . . . . . 2 "

" *Artocarpus Cannoni* . . . . . 3 "

" — *metallica* . . . . . 2 "

" — *incisa grandis* . . . . . 30 "

*e Asparagus plumosus* . . . . . 2 à 5 "

" — *nanus* . . . . . 6 à 10 "

" — *tenuissimus* . . . . . 2 à 5 "

" — *virgatus* . . . . . 3 à 5 "

" *Aspidistra elatior* . . . . . 1-50 à 15 "

" — *foliis aureo-punctatis* . . . . . 3 "

" — *vittatis* . . . . . 3 à 25 "

Les *Aspidistra* sont d'excellentes plantes d'appartement; les deux dernières variétés ont les feuilles maculées ou rubanées de blanc et pointillées de jaune.

" *Astrapea Wallichii* . . . . . 5 "

Ombelles serrées, pendantes, de brillantes fleurs coccinees.

*or Attaceia cristata* (FLORE, IX, 13) 10 à 25 "

Plante dont l'inflorescence singulière consiste en une ombelle longuement pédonculée de fleurs sombres, entre lesquelles pendent, comme de long fil, les pedicelles des fleurs avortées, ce qui leur donne un caractère méduséen.

*or, b* — *palmatifida* . . . . . 10 "

" — *pinnatifida (Tacca)* . . . . . 10 "

*t Bambusa stricta* . . . . . 15 "

" — *verticillata* . . . . . 10 "

" *Barbacenia hybrida* . . . . . 3 "

*or Bertolonia guttata albo-punctatis-*

*sima* . . . . . 5 "



Fr. C.

*or Bertolonia guttata roseo-punctatis-*  
*sima* . . . . . 5 "

Deux charmantes variétés à feuilles admirablement ponctuées l'une de blanc, l'autre de rose.

— *margaritacea* (FL., XVI, 165) . . . 3 "

Espèce à feuilles d'un vert foncé velouté, tout pointillé de blanc pur.

— *marmorata* (FLORE VII, 291) . . . 3 "

Feuilles d'un vert obscur et miroitant, s'animent, suivant le jeu de la lumière, de brillants reflets cuivrés et ornées, sur leur longueur, de marbrures blanches.

— *primulaeflora* . . . . . 5 "

— *pubescens* . . . . . 3 "

— *var. Beckhautei* (L. Van Houtte) 15 "

Feuilles grandes, très-poilues, d'un vert gai fortement veiné, quadrillé et pointillé de blanc argenté.

— *Hrubyana* (FLORE, XXIII, 25) (L. Van Houtte) . . . 15 "

Feuilles parcourues, dans leur longueur, par des nervures d'un beau vert sombre sur fond blanc, et dont les intervalles sont ornés d'un quadrillé vert de deux nuances, que recouvre un pointillé blanc simulat de petites perles; jolie plante de premier ordre.

— *Kischschii* . . . . . 15 "

— *Marchandi* (L. Van Houtte) . . . 3 "

Feuilles d'un vert velouté, rubané de blanc.

— *Mirandæi* (FLORE, XXI, 135) (L. Van Houtte) . . . . . 5 "

Feuilles d'un vert olivâtre velouté, perlé de carmin.

— *Ohlendorffi* (L. Van Houtte) . . . 5 "

Feuilles grandes, d'un vert très-foncé velouté, veiné et pointillé de carmin vif.

— *Rodeckiana* (FLORE, XXIII, 27) (L. Van Houtte) . . . . . 15 "

Feuilles grandes, d'un vert foncé, veiné et ponctué de blanc pur; variété de tout premier mérite.

— *smaragdina* (L. Van Houtte) . . . 5 "

Feuilles d'un vert d'émeraude très-vif.

— *Van Houttei* (FLORE, XX, 109) (L. Van Houtte) . . . . . 5 "

Feuilles d'un vert sombre, veiné de rouge aniline vif et parsemé de milliers de points de même couleur, d'un ensemble merveilleux.

— *voluta* (L. Van Houtte) . . . . . 6 "

Feuilles révolutes comme celles du *Croton revolutum*, petites, d'un vert tendre tout perlé de blanc argenté.

— *vittata* . . . . . 5 "

On doit se rappeler l'effet prodigieux que produisirent les BERTOLONIA de l'établissement à l'exposition internationale de Gand, en 1878, et à l'exposition nationale de Bruxelles, en 1880, où ils furent honorés d'une médaille d'or. Tous ces superbes hybrides ont été obtenus de fécondations artificielles intelligemment opérées par le chef de section F. Marchand.

*e, g Bignonia Lindleyi* (FLORE, IX, 135) . . . 2 "

Espèce florifère, à gros bouquets de fleurs d'un bleu lilacé.

*t — regalis* . . . . . 5 "

— *Roerii villosa* . . . . . 2 "

*e II. Bougainvillea elegantissima* . . . 2 "

— *I2. — fastuosa* . . . . . 2 "

— *8. — glabra* . . . . . 2 "

— *2. — gracilis* . . . . . 2 "

— *3. — lateritia* . . . . . 2 "

— *10. — speciosa* . . . . . 2 "

— *13. — spectabilis foliis marmoratis* . . . 2 "

*e, g 9. — splendida* . . . . . 2 "

Les *Bougainvillea* sont des arbrisseaux sarmenteux du Brésil, à fort belles fleurs, accompagnées de grandes bractées.

Fr. C.

*or Brownea Ariza* . . . . . 5 à 15 "

— *erecta* . . . . . 10 à 25 "

— *grandiceps* (FLORE, VI, 153) . . . 20 "

— *macrophylla* . . . . . 10 à 100 "

Les *Brownea* sont de beaux arbres à grandes feuilles pennées, à magnifiques fleurs rouges en très-gros épis capités.

*t, g Calonyction sanguinolentum* . . . . . 2 "

— *Calyptrion Aubletii* . . . . . 2 "

Arbuste légèrement grimpant, touffu, très-floribond, à très-beau feuillage, à grandes fleurs en racèmes axillaires tout à fait blanches, à senteur de violette.

*t Campsidium filicifolium* . . . . . 2 "

— *Camptopus Manni* . . . . . 3 à 10 "

Rubiacée à très-grandes feuilles ornementales.

*or 74. Carludovicia atrovirens (pl- cata)* . . . . . 8 à 15 "

— *76. — humilis* . . . . . 15 à 30 "

— *326. — macropoda* . . . . . 25 à 150 "

— *78. — microcephala* . . . . . 4 à 15 "

— *79. — palmata* . . . . . 15 "

Ses feuilles plissées en éventail, partagées en 3-5 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.

*e Castanospermum albicans* . . . . . 4 "

*or Centradenia floribunda* . . . . . 2 "

— *grandifolia* . . . . . 2 "

— *rosea* . . . . . 2 "

Les *Centradenia* sont de mignonnes plantes herbacées à feuillage charmant, et à jolies fleurs roses, très-abondantes.

*e Centropogon Lucyanus* . . . . . 2 "

*or Centrosolenia ænea* . . . . . 2 "

Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné, à reflet métallique en dessus, violet lie de vin en dessous.

*t Cephalotus follicularis* . . . . . 5 "

La curieuse plante aux petites cannettes, en exemplaires très-forts, importés du pays natal.

*g, t Ceropegia stapeliæformis* (FLORE, II, juin, pl. IV) . . . . . 2 "

Plante volubile à fleurs très-bizarres, d'un blanc obscur parsemé de macules d'un pourpre foncé.

*pl Cestrum aurantiacum* . . . . . 2 "

*or, g Cissus albo-nitens* . . . . . 2 "

— *amazonica* . . . . . 2 "

— *argentea* . . . . . 2 "

— *discolor* (FLORE, VIII, 149 et IX, 2) . . . . . 2 "

Charmante liane dont le feuillage, violet et vert sombre, est délicatement marbré de blanc argenté.

— *Lindenii* . . . . . 2 "

— *porphyrophylla* (FLORE, XIV, 263) 3 "

Jolie plante grimpante dont les feuilles olivâtres sont nervurées de rouge.

*eg Clerodendron Balfouri* . . . . . 2 "

Plante grimpante atteignant 5 à 4 mètres de longueur, très-propre pour garnir le faite de la serre chaude; abondantes fleurs en grandes panicules d'un rouge cerise, coloris rehaussé par le contraste du blanc de neige des calices.

*e — Bungei* . . . . . 2 "

— *delectum* . . . . . 4 "

— *macrosiphon* . . . . . 2 "

— *speciosum* . . . . . 3 "

— *squamatum* . . . . . 3 "

— *Coccoloba majestica* . . . . . 10 "

*or — pubescens* . . . . . 15 à 75 "

*t — regalis* . . . . . 5 à 10 "

Les *Coccoloba* se couronnent d'immenses feuilles en parasol, d'un aspect tout exotique.



Fr. C.

- or Cochlostema Jacobianum** (FLORE, XVIII, 33). *fort* . . . 4 à 10 "
- Magnifiques fleurs portées sur de longs pédoncules, d'un ensemble ravissant, où se rencontrent le plus beau bleu d'azur et le lilas le plus tendre.
- " — **albo-lineatum**, *fort* . . . 20 à 100 "
- Cette variété nouvelle, gagnée par l'Etablissement, a des feuilles liguées de blanc; elle a obtenu le 1er prix, comme plante nouvelle de semis, à l'exposition de Bruxelles.
- Codiaeum**, voir **Croton** ci-après.
- † Colea Commersonii** . . . 8 à 20 "
- " — **floribunda** . . . 5 à 20 "
- Très-belle et curieuse plante à grand feuillage ailé, à jolies fleurs orangé et blanc.
- or Combretum coccineum** . . . 5 à 15 "
- Excellente plante dont les fleurs sont d'un écarlate très-vif.
- † micropetalum** (FL., XIX, 149) 3 à 10 "
- Espèce très-florifère, à nombreuses fleurs d'un beau jaune d'or.
- tg Coryanthelium Moronæ** . . . 2 "
- " **Corynostylis** (*Calyptrium*) **Hybanthus albidiflora** (FLORE, XXI, 107) . . . 2 "
- Plante grimpante de la Guinée, à tiges striées et ponctuées de blanc, à fleurs d'un blanc jaunâtre.
- " **Crescentia regalis** . . . 5 "
- † Crossandra infundibuliformis** . . . 2 "
- or 64. Croton** (*Codiaeum*) **albicans** . . . 3 "
- " 108. — **Albert Truffaut** . . . 4 à 25 "
- Magnifique hybride à grandes feuilles vert clair, rubanées de jaune tendre.
- " 33. — **Andreanum** . . . 3 "
- " 54. — **aureo-maculatum** . . . 2 "
- " 98. — **Baron Franck Seillière** 6 à 30 "
- " 92. — **Baron James de Rothschild** 3 à 6 "
- " 74. — **Bergmanni** . . . 4 "
- Variété splendide, très-ornementale; tige verte, grosse, munie de nombreuses feuilles moyennement pétioles, étalées, gaufrées ou ondulées, à pétiole vert en dessus, blanc rosé en dessous; limbe ovale-elliptique, atteignant facilement 58 centimètres de longueur sur 10 à 12 centimètres de largeur, d'un vert foncé, traversé, au centre de la feuille et d'un bout à l'autre, par une bande irrégulière de 2 à 5 centimètres de largeur, d'un blanc d'ivoire ainsi que toutes les nervures correspondantes, et du plus bel effet.
- " 75. — **Carrierii** . . . 4 "
- Superbe variété, remarquable par la noblesse de son port et l'élégance de son abondant feuillage. Sa tige verte s'élève à plusieurs mètres de hauteur; ses feuilles sont longuement lancéolées et atteignent 40 à 45 centimètres de longueur sur 6 à 7 centimètres de largeur; pétiole de 6 centimètres de longueur, d'un jaune d'or; limbe gracieusement arqué et nuagé d'un jaune d'or très-luisant.
- " 76. — **Comte de Germiny** . . . 5 "
- Feuilles d'un vert olivâtre, taché de jaune d'or, veine médiane d'un cramoisi clair.
- " 4. — **cornutum** . . . 2 "
- " 34. — **Disraeli** . . . 3 à 10 "
- " 96. — **Droueti** . . . 4 à 30 "
- " 79. — **Duvali** . . . 4 "
- Variété très-vigoureuse, très-rustique, d'un beau port, à feuilles d'abord érigées, puis recourbées à l'état adulte, lancéolées et acuminées, d'un vert clair recouvert d'une bordure blanche au centre et diversement nuancé de blanc pur sur toute la surface de la feuille. Le pétiole vert clair a 3 à 4 centimètres de longueur; les feuilles ont 55 à 58 centimètres de longueur sur 6 à 7 centimètres de largeur.
- " 39. — **Earl of Derby** . . . 3 à 10 "
- " 110. — **Empereur Alexandre III** 10 "
- or 109. — Eugène Chantrier** . . . 10 "
- " 84. — **Hanburyanum** . . . 4 à 30 "
- Variété très-belle et très-distincte, d'un port étalé; feuilles de 55 centimètres de longueur sur 5 centimètres de largeur, d'un vert olivâtre élégamment marqué de jaune d'or et de cramoisi rosâtre.

Fr. C.

- or 65. Croton Henryanum** . . . 5 à 10 "
- Feuilles oblongues-ovées, acuminées, de 20 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur, d'un vert foncé parsemé et maculé de jaune d'or; plante décorative de tout premier ordre.
- " 58. — **Imperator** . . . 2 à 10 "
- " 9. — **irregulare** . . . 2 "
- " 60. — **Jamesii** . . . 2 "
- " 10. — **Johannis** (*angustissimum*) . . . 2 "
- " 99. — **latimaculatum** . . . 5 à 10 "
- " 93. — **Macafeeanum** . . . 4 à 50 "
- " 41. — **Macarthurii** . . . 3 "
- " 94. — **magnoliæfolium** . . . 5 "
- Superbe variété d'un beau port, de grand effet, à énormes feuilles de 35 à 40 centimètres de longueur sur 10 à 15 centimètres de largeur, d'un vert bouteille largement panaché et maculé de jaune d'or; tiges et pétioles jaunâtres.
- " 44. — **nobile** . . . 2 "
- " 23. — **ovalifolium** . . . 2 "
- " 45. — **picturatum** . . . 2 "
- " 95. — **Président Chéreau** . . . 5 "
- " 105. — **Princess of Wales** . . . 4 "
- " 42. — **Queen Victoria** . . . 3 "
- " 90. — **Truffautianum** . . . 4 à 25 "
- Belle variété dont les feuilles sont marquées de cramoisi et de jaune sur fond vert.
- " 52. — **Van Houttei** . . . 3 "
- " 16. — **Veitchii** . . . 2 "
- " 91. — **Vervaeitii** . . . 4 "
- " 72. — **Warreni** . . . 5 "
- Feuilles en spirale, retombantes, vivement panachées de rose et de cailin tournant au cramoisi, de beaucoup d'effet.
- " 22. — **Youngi** . . . 2 à 10 "
- 12 Croton en 12 sortes à notre choix :**  
*en belles plantes* . 18 à 36 "
- † Cryptophragmium zeylanicum** . . . 2 "
- " **Curculigo recurvata** . . . 2 à 5 "
- " — **foliis striatis** . . . 5 à 50 "
- " — **variegatis** . . . 5 à 125 "
- or Cyanophyllum Bowmani** . . . 3 "
- " — **magnificum** . . . 5 à 40 "
- Les *Cyanophyllum* sont des arbrisseaux de grand effet, à magnifiques et amples feuilles gaufrées, colorées, veloutées et à reflets métalliques.
- ag, t Cyperus alternifolius** . . . 2 "
- " — **albo-variegatus** (FL., XIV, 233) 3 "
- Plante aquatique très-curieuse, à feuilles en ombelles élégantes, rubanées de blanc.
- " — **distans** . . . 5 "
- † Cyphomandra argentea** . . . 2 à 5 "
- Charmante plante brésilienne à feuilles elliptiques de 20 à 25 centimètres de longueur sur 10 centimètres de largeur, fortement costées, d'un blanc argenté barré par de petites veines transversales vertes.
- e Cyrtanthera chrysostephana** . . . 2 "
- or Cyrtoceras acuminatum** . . . 3 "
- " — **reflexum** . . . 5 "
- † Cyrtosiphonia spectabilis** . . . 5 "
- † Dalechampia Roezlii** . . . 3 "
- " — **rosea** (FLORE, XVI, 173) . . . 2 "
- Charmante Euphorbiacée dont les grandes bractées d'une rose tendre, entourant les fleurs jaunes, se détachent admirablement sur le vert foncé de ses grandes feuilles.
- Datura**, voir **Brugmansia**.



Fr. C.

- or *Dichorisandra musaica* (FLORE, XVI, 187) . . . . . 10 "
- Feuilles de toute beauté, d'un vert pâle entièrement couvert d'une mosaïque d'un vert foncé; fleurs tricolores, où le bleu le plus pur s'allie au blanc et au jaune pâle.
- " — *undata* . . . . . 2 "
- " — *vittata* . . . . . 2 "
- e *Dionæa muscipula* . . . . . 3 "
- La curieuse plante dite *attrape-mouches*.
- t, g *Dioscorea chrysophylla* . . . . . 2 "
- " — *discolor* . . . . . 2 "
- " — *melanoleuca* . . . . . 2 "
- Les *Dioscorea* sont des plantes grimpantes, à joli feuillage cordé ou sagitté, coloré chez plusieurs espèces.
- or, g 1. *Dipladenia amabilis* . . . 3 à 10 "
- " 2. — *amœna* . . . . . 3 à 10 "
- " 6. — *boliviensis* . . . . . 6 "
- " 17. — *Breareleyana* . . . . . 5 à 10 "
- " 19. — *hybrida* . . . . . 5 à 10 "
- " 20. — *profusa* . . . . . 5 à 10 "
- Espèce de floraison facile, à très-grandes fleurs d'un rouge vif.
- " 12. — *urophylla* (FLORE, V, 425) . 4 "
- Charante espèce donnant des grappes de fleurs campanulées pendantes; le tube est d'un jaune chamois, les cinq lobes sont d'un rose vif en dessus et en dessous, la gorge est d'un jaune d'or; l'ensemble produit un très-bel effet.
- or 66. *Dracæna amabilis* . . . . . 3 à 10 "
- t 67. — *Baptisti* . . . . . 3 à 75 "
- " 3. — *brasiliensis* . . . . . 2 à 5 "
- " 4. — *cannæfolia* . . . . . 5 à 50 "
- e 6. — *congesta* . . . . . 1 "
- t 77. — *fruticosa* . . . . . 2 "
- or 100. — *Goldieana* . . . . . 10 à 20 "
- Magnifique nouveauté africaine, unique en son genre, tout à fait hors ligne et d'un grand effet ornemental; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourchues, alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre, et dont la page inférieure est d'un vert clair.
- t 12. — *gracilis* . . . . . 2 "
- pt 14. — *indivisa* . . . . . 1 à 5 "
- " 15. — *lineata* . . . . . 2 à 5 "
- " 124. — *Veitchii* . . . . . 1 à 5 "
- or 73. — *jaspidea* . . . . . 3 à 15 "
- t 16. — *Knerkiana* . . . . . 5 à 75 "
- " 70. — *latifolia (grandis)* . . . . . 4 à 75 "
- " 132. — *Lindeni* . . . . . 5 à 50 "
- Une des plus brillantes introductions faites en ces dernières années; tige dressée simple; feuilles rassemblées régulièrement, largement engainantes à la base; limbe canaliculé atténué en pétiole ailé, puis élargi, lancéolé, acuminé, bordé de blanc et de rose, largement parcouru par des bandes régulières, blanc et jaune pâle, nuancées et entremêlées de zones vertes.
- or 98. — *madagascariensis* . . . . . 5 à 25 "
- t 136. — *Massangeana (Alettris fragrans Wackeana)*, fort . . . . . 5 à 50 "
- " 110. — *Neo-Caledonica* . . . . . 3 à 50 "
- t 22. — *punctata* . . . . . 3 "
- or 101. — *Robinsoniana* . . . . . 5 à 20 "
- Plante d'un caractère particulier, à feuilles lancéolées-acuminées, arquées, d'un beau vert rayé et marqué de vert bronzé et d'écarlate brunâtre sur les plantes adultes.
- pt 26. — *rubra* . . . . . 2 "
- " 83. — *striatifolia* . . . . . 3 à 10 "
- or 29. — *terminalis (versicolor)* . . . 3 à 5 "

Fr. C.

- or 28. *Dracæna terminalis stricta* (FLORE, XV, 77) . . . . . 5 à 10 "
- Feuilles amples, d'un vert diversement teinté et panaché du carmin le plus vif.
- t 30. — *umbaculifera* . . . . . 10 à 75 "
- 12 *Dracæna*, variées dans les coloris, à mon choix, pour . . . . . 30 à 60 "
- g, or 3. *Echites argyræa (Hamadictyon)*. 2 "
- t *Epiphyllum truncatum* : 12 belles variétés greffées sur tiges . 20 "
- t 42. — *Le Vésuve* . . . . . 3 "
- " 44. — *Mad. Alfassa* . . . . . 3 "
- " 45. — *M. Fournier* . . . . . 3 "
- " 43. — *M. le docteur Slavecki* . . . . 3 "
- Quatre NOUVEAUTÉS des plus méritantes, tout récemment mises au commerce.
- Les *Epiphyllum* sont des cactées à charmantes fleurs dans toute la gamme du blanc, du rose et du carmin, d'une floraison abondante et facile.
- " *Eranthemum albo-marginatum* . . . 2 "
- Superbe espèce à feuilles marginées de blanc, de bel effet.
- or — *igneum* (FLORE, XVII, 19) . . . 2 "
- Feuillage d'un vert très-sombre recouvert d'une poussière diamantée, sur lequel se détachent une bande centrale et des nervures latérales d'un jaune d'or, à l'extrémité, d'un rouge feu vers le milieu du limbe.
- t — *Moorei* . . . . . 2 "
- " — *nigrescens* . . . . . 2 "
- " — *Roxburghi* . . . . . 2 "
- " — *sanguineum* . . . . . 2 "
- " — *sanguinolentum* (FLORE, XV, 157) 2 "
- Feuilles d'une grande richesse de panachure, où le vert obscur et le vert pâle sont rehaussés par des nervures du plus beau carmin, et qui sont bordées de cils de même couleur.
- " — *tricolor* . . . . . 2 "
- " — *tuberculatum* . . . . . 2 "
- " — *variabile* . . . . . 3 "
- or *Eriocnema marmorata (Bertolonia)* (FLORE, VII, 291) . . . . . 3 "
- Feuilles d'un vert obscur miroitant, s'animent, suivant le jeu de la lumière, de brillants reflets cuivrés, présentant des marbrures blanchâtres sur les principales nervures, et à revers d'un rose pourpre; mignonnes fleurs d'un rose frais à centre blanc.
- t *Eugenia glazionana* . . . . . 4 à 10 "
- Charmant arbuste d'appartement, trapu, à petites feuilles très-ornementales.
- t *Euphorbia jacquiniiflora* . . . . . 2 à 10 "
- " — *sanguinea* . . . . . 2 "
- or *Fagrea imperialis* . . . . . 5 "
- pt *Ferdinandia eminens* . . . . . 2 "
- Grand feuillage ornemental; fleurs blanches en ombelle terminale d'un grand effet en pleine terre, l'été.
- t 1. *Ficus Amazonica* . . . . . 3 "
- " 2. — *Annei* . . . . . 2 "
- ng 3. — *barbata* . . . . . 1 "
- " 5. — *Cooperi* . . . . . 2 à 10 "
- or 6. — *dealbata* . . . . . 5 "
- t 7. — *eburnea* . . . . . 2 "
- " 22. — *edulis* . . . . . 2 "
- pt 8. — *elastica* . . . . . 2 à 10 "
- Une des plantes produisant le *Caoutchouc* et généralement connue sous ce dernier nom; de serre tempérée, passant l'été en pleine terre, en plein air; feuilles grandes, luisantes, d'un vert sombre.
- Livrables par cent, en automne.
- " 26. — *aureo-variegata* . . . . . 3 à 5 "



	Fr. C.
pt 19. <i>Ficus lancifolia</i> . . . . .	2 à 5 "
" II. — <i>macrophylla</i> ( <i>Artocarpus</i> <i>imperialis</i> ) . . . . .	3 à 10 "
ng 27. — <i>minima</i> . . . . .	1 "
" 25. — <i>Moorei</i> . . . . .	3 à 6 "
" 20. — <i>Parcelli</i> (FLORE, XXII, 13) . . . . .	3 à 6 "
Très-grand et superbe feuillage élégamment marqué de blanc et de jaune pâle.	
tg 23. — <i>radicans</i> . . . . .	1 "
" 21. — <i>repens</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	
or 28. — <i>Wendlandi</i> . . . . .	5 "
" <i>Fittonia argyroneura</i> (FL., XVI, 103) . . . . .	1 "
Superbe espèce à feuilles réticulées de blanc d'ivoire.	
" — <i>gigantea</i> . . . . .	1 "
" — <i>Pearcei</i> . . . . .	1 "
Le plus beau de tous les <i>Fittonia</i> veinés de rouge.	
" — <i>Verschaffelti</i> ( <i>Gymnostachium</i> ) (FLORE, XV, 153). . . . .	1 "
e <i>Fourcroya Lindenii</i> . . . . .	3 à 10 "
exemplaires très-forts 50 à 100 "	
Espèce très-rustique à feuilles bordées de jaune, excellente pour figurer dans les collections de plantes panachées pour expositions.	
t <i>Franciscoea confertiflora foliis varie-</i> <i>gatis</i> . . . . .	3 "
" — <i>eximia</i> (FLORE, X, 173) . . . . .	3 "
" — <i>laurifolia</i> . . . . .	2 "
" — <i>Lindenii</i> . . . . .	3 "
" <i>Gardenia citriodora</i> (FLORE, XII, 139) . . . . .	4 "
e — <i>florida flore pleno</i> . . . . .	2 à 4 "
t — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	5 "
e — <i>radicans</i> . . . . .	2 à 4 "
or — <i>Stanleyana</i> (FLORE, II, janv., pl. 1) . . . . .	5 "
Les <i>Gardenia</i> ont presque tous des fleurs blanches, grandes, belles, suavement odorantes et très-propres pour bouquets.	
t <i>Graptophyllum Nortoni</i> . . . . .	2 "
e <i>Greyia Sutherlandii</i> (FLORE, XVII, 45) . . . . .	3 "
Magnifique arbrisseau dont les feuilles luisantes sont d'un vert pâle maculé de violet, et les fleurs d'un rouge cocciné vif, en long épi.	
t <i>Guarea coffeæfolia</i> . . . . .	3 "
or <i>Gustavia Lindenii</i> . . . . .	20 "
pt <i>Hebeclinium atrorubens</i> . . . . .	2 "
Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.	
" — <i>ianthinum</i> . . . . .	1 "
" — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
" — <i>megalophyllum</i> . . . . .	2 "
Se distingue surtout par son admirable feuillage.	
" — <i>panamense</i> . . . . .	1 "
or <i>Hedysarum gyrans</i> . . . . .	5 "
La plante <i>Télégraphe</i> dont les jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.	
e, g <i>Hexacentris mysorensis</i> . . . . .	2 "
e 13. <i>Hibiscus rosa sinensis albo-</i> <i>variegatus</i> . . . . .	2 "
" 14. — — — <i>carmineus perfectus</i> . . . . .	2 "
" 25. — — — <i>Colleri</i> . . . . .	3 "
e II. — — — <i>Cooperi</i> ( <i>Tricolor</i> ) (FLORE, XV, 109) . . . . .	2 "
Superbe feuillage où le vert sombre, le vert clair, le blanc et le rose sont combinés d'une charmante façon, toute irrégulière.	
" 19. — — — <i>cruentus</i> . . . . .	2 "

	Fr. C.
e 24. <i>Hibiscus rosa sinensis Denni-</i> <i>soni</i> . . . . .	3 "
Espèce nouvelle ayant des caractères tout différents de ceux de ses congénères; feuilles épaisses, dans le genre de celles du <i>Lierre</i> ; fleurs grandes, très-belles, d'un blanc crème.	
" 21. — — — <i>fulgidus</i> . . . . .	2 "
" 20. — — — <i>Kermesinus</i> . . . . .	2 "
" 30. — — — <i>Lucien Linden</i> . . . . .	3 "
" 3. — — — <i>miniatus plenus</i> . . . . .	2 "
" 15. — — — — <i>semi-plenus</i> . . . . .	2 "
" 16. — — — — <i>vivicans</i> . . . . .	2 "
" 29. — <i>schizopetalus</i> (FLORE, XXIII, 69). . . . .	3 "
Espèce très-curieuse et très-ornementale, à fleurs pendantes dont les pétales, fortement lacinés et frangés, sont d'un rouge orangé vif.	
or <i>Higginsia Ghiesbreghtii</i> ( <i>Campylo-</i> <i>trys</i> ) . . . . .	3 "
" — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	5 "
" — <i>refulgens</i> . . . . .	5 "
" — <i>Roezlii</i> . . . . .	5 "
g, or 16. <i>Hoya australis</i> . . . . .	3 "
" n 2. — <i>bella</i> (FLORE, IV, 399) . . . . .	3 "
" n 22. — <i>campanulata</i> . . . . .	2 "
" t 4. — <i>carnosa</i> . . . . .	2 "
" n 12. — — <i>picta</i> . . . . .	3 "
" n 14. — — <i>variegata</i> . . . . .	3 "
" n 5. — <i>cinnamomifolia</i> . . . . .	4 "
or 7. — <i>fraterna</i> . . . . .	8 "
" t 21. — <i>globulosa Higginsii</i> . . . . .	4 "
or 8. — <i>imperialis</i> (FLORE, IV, 393). . . . .	5 "
" t 23. — <i>mollis</i> . . . . .	2 "
" or 20. — <i>Paxtoni</i> . . . . .	4 "
Les <i>Hoya</i> sont des plantes charnues, sarmenteuses, volubiles, à jolies fleurs en ombelles diversement colorées, d'un fort bel effet.	
t <i>Impatiens Episcopi</i> . . . . .	2 "
" — <i>flaxida-alba</i> . . . . .	2 "
" — <i>Hawkeri</i> . . . . .	3 "
" — <i>Sultani</i> . . . . .	1 "
tg <i>Ipomæa Horsfalliæ</i> . . . . .	5 "
" n — — <i>Lady Briggs</i> . . . . .	10 "
Iresine, voir <i>Achyranthes</i> .	
or <i>Ixora Bandhuca</i> . . . . .	3 "
" — <i>Chelsoni</i> . . . . .	3 "
" — <i>Colei</i> . . . . .	3 "
" — <i>crocata rutilans</i> . . . . .	3 "
" — <i>Dixiana</i> . . . . .	2 à 5 "
" — <i>Duffi</i> . . . . .	3 "
" — <i>Pilgrimi</i> . . . . .	2 à 5 "
" — <i>profusa</i> . . . . .	3 "
" — <i>reginæ</i> . . . . .	3 à 5 "
" — <i>Westi</i> . . . . .	3 à 5 "
" — <i>Williamsii</i> . . . . .	3 à 6 "
Enorme et superbe bouquet de grandes fleurs très-distinctes, d'un rouge saumon.	
t <i>Jacaranda mimosæfolia</i> . . . . .	3 "
tg <i>Jasminum gracillimum</i> . . . . .	2 "
Jasmin nouvellement introduit de Bornéo, d'un port gracieux, très-florifère, produisant de longues grappes de fleurs d'un blanc pur, suavement odorantes.	
Lasiandra, voir <i>Serre froide</i> .	



Fr. C.

- Leea amabilis* . . . . . 10 "
- † *Lindenia rivalis* . . . . . 3 "
- e *Mackaya bella* . . . . . 2 à 5 "
- Magnifique Acanthacée dont les abondantes fleurs campanulées sont d'un lilas clair.
- " *Magnolia pumila* . . . . . 4 à 8 "
- Magnolies de serre tempérée à très-belles fleurs odorantes.
- or *Medinilla Curtisii* . . . . . 4 "
- *magnifica* (FLORE, VI, 125 et IX, 287). . . . . 4 à 25 "
- Beau feuillage gaufré; fleurs roses, en longues grappes très-fourmées, retombantes, très-gracieuses.
- † *Meyenia erecta* (FLORE, XI, 35) . . . . . 2 "
- Arbrisseau à grandes et belles fleurs d'un bleu violacé, à gorge jaune.
- tg *Mikania Eeckhauti* . . . . . 3 "
- † — *violacea* . . . . . 2 "
- e *Monochæstum sericeum multiflorum* . . . . . 2 "
- or *Napoleona Whittfieldii* (Fl., IV, 386) 5 "
- Charmante fleur de couleur abricot et pourpre, prenant une teinte bleuâtre par la dessiccation.

" 32. *Nepenthes bicalcarata*, forte

100 à 300 "

Urne de forte texture et de forme élégante, de 10 à 15 centimètres de longueur sur 7 à 10 centimètres de largeur, d'un cramoisi foncé marqué de lignes parallèles; dessous de l'opercule armé de deux épérons, d'où son nom de *bicalcarata*. C'est une des plus belles espèces introduites jusqu'à ce jour.

- " 21. — *Chelsoni* . . . . . 15 à 100 "
- " 41. — *Courtii* . . . . . 25 à 75 "
- " 3. — *gracilis major* . . . . . 8 à 20 "
- " 18. — *Hookeriana* . . . . . 20 à 100 "
- " 37. — — *elongata* . . . . . 25 à 150 "
- " 5. — *hybrida Dominiana* . . . . . 15 à 100 "
- " 6. — — *maculata* . . . . . 20 à 125 "
- " 22. — *intermedia* . . . . . 25 à 100 "
- " 7. — *lævis* . . . . . 5 à 20 "
- " 8. — *lanata*, très rare . . . . . 50 "
- " 27. — *Laurenceana* . . . . . 25 "
- " 34. — *Mastersi* . . . . . 40 à 200 "

Hybride du *N. distillatoria* et du *N. sanguinea*, ce dernier étant porte graines, incontestablement ce que l'on a obtenu de plus beau jusqu'ici.

Les Urnes sont aussi richement colorées que celles du *N. sanguinea*, mais se distinguent facilement de cette grande espèce par les macules caractéristiques du *N. distillatoria*, se détachant sur le fond rouge sang. Elles sont de forme cylindrique, légèrement renflées à la base et élargies vers le milieu où se trouve un anneau ou cote, et atteignent une longueur de 20 centimètres avec un diamètre de 5, et même plus, quand la plante est très-vigoureuse. Chaque feuille produit une Urne présentant, dans sa vive coloration, un contraste frappant avec le vert pâle des feuilles et des pétioles.

" 45. — *Morganæ* . . . . . 50 "

Port trapu, feuilles vert pâle avec nervure médiane rouge. Les Urnes complètement développées ont de 15 à 20 centimètres; dans les plantes jeunes, elles sont marbrées de rouge et de vert et, dans les plantes adultes, elles sont rouge sang. L'opercule est toujours vert pâle et contraste vivement avec l'ensemble du coloris de l'ascidie.

" 28. — *Outramiana* . . . . . 15 à 100 "

Urne de 12 centimètres de longueur, d'un vert jaunâtre fortement tacheté de rouge sang.

" 40. — *paradisæ* . . . . . 20 à 75 "

Urnes très-étirées au milieu, de 10 à 15 centimètres de longueur sur 5 à 7 centimètres de largeur à la partie la plus renflée, d'un riche cramoisi tacheté de vert pâle, l'opercule vert en dessous est tacheté de cramoisi à l'extérieur.

Fr. C.

- or 9. *Nepenthes phyllamphora* . 5 à 25 "
- " 10. — *Raffiesiana* (FLORE, XVI, 167 et XXII, 161) . . . . . 25 à 75 "

Une des plus belles espèces du genre; amples urnes dont le fond, jaune et vert, est couvert de taches, de stries et d'hieroglyphes d'un rouge sang, du plus splendide effet.

- " 39. — *Stewartii* . . . . . 25 à 75 "
- " 47. — *Veitchi* . . . . . 50 "
- Espèce toute particulière, à feuilles coriaces couvertes en dessous de courts poils rouges.

Les Urnes, remarquables par leurs dimensions, peuvent atteindre 25 à 50 centimètres et sont d'un beau vert gai.

- " 43. — *Wrigleyana* . . . . . 25 à 100 "
- e *Oplismenus imbecillis foliis variegatis* (FLORE, XVII, 5) . . . . . 1 "

† *Ormosia superba* . . . . . 10 "

e *Otacanthus cœruleus* (FLORE, XV, 53) 2 "

Acanthacée à fleurs d'un bleu lilacé, très-gracieuses.

tg *Paullinia Hooibrenki* . . . . . 3 "

" — *thalictrifolia* (FLORE, XIX, 10) . 3 "

Excellente plante d'appartement, à feuillage ténu et finement découpé, de bonne consistance.

" — — *argentea* . . . . . 3 à 10 "

Plante grimpante à feuilles argentées ressemblant à celles d'un *Adiantum*.

or *Pavetta borbonica* . . . . . 10 "

Feuillage ornemental d'un vert foncé tacheté de vert pâle.

" — — *maxima* . . . . . 20 "

" — — *picta* . . . . . 15 à 35 "

† — *indica* . . . . . 2 "

Fleurs en panicule, jaunâtres, odorantes.

" *Pavonia intermedia* . . . . . 3 à 10 "

Hybride du *P. Mackoyana* et du *P. Wioti*, cette superbe Malvacée a le feuillage vert et persistant du premier et la floraison abondante du second. Cultivée en plein air l'été, à l'abri du grand soleil, elle forme des plantes trapues dont la floraison est continue.

" — *Makoyana* . . . . . 3 à 5 "

Plante hors ligne fleurissant une bonne partie de l'année, très-recommandable.

" — *Wioti* . . . . . 2 à 5 "

Curieuse Malvacée brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pourpres, de très-longue durée.

" *Pellionia Daveauana* var. *arg.* . 2 "

" — *pulchra* . . . . . 2 "

" 2. *Peperomia argyræa* (FLORE, XXIII, 183) . . . . . 2 "

Feuilles d'aspect presque métallique, à reflets argentés sur le vert foncé de la face supérieure.

" 1. — *arifolia* . . . . . 2 "

" 17. — *Eeckhautei* . . . . . 2 "

Espèce de croissance pyramidale, à feuilles lancéolées, veinées de blanc.

" 8. — *Verschaffelti* . . . . . 2 "

tg *Petræa volubilis* . . . . . 2 à 5 "

Arbrisseau grimpant à fleurs bleuâtres.

or *Phyllagathis rotundifolia* . . . 2 à 10 "

" *Pilea callitrichoides* . . . . . 2 "

Pendant les mois de juin et juillet, on peut produire, à l'aide de cette plante, un feu d'artifice en miniature. Pour cela, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; on en trempe le sommet dans de l'eau et on le retire immédiatement en le secouant assez fort pour le débarrasser du liquide qui le couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine projettera son pollen, destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.

" — *muscosa (microphylla)* . . . . 2 "

" *Piper ornatum* . . . . . 5 "

Cette élégante plante de serre, à feuillage gentiment coloré, est originaire des Célebes, dans l'Archipel de Malaisie. Les tiges flexueuses sont vert pâle et garnies de nombreuses feuilles



cordiformes d'un beau vert glacé moucheté de rose, à pétiole rose pâle.

Elle convient admirablement pour garnir les parois de la serre.

Fr. C.

or *Pisonia longirostris* . . . . . 5 à 10 "

" *Plectranthus atropurpureus variegatus* . . . . . 2 "

e — *fruticosus* . . . . . 2 "

Genre de *Coleus* à feuillage charnu, à senteur de citron.

e *Plumbago coccinea rosea* . . . . . 2 "

t *Poinsettia pulcherrima* . . . . . 3 à 6 "

Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.

" — *plenissima* . . . . . 3 à 5 "

pt *Polymnia grandis* . . . . . 2 "

ag *Pontederia crassipes* . . . . . 2 "

On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau; elle a de très-curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.

t *Porphyrocoma lanceolata* . . . . . 2 "

Epi de belles fleurs rouges.

" *Psychotria cyanococca* (FL., XIX, 15) 3 "

Produit des grappes de baies du plus beau bleu d'outre-mer.

" — *expansa* . . . . . 3 à 6 "

" *Pteridophyllum zeylanicum* . . . . . 5 à 25 "

Feuilles composées à nervure ailée.

" *Reidia glaucescens* . . . . . 2 "

e *Rhopala aurea* . . . . . 5 à 10 "

" — *corcovadensis* . . . . . 5 à 10 "

" — *elegantissima* . . . . . 5 à 10 "

" — *Jonghi* . . . . . 20 à 50 "

" — *Vervaeana* . . . . . 5 à 15 "

Le *Rhopala*, par son magnifique feuillage ailé si décoratif, est un des plus beaux ornements de la serre tempérée.

tg *Rhynchosia albo-nitens* . . . . . 2 "

Arbrisseau sarmentueux à très-joli feuillage trifoliolé, ligné de blanc au centre; fleurs légères, violacées.

e *Rogiera cordata* (FL., VIII, 13) . . . . . 2 à 10 "

Charmants cormbes de fleurs dont le limbe, d'un rose pâle, encadre une touffe de poils dorés qui ferme la gorge.

" — *elegans* . . . . . 2 "

t *Rudgea macrophylla* (FLORE, XVII, 17) . . . . . 10 à 25 "

Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; panicules de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée et simulant celles de l'Oranger; excellentes pour bouquets.

e *Ruellia macrantha* . . . . . 2 "

Plante brésilienne de serre tempérée, à très-grandes fleurs comme celles de *Gloxinia*, d'un beau carmin violacé; on peut la mettre l'été en pot ou en pleine terre, à l'air libre, où elle forme de jolis buissons.

" — *maculata* . . . . . 2 "

t *Ruellia juncea* . . . . . 2 "

" *Sanchezia nobilis* (FLORE, XXIII, 181) . . . . . 2 à 5 "

Feuilles longues de 25 à 50 centimètres, larges de 10 à 15, à nervures pennées, vertes ou richement colorées de blanc jaunâtre ou de jaune vif; fleurs jaunes en panicule terminale, garnies de larges bractées d'un rouge brique.

" — *glaucohylla* . . . . . 2 à 5 "

" *Sansevieria rufocincta* . . . . . 2 "

e *Scutellaria Mociniana* . . . . . 2 "

" — *pulchella purpurea* . . . . . 2 "

or *Sonerilla hybrida Alfred Mame* . . . . . 2 "

" — *Baronne de Marches* . . . . . 2 "

Fr. C.

or *Sonerilla hybrida Comtesse de Flandre* 2 "

" — *Hendersonii* . . . . . 2 "

" — *argentea* . . . . . 2 "

" — *marmorata* . . . . . 2 "

" — *Mad. Alfred Mame* . . . . . 2 "

" — *Mad. Charles Heine* . . . . . 2 "

" — *Mad. Secrétan* . . . . . 2 "

" — *Mad. Victor Alesch* . . . . . 2 "

" — *Princesse Mathilde* . . . . . 2 "

" — *margaritacea* (FLORE, XI, 105) . . . . . 2 "

" — *metallica* . . . . . 2 "

Charmantes petites plantes à feuilles d'un vert satiné, parsemées de taches argentées simulant de petites perles, à fleurs en cymes terminales, d'un rose carminé.

Tous les *Sonerilla* sont de mignonnes plantes à feuilles diversement pointillées, du plus gracieux effet, à fleurs charmantes, blanches ou roses.

" *Sphærogyne imperialis* . . . . . 8 "

" — *latifolia* . . . . . 10 "

Tige revêtue de poils d'un brun ferrugineux; noble feuillage velouté à revers rouge.

g, t *Stephanotis floribunda* . . . . . 2 "

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes de feuilles épaisses, ornementales, que recouvrent des bouquets de grandes fleurs blanc de neige, répandant un délicieux arôme.

" — *Elvastonii* . . . . . 2 "

" *Stereocentrum multiflorum* . . . . . 2 "

t *Tabernaemontana Camassa* . . . . . 4 à 10 "

Belles fleurs blanches, suavement odorantes.

pt *Teleianthera versicolor* . . . . . 50 "

" 5. *Theophrasta Jussieu* . . . . . 10 à 50 "

Espèce remarquable par ses longues feuilles qui atteignent 45 à 80 centimètres de longueur sur 8 à 10 centimètres de largeur.

" 6. — *latifolia* . . . . . 10 "

" — *speciosa* . . . . . 10 "

pt 8. — *longifolia* . . . . . 5 à 35 "

" 9. — *macrophylla*, vrai . . . . . 800 "

Espèce tout à fait supérieure par son grand et beau feuillage.

" 10. — *minor* . . . . . 5 à 10 "

t, g *Thunbergia chrysops* . . . . . 2 "

" — *coccinea* (FLORE, XXIII, 213) . . . . . 2 "

Plante grimpante à beau feuillage et à fleurs d'un rouge orangé, très-odorantes, pendant en longues grappes.

" — *fragans* . . . . . 2 "

" — *mysorensis* . . . . . 2 "

" — *Natalensis* . . . . . 2 "

e *Thyrsacanthus rutilans* . . . . . 2 "

Jolies fleurs tubuleuses d'un rouge vif, en très-longes thyrses pendants.

t *Torenia asiatica* (FLORE, II, 157) . . . . . I "

Grandes fleurs d'un pourpre lilacé, marquées de trois larges macules d'un pourpre foncé velouté.

" — *Baillonii* . . . . . I "

" — *Fournierii* . . . . . I "

" *Toxicophlæa spectabilis* . . . . . 4 à 10 "

" — *Thunbergii* . . . . . 3 "

" *Tradescantia zebrina argentea* . . . . . I "

ag *Victoria regia* (FL., III, pl. 199-204) . . . . . 25 "

La Reine des eaux, dont les feuilles énormes atteignent 2 mètres de diamètre, et les fleurs de 50 à 55 centimètres de diamètre; pétales extérieurs blanchâtres, se colorant en rose carminé en se rapprochant du centre. Les plantes que nous offrons sont solides et seront disponibles à la fin de mai.

50 plantes de serre chaude et tempérée, à notre choix : 35 francs.



## SPÉCILIATÉS

DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

## AMARYLLIDÉES.

- Fr. C.
3760. *Amaryllis equestris major* . . . 2 "
3314. — *Josephinæ (Brunswigia)*, très  
forts. . . . 10 à 20 "
- Immense ombelle de fleurs, parfois au nombre de cinquante,  
d'un rouge brillant.
2564. — *pardina (FLORE, XVII, 25-27)*. 5 "
- — *variétés de semis obtenues  
dans l'Établissement*. 3 à 100 "
- Amaryllis* à grandes fleurs entièrement ponctuées de rouge  
brunâtre sur fond jaunâtre.
3322. — *procera, très-forts* . . . 10 à 25 "
- Amaryllis* à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot.  
Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un  
mètre de hauteur.
- Terre légère, orangerie ordinaire, près du jour, en hiver;  
tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un  
mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre  
et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie.
2565. — *reticulata (FLORE, V, 450)* 5 à 10 "
- Fleur bien faite, d'un beau rose carminé tout couvert de  
réticulations d'un carmin foncé.
3736. — *robusta* . . . . . 5 "
3765. — *vittata type, fort.* . . . . 1 "
3422. — — *Harrisoni*. . . . . 4 "
3764. — — *alba, fort* . . . . . 5 "
- — *en variétés* . . . . . 3 à 100 "
- Amaryllis en mélange, oignons de force à  
fleurir mais n'ayant pas fleuri.***
- les six* . . . . . 12 "
- les douze*. . . . . 20 "
3505. *Buphane ciliaris* . . . . . 10 "
- Ombelle de nombreuses fleurs pourpres.
3513. *Callipsyche mirabilis* . . . . . 5 "
3554. *Coburgia flava* . . . . . 3 "
3555. — *incarnata*. . . . . 3 "
3556. — *miniata* . . . . . 3 "
1794. *Crinum amabile, très-forts* . 15 à 30 "
2975. — *asiaticum*. . . . . 10 à 20 "
3596. — *brachynema (FLORE, XXII,  
63)*. . . . . 3 à 10 "
- Fleurs blanches répandant une odeur suave.
3601. — *crassifolium, forts* . . . . 3 "
3585. — *Mackoyanum* . . . . . 15 "
3604. — *Mooreanum* . . . . . 12 à 25 "
2557. *Doryanthes Palmeri (FLORE,  
XX, 77), fort* . . . . . 15 à 150 "
- Magnifique *Amaryllidée* à grandes ombelles d'un aspect  
insolite, garnies de nombreuses fleurs d'un écarlate vif.
3705. *Elisena longipetala*. . . . . 5 "

- Fr. C.
2558. *Eucharis amazonica (FLORE, XII,  
69)* . . . . . 2 "
- les douze*. . . . . 25 "
- fortes touffes* . 5 à 50 "
- Charmantes fleurs blanches, suavement odorantes.
3298. — *candida (FLORE, VIII, 107), vrai* 3 "
3793. — *Mastersii* . . . . . 3 "
- Fleurs d'un blanc pur, en ombelle, d'un aspect ravissant.
3724. *Eurycles australasica* . . . . . 5 "
1839. *Griffinia hyacinthina* . . . . 5 à 10 "
- Charmante *Amaryllidée* à ombelle bien garnie de fleurs du  
plus suave bleu violacé.
195. — — *maxima* . . . . . 8 à 15 "
3811. *Hæmanthus coarctatus* . . . . 4 "
3812. — *coccineus*. . . . . 2 50 "
3815. — *intermedius* . . . . . 2 50 "
3726. — *Kalbreyeri (FLORE, XXIII, 17)* 8 "
- Superbe *Amaryllidée* de l'Afrique australe. Les fleurs, au  
nombre de 30 à 60 et plus, sont d'un beau rouge vermillon,  
disposées en ombelles sphéroïdales et portées sur des pédi-  
celles grêles entremêlées de petites bractées membraneuses. Les  
feuilles, qui sortent d'un bourgeon spécial, à la base de la  
hampe florale, sont d'un vert vif et couvertes de mouchetures  
sanguines, surtout à la face inférieure et le long de la nervure  
médiane.
3819. — *pubescens* . . . . . 3 "
3820. — *puniceus* . . . . . 4 "
- Fleurs d'un rouge sang.
3823. — *tigrinus* . . . . . 2 50 "
3825. — *virescens albiflos* . . . . 2 50 "
2560. *Himantophyllum miniatum*  
(FLORE, IX, 237) . . . 3 à 5 "
2561. — — *maximum (L. Van Houtte)* 5 à 50 "
- Grandes fleurs érigées, d'un rouge minium.
3703. — — — *Van Houttei (L. Van  
Houtte)*. . . . . 4 à 30 "
- Variété superbe gagnée dans l'Établissement, à fleurs gran-  
des, bien faites, d'un rouge minium vif, à centre orange, por-  
tées sur des hampees élevées.
3713. — — — *E<sup>en</sup> de Rothschild*. 20 à 150 "
3719. — *miniatum C. H. Donner*  
(Reimers). . . . . 25 à 150 "
3794. — — *Lindenii (division)* . . 25 à 50 "
3718. — — *Louise Cremer (Reimers)*  
20 à 200 "
3709. — — *Mad. Donner ( )* . . . 200 "
3712. — — *Mad. Freeman ( )* 25 à 200 "
3714. — — *Madem. Alex. Hardy ( )*  
20 à 150 "
3716. — — *Mad. L. Van Houtte ( )*  
50 à 350 "
3708. — — *Mad. Peeters ( )* 25 à 250 "



Fr. C.

3711. *Himantophyllum* *miniaturum*  
*Madem. Clara Reimers*  
*(Reimers)* . . . 25 à 250 "
3720. — — *Madem. Dora Stavenow*  
*( " )* . . . 20 à 125 "
3728. — — *Madem. Léonie Van*  
*Houtte ( " )* . . . 25 à 175 "
3707. — — *Madem. Marie Reimers*  
*( " ) (FL., XXIII, 9)* 30 à 200 "
3704. — — *Madem. Marie Van*  
*Houtte ( " )* . . . 50 à 350 "
3706. — — *Madem. Martha Reimers*  
*( " )* . . . 20 à 200 "
3721. — — *M. Ch. Van Eeckhaute*  
*( " )* . . . 20 à 75 "
3710. — — *H. Todt ( " )* . . . 25 à 200 "

Ces superbes nouveautés font partie d'un ensemble de vingt variétés plus belles les unes que les autres, que nous avons acquises de M. Reimers, de Hambourg; elles donnent de larges bouquets de grandes fleurs, bien faites, bien porées, d'une tenue parfaite, et des coloris rouges minium les plus éblouissants. Elles ont obtenu, par acclamation, une médaille d'or à la dernière exposition de Gand, où, du reste, les *Himantophyllum* de l'Établissement ont remporté les 5 premiers prix, sur les 4 qu'a décernés le jury; ce dernier affirmant ainsi hautement l'excellence de nos cultures et la supériorité de nos variétés.

Fr. C.

3763. *Himantophyllum* *robustum* 15 à 50 "
- Tous les *Himantophyllum* sont inappréciables comme plantes décoratives; ils fleurissent presque constamment. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui seul; leurs bouquets de fleurs simulent des *Amaryllis* d'un rouge minium, diversement intense dans les différentes sortes.

*Himantophyllum. Variétés sans nom, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant de notre collection, hors ligne* . . . 15 à 50 "

1850. *Hymenocallis* *adnata* *princeps*  
*(FLORE, XXII, 15)* . . . 5 "
- Charmanes fleurs à tube vert et à divisions laciniées d'un blanc pur.

3170. — *mexicana* . . . 2 "
- les douze . . . 20 "
3801. *Pancratium* *species* . . . 2 "
3802. *Plagiolirion* *Horsmanni* . . . 10 "
4135. *Stenomesson* *suspensum* . . . 1 50
- les douze . . . 12 "
3324. *Vallota* *purpurea* . . . 2 "
- les douze . . . 20 "
3325. — — *major* . . . 3 "

## AROIDÉES.

Fr. C.

556. *Aglaonema* *pictum* . . . 3 à 50 "
63. — *rubrum* . . . 4 à 10 "
267. *Alocasia* *Gibsoni* . . . 2 "
266. — *gigantea* . . . 5 à 10 "
186. — *Jenningsii* . . . 2 "
516. — *Johnstonei* . . . 5 à 10 "
52. — *Lowii* (FL., XXI, 89) . . . 10 à 25 "

Feuillage d'un beau vert, dont les veines sont d'un blanc verdâtre et les revers pourpres.

45. — *macrorrhiza* *foliis* *variegat.* . . 4 "
382. — *Marshallii* . . . 2 "
37. — *metallica* (FL., XXI, 97) . . . 5 à 15 "

Feuilles colossales en forme de bouclier, de plus de 50 centimètres d'envergure, très-épaisses, très-ornementales, se maintenant verticalement, d'un vert foncé recouvert d'un vernis bronzé du plus brillant effet.

20. — *plumbea* (FL., XXI, 93) . . . 5 à 10 "
- Feuilles vertes en dessus, d'un gris de plomb en dessous.
534. — *Putzeysii* . . . 35 "
590. — *Reginæ* . . . 25 à 75 "
589. — *Sanderiana* . . . 20 à 40 "
319. — *Sedeni* . . . 5 à 100 "
617. — *species* . . . 50 à 100 "

Dans le genre de l'*A. Sanderiana*, mais à feuilles plus larges et moins profondément découpées; tout à fait remarquable.

489. — *Thibautiana* . . . 5 à 50 "
557. — *Van Houttei* . . . 10 à 100 "

Sans contredit, le plus beau des *Alocasia*. Le port en est imposant et les feuilles énormes, cordiformes, atteignant jusqu'à 1 m 25 de longueur sur 80 centimètres de largeur, sont d'un vert clair, à nervures bordées de blanc argenté.

66. — *zebrina* (FLORE, XV, 81) 6 à 150 "
535. *Amorphophallus* *imperialis* . . . 10 "
73. — *Konjac* . . . 5 "
515. — *Lacourii* . . . 5 à 10 "
- Espèce de grand effet, la plus belle du genre.

Fr. C.

121. *Amorphophallus* *nivosus* . . . 3 "
3345. — *Rivieri* (FLORE, XIX, 43) . . . 2 à 5 "

Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier. Tubercules devenant très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure environ un mètre 25 centimètres de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers; elle est précieuse pour décor de massifs.

296. *Anthurium* *acaule* . . . 75 "
519. — *album* *grandiflorum* . . . 10 à 25 "
- Variété florifère, à très-grandes spathe blanches.

488. — *Andreanum* . . . 3 à 25 "
- Splendide Aroïdée, l'une des plus belles du genre, à grande spathe fortement veinée du vermillon cramoisi le plus vif, et à spadice jaune à bout blanc.

564. — — *carneum* . . . 15 "
595. — — *Chantrieri* . . . 15 "
558. — — *ferrierense* . . . 5 à 100 "
520. — *argenteo-marmoratum* . . . 5 à 10 "
536. — *Brownii* . . . 10 à 35 "
492. — *consanguineum* . . . 6 "
383. — *crystallinum* . . . 3 à 100 "

Enormes feuilles d'un vert foncé, fortement veinées de blanc pâillété, d'un grand effet ornemental.

456. — *Dechardi* . . . 3 à 50 "
- Charmanne Aroïdée nouvelle, excellente pour décoration d'appartement, formant de superbes touffes régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses grandes fleurs blanches, légèrement parfumées.

197. — *fissum* . . . 10 "
521. — *flexuosum, fort* . . . 25 "
- Espèce très-rare.



Fr. C.

Fr. C.

409. **Anthurium floribundum** . . . 3 à 6 " "  
 560. — **Gustavi** . . . . . 40 à 500 " "  
 Magnifique espèce à grandes feuilles vertes et de croissance très-rapide.  
 537. — **Harrisianum pulchrum** . . 5 à 10 " "  
 351. — **hybridum** . . . . . 15 " "  
 216. — **Laucheanum** . . . . . 10 à 200 " "  
 612. — **Leodiense** . . . . . 5 à 15 " "  
 201. — **Lindigi** . . . . . 8 à 25 " "  
 538. — **macrolobum** . . . . . 20 " "  
 Espèce de croissance vigoureuse, à grandes feuilles largement lobées, d'un vert foncé; très-décorative.  
 202. — **magnificum** . . . . . 5 à 10 " "  
 203. — **maurititanum** . . . . . 8 à 50 " "  
 204. — **Maximiliani** . . . . . 10 " "  
 473. — **ornatum** . . . . . 15 à 40 " "  
 Magnifique espèce, remarquable par ses fleurs et par son feuillage. Les exemplaires d'une bonne venue ont les pétioles d'environ 1 mètre de longueur. La feuille est d'un vert clair légèrement veiné de blanc, en forme de cœur et a 25 à 50 centimètres de largeur; les fleurs, posées sur de vigoureux pédoncules, s'élançant bien au dessus du feuillage; la spathe, d'un blanc pur, a de 10 à 20 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur, et se termine en pointe vers le sommet; le spadice, de 55 centimètres de longueur est droit, bien apparent, noirâtre, ombré de violet et légèrement pointillé de blanc.  
 518. — **Patini** . . . . . 3 " "  
 301. — **peltatum radiatum** . . . 5 à 50 " "  
 213. — **Scherzerianum** (FLORE, XVII, 139) . . . . . 3 à 150 " "  
 Espèce très-florifère et très-ornementale, à fleur d'un vert-millon rutilant, de très-grand effet.  
 474. — — **grandiflorum** . . . 10 à 200 " "

514. **Anthurium Scherzerianum** Roth-schildianum (FLORE, XXIII, 85). 75 " "  
 Admirable nouveauté dont la spathe blanche est entièrement striée et maculée de rouge cinabre; spadice d'un orange vif.  
 566. — **Schmidscheni** . . . . . 10 à 50 " "  
 618. — **Sellowianum** . . . . . 10 " "  
 539. — **splendidum** . . . . . 10 à 25 " "  
 463. — **Veitchii, très-fort** . . . 15 à 2000 " "  
 Nouveauté de tout premier ordre, de grand effet, à feuilles excessivement allongées, atteignant 60 à 90 centimètres de longueur sur 50 centimètres de largeur, retombantes, très-coriaces, d'un vert foncé reflété d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.  
 490. — **violaceum** . . . . . 4 " "  
 540. — **Wallisii** . . . . . 10 à 25 " "  
 592. — **Waluiewi** . . . . . 25 " "  
 462. — **Warocqueanum** . . . 10 à 25 " "  
 très-forts . . . 150 à 300 " "  
 Nouveauté de tout premier ordre, la plus belle des Aroidées, dont les feuilles atteignent 1 mètre de longueur sur plus de 50 centimètres de largeur, d'un très-riche vert velouté, contrastant avec les nervures médianes et secondaires qui sont d'un vert plus pâle.  
 457. **Anthurium Williamsi** . . . . 5 " "  
 75. **Ariopsis peltata** . . . . . 2 " "  
 591. **Arisæma fimbriatum** . . . . 15 " "  
 3378. — **præcox** . . . . . 3 " "  
 3379. — **ringens** (FL., XII, 167) . . 5 " "  
 3380. — **serotinum** . . . . . 1 " "  
 3381. — **Sieboldii** . . . . . 5 " "

## Caladium.

Tout le monde, aujourd'hui, connaît ces charmantes Aroidées ayant nom *Caladium*, dont les variétés innombrables ont des feuilles si amples et si splendidement diversifiées de coloris; ce sont, sans contredit, les plantes panachées les plus belles et les plus ornementales dont on puisse garnir les serres froides et les appartements pendant les quatre mois de la belle saison. Elles se reposent dans leurs pots, à l'état sec, pendant le restant de l'année.

D'octobre en avril, les CALADIUM sont disponibles en tubercules à l'état sec et s'expédient par la poste; pendant les autres mois, ils ne peuvent être fournis qu'en végétation, en pots, et à des prix supérieurs à ceux indiqués ci-après.

Pour les noms des variétés des deux premières séries, voir Catalogue 126, pages 67 et 68.

### Caladium. — PREMIÈRE SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . . . . .	2 francs.
12 — à notre choix . . . . .	18 " "
25 — — — — —	30 " "
100 tubercules en 50 variétés . . . . .	100 " "

### Caladium. — DEUXIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur . . . . .	3 francs.
12 — à notre choix . . . . .	30 " "
25 — — — — —	50 " "



**Caladium.** — TROISIÈME SÉRIE.

6 variétés à notre choix : 40 francs. — 12 variétés à notre choix : 75 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
498. <i>Ibis Rose</i> (Bleu) . . . . .	15 "	594. <i>Atala</i> (Bleu) . . . . .	20 "
499. <i>Baronne James de Rothschild</i> ( n ) . . . . .	10 "	595. <i>B. S. Williams</i> ( n ) . . . . .	20 "
546. <i>Aurore boréale</i> ( n ) . . . . .	20 "	596. <i>Comte de Germiny</i> ( n ) . . . . .	25 "
547. <i>Le Titien</i> ( n ) . . . . .	20 "	597. <i>La Nacre</i> ( n ) . . . . .	25 "
549. <i>rubrum metallicum</i> ( n ) . . . . .	15 "	598. <i>Lymington</i> ( n ) . . . . .	25 "
550. <i>Sirius</i> ( n ) . . . . .	15 "	599. <i>Raymond Lemoiniér</i> ( n ) . . . . .	25 "
552. <i>amœnum</i> ( n ) . . . . .	10 "	600. <i>William Bull</i> ( n ) . . . . .	30 "
553. <i>Cardinale</i> (Bleu) . . . . .	15 "	601. <i>Charlemagne</i> (Bleu) . . . . .	15 "
554. <i>Ferdinand de Lesseps</i> ( n ) . . . . .	12 "	602. <i>Duchesse de Mortemart</i> ( n ) . . . . .	20 "
555. <i>John R. Bow</i> ( n ) . . . . .	15 "	603. <i>l'Automne</i> ( n ) . . . . .	15 "
570. <i>l'Aurore</i> ( n ) . . . . .	10 "	604. <i>Mad. Jules Picot</i> ( n ) . . . . .	20 "
572. <i>Isis</i> ( n ) . . . . .	10 "	605. <i>T. de Vigier</i> ( n ) . . . . .	15 "
573. <i>Gaze de Paris</i> . . . . .	10 "	607. <i>Auguste Carpentier</i> ( n ) . . . . .	10 "
574. <i>Monsieur d'Halley</i> ( n ) . . . . .	10 "	608. <i>Van Dyck</i> ( n ) . . . . .	10 "
575. <i>Elisa</i> (Bleu) . . . . .	10 "	609. <i>candidum</i> ( n ) . . . . .	10 "
593. <i>Mad. Imbert-Koechlin</i> ( n ) . . . . .	25 "	611. <i>Souvenir du docteur Bleu</i> ( n ) . . . . .	15 "

**Caladium, EN FORTS TUBERCULES, POUR EXPOSITIONS, à notre choix, la pièce :**1<sup>re</sup> SÉRIE : 4 francs; 2<sup>me</sup> SÉRIE : 8 francs; 3<sup>me</sup> SÉRIE : 15 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
14. <i>Colocasia esculenta</i> . . . . .	2 "	486. <i>Dieffenbachia Leopoldi</i> . . . . .	2 à 10 "
<i>les douze</i> . . . . .	18 "	Aroidée d'une grande beauté. Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert luisant, traversées par une large et forte côte d'un blanc d'ivoire, bordée, dans toute sa longueur, par une bande blanche qui produit un vif contraste avec le fond vert foncé.	
567. — <i>Neo-Caledonica</i> . . . . .	2 à 5 "	562. — <i>magnifica</i> . . . . .	4 à 20 "
Plante raine très-ornementale, formant une belle touffe de feuilles vert foncé à macules blanchâtres.		446. — <i>marmorata</i> . . . . .	4 à 15 "
493. — <i>odora</i> . . . . .	2 à 25 "	Belle espèce à grandes et épaisses feuilles ovales, de 50 à 55 centimètres de longueur sur 12 centimètres de largeur, d'un vert clair irrégulièrement tacheté et ponctué de blanc crème; c'est une des espèces les plus distinguées et les plus élégantes du genre.	
392. <i>Curmeria picturata</i> . . . . .	3 à 25 "	592. — <i>Memoria Corsi</i> . . . . .	3 à 10 "
417. — <i>Roezlii</i> . . . . .	4 à 10 "	379. — <i>nobilis</i> . . . . .	3 à 10 "
447. — <i>Wallisii</i> . . . . .	5 à 25 "	484. — <i>splendens</i> . . . . .	3 à 10 "
Très-jolie Aroidée à feuilles ornementales, moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches d'un jaune d'or.		Brillante Aroidée, remarquable par l'éclat de son coloris; la tige est légèrement tigrée de vert foncé et de vert pâle.	
280. <i>Dieffenbachia Baraquiniana</i> . . . . .	2 à 15 "	530. <i>Epipremnum mirabile</i> . . . . .	2 à 5 "
292. — <i>Bausei</i> . . . . .	3 à 15 "	263. <i>Monstera deliciosa</i> ( <i>Tornelia fragrans. Philodendron pertusum</i> ) . . . . .	5 à 20 "
326. — <i>Bowmani</i> . . . . .	2 à 10 "	232. <i>Philodendron bipinnatifidum</i> . . . . .	15 "
433. — <i>Carderi</i> . . . . .	8 à 20 "	235. — <i>giganteum</i> . . . . .	3 à 8 "
Feuilles oblongues-ovées, d'un beau vert foncé, admirablement et régulièrement maculées et panachées.		459. — <i>gloriosum</i> . . . . .	5 à 10 "
445. — <i>Chelsoni</i> . . . . .	2 à 15 "	236. — <i>grandifolium</i> . . . . .	5 à 10 "
Cette variété diffère des autres sortes panachées par sa feuille d'un vert foncé, qui est garnie d'une bande plumeuse grise, le long de la nervure médiane, et est ornée de macules d'un jaune vif sur le reste du limbe.		559. — <i>Mamei</i> . . . . .	5 à 10 "
421. — <i>illustris</i> . . . . .	3 à 15 "	475. — <i>Melinoni, extra fort</i> . . . . .	75 à 125 "
Espèce d'un port élégant et de croissance facile, dont les feuilles sont couvertes de macules jaunes entremêlées d'un pointillé blanc argenté, d'un bel effet.		528. — — <i>paranaense, fort</i> . . . . .	75 à 125 "
407. — <i>imperialis, très-forts</i> . . . . .	10 à 50 "	240. — <i>orthophyllum</i> . . . . .	5 "
458. — — <i>nobilis</i> . . . . .	15 à 100 "	242. — <i>pinnatifidum</i> . . . . .	5 à 10 "
561. — <i>Jenmanii</i> . . . . .	4 à 20 "	619. — <i>Sellowianum</i> . . . . .	15 "
Espèce remarquable. Les feuilles de forme oblongue, acuminées, sont longues de 25 à 50 centimètres, sur une largeur de 8 à 10, avec une nervure médiane proéminente de laquelle partent de chaque côté, et symétriquement, les nervures latérales.		588. — <i>Sodiroi</i> . . . . .	4 à 10 "
La couleur du fond des feuilles, d'un vert richement lustré, est relevé par une bande d'un blanc de lait à chaque nervure latérale et par quelques macules blanches, semées entre les bandes. Ces bandes et ces macules sont semi-transparentes, de sorte que le feuillage a le même aspect de panachure, vu des deux côtés.		613. — <i>speciosum</i> . . . . .	10 à 25 "
		389. <i>Phyllotænium Lindenii</i> . . . . .	3 à 200 "
		620. — — <i>magnificum</i> . . . . .	10 "
		388. <i>Pistia Stratiotes</i> . . . . .	2 "
		Plante aquatique flottante, de serre chaude, qu'on peut tenir dans un bassin, en plein air, l'été.	



	Fr. C.
296. <i>Pothos acaulis</i> . . . . .	75 "
248. — <i>argyræa</i> . . . . .	2 "
524. — <i>aureo-maculata</i> . . . . .	2 à 15 "
494. — <i>celatocaulis</i> (FLORE, XXIII, 133) . . . . .	4 à 10 "
Très-singulière Aroïdée grimpante, à feuilles d'un vert sombre, imbriquées, recouvrant entièrement la tige.	
251. — <i>pentaphylla</i> . . . . .	3 à 10 "
4049. <i>Richardia africana</i> ( <i>Calla æthiopica</i> ) 1 "	
Feuilles d'un vert luisant, grande spathe d'un blanc pur, odorantes. En pots.	
4050. — <i>albo-maculata</i> (n) (FL., XXI, 165), en pots . . . . .	1 "
Feuilles d'un vert foncé, vernissé, tout couvert de mouchetures blanches; fleurs en cornet, d'un blanc pur, d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison. Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs.	

	Fr. C.
525 <i>Schismatoglottis crispata</i> . . . . .	5 "
543. — <i>purpurea</i> . . . . .	5 à 10 "
526. — <i>Robeleni</i> . . . . .	3 à 150 "
256. <i>Spathiphyllum heliconiæ-folium</i> , fort . . . . .	40 "
495. — <i>Ortgiesi</i> . . . . .	10 à 25 "
423. <i>Steudnera colocasiæfolia</i> . . . . .	2 "
Feuilles peltées-cordiformes, d'un vert bleuâtre.	
58. <i>Xanthosoma albo-violaceum</i> . 3 à 5 "	
271. — <i>appendiculatum</i> . . . . .	2 "
389. — <i>Lindenii</i> ( <i>Phyllotænium</i> ). 3 à 200 "	
Imposante Aroïdée très-ornementale, d'un port compacte, à feuilles grandes oblongues-sagittées, d'un vert brillant entièrement veiné de blanc argenté.	
273. — <i>utile</i> . . . . .	2 "
70. — <i>violaceum</i> . . . . .	2 à 5 "

## BÉGONIAS TUBÉREUX.

	Fr. C.
155. <i>diversifolia</i> . . . . .	50 "
780. <i>Martiana gracilis</i> ( <i>Lemoine</i> ). . . . .	50 "
les douze . . . . .	5 "
Nouvelle espèce atteignant 60 centimètres de hauteur et formant un buisson bien ramifié dès la base; chaque ramille se	

garnit de fleurs larges, imbriquées, d'un rose brillant. Excellente acquisition pour corbeilles d'été et pour le marché.	
	Fr. C.
140. <i>Pearci</i> . . . . .	50 "
231. — <i>superba</i> . . . . .	75 "
174. <i>Wiltoniana</i> . . . . .	50 "

## BÉGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES.

Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liège, Lille, Tournai, etc.

Les amateurs de Bégonias tubéreux qui ont visité notre Établissement pendant l'été, ont vu en pleine floraison, en pleine terre, les admirables variétés que nous avons obtenues de semis; ces plantes ont un très beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre. Dans les variétés on rencontre des coloris très-différents: le blanc, le chamois, le jaune, l'orange, le saumon, l'amarante, le carmin, le cramoisi, l'écarlate, le grenat, l'incarnat, le nacarat, le pourpre, le rose, le vermillon et toutes les nuances intermédiaires; mais les mélanges sont de coloris uniformes.

Comme nous avons soin de prendre nos porte-graines dans l'élite de notre collection, il en résulte que nos mélanges deviennent chaque année de plus en plus beaux et c'est dans ces mélanges ainsi obtenus que nous choisissons les plantes les plus remarquables pour en faire des variétés.

CULTURE. — On empote les tubercules dès le mois de mars, et on les place sur couche tiède, sous châssis, dans du vieux terreau; ils s'y établissent et sont prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleurissent pendant les cinq mois de la belle saison. On les garde l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de zéro, à la manière des Glaiéuls, etc.

Pour les noms des variétés de la première et de la troisième série, voir Catalogue 226, pages 70 et suivantes.

### PREMIÈRE SÉRIE. — VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES.

12 variétés, avec noms, à notre choix . . . 12 francs.



## DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1887.

1 variété au choix de l'amateur . . . . . 5 francs  
 Les 6 variétés. . . . . 25 "

1129. D<sup>r</sup> D. Marq (*L. Van Houtte*).

Très-grande fleur bien ronde, rouge cerise.

1143. Comte Lejeas ( " ).

Fleur relativement petite mais bien faite, d'un beau jaune d'or lavé de rose sur le bord des pétales.

1144. M. Lecerf ( " ).

Grande fleur d'un beau rose lavé de blanc.

1178. Mad. Lacaille (*L. Van Houtte*).

Très-grande fleur rouge cerise brillant.

1180. Mad. Westenius ( " ).

Grande fleur, de très-belle forme, cramoisi foncé.

1207. J. Zagallo Iharis ( " ).

Fleur de belle forme ronde et bien érigée, jaune canari brillant.

BÉGONIAS TUBÉREUX à fleurs simples, en beau mélange, ayant déjà fleuri.

Rouges. — *Les douze* : fr. 3-50. — *Les vingt-cinq* : 6 francs. — *Les cinquante* : 10 francs. — *Le cent* : 16 francs. — *Le mille* : 125 francs.

Roses. — *Les douze* : fr. 3-50. — *Les vingt-cinq* : 6 francs. — *Les cinquante* : 10 francs. — *Le cent* : 16 francs.

Rouges et roses mêlés. — *Les douze* : 3 francs. — *Les vingt-cinq* : 5 francs. — *Les cinquante* : 8 francs. — *Le cent* : 14 francs. — *Le mille* : 100 francs.

## TROISIÈME SÉRIE. — VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES.

12 variétés, avec noms, à notre choix : 30 francs.

## QUATRIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS A FLEURS DOUBLES DE 1887.

Pièce : 7 francs.

1249. M. Max Singer (*L. Van Houtte*).

Grande fleur très-double, vermillon orangé clair, pétales intérieurs fimbriés.

1103. D<sup>r</sup> Eugène Azam ( " ).

Grande fleur bien double, rouge cerise brillant.

1117. Aristakes Azarian Effendi ( " ).

Grande fleur double, bien ronde, vermillon vif.

1185. Raymondo Taminz ( " ).

Fleur moyenne, double, bien érigée, forme camellia, jaune soufre.

1202. Mad. Max Singer ( " ).

Très-grande fleur double en pompon, blanc carné flammé de rose; magnifique variété.

1204. Mad. Marc Bazille (*L. Van Houtte*).

Très-grande fleur double à pétales régulièrement imbriqués, blanc pur, centre légèrement teinté de jaune d'or.

1205. Bernier d'Hongerswal ( " ).

Grande fleur double bien érigée, carmin clair, pétales intérieurs fimbriés.

1218. Emile Rodecq ( " ).

Grande fleur double à pétales intérieurs francés, ocre rouge mat.

1219. Professeur Carnoy ( " ).

Grande fleur double rose vif, très-florifère.

1245. Baron von Hake ( " ).

Fleur moyenne, bien érigée, double, légèrement imbriquée, jaune canari.

BÉGONIAS TUBÉREUX à fleurs doubles, en superbe mélange.

Jaunes. — *Les douze* : 16 francs.

Rouges et Roses. — *Les douze* : 12 francs. — *Les vingt-cinq* : 20 francs. — *Les cinquante* : 35 francs.

— *Le cent* : 60 francs.

## BÉGONIAS SEMI-DOUBLES, en beau mélange.

*Les douze* : fr. 2-50. — *Les vingt-cinq* : 4 francs. — *Les cinquante* : 7 francs. — *Le cent* : 12 francs. — *Le mille* : 90 francs.

Les Bégonias semi-doubles se doublent parfois entièrement, dès la deuxième année de culture.



## BEGONIA DISCOLOR-REX.

Cette nouvelle race de Bégonias, issue d'un heureux croisement entre le *Begonia discolor* et les variétés à beau feuillage du *Begonia Rex*, que l'on cultive en serre tempérée, a fait sensation dans le monde horticole. Elle participe des qualités essentielles des deux parents : elle a la vigueur, le port élégant et la floraison du *Begonia discolor*, avec le beau feuillage panaché des variétés du *Begonia Rex*.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 9 francs.

544. W. E. Gumbleton,	948. M. Della Porta.
545. Comtesse Gabrielle de Clermont Tonnerre.	951. Mad. Van Damme.
740. Éd. Pynaert.	955. Henri Vilmorin.
743. Mad. J. Ménoreau.	956. Mad. Dauvesse.
804. Mad. Charles Weber.	957. M. Justinien Bretonneau.
806. Baron A. de Vrière.	958. Président Belle.
807. Directeur C. V. Effner.	959. Président de la Rocheterie.
808. Mad. Prosper Dommer.	963. Comtesse de Montesquiou.
809. Dauvesse.	965. Léopard.
811. Fratelli Ferrario.	968. Viviand-Morel.

## BÉGONIAS HERBACÉS.

*A feuilles panachées, marbrées, maculées, sablées, etc.*

Ces Bégonias, à rhizomes rampants, offrent de larges feuilles d'une grande richesse de formes et de coloris ; ce sont de vraies plantes d'amateur, extrêmement ornementales, et qui ne devraient manquer dans aucune serre.

	Fr. C.		Fr. C.
1091. <i>Begonia alba pieta</i> . . . . .	2 "	1194. <i>Begonia</i> Mad. Fanny Massange	1 50
934. — Comtesse Louise Erdödy . . . . .	2 "	341. — Otto Forster . . . . .	3 "
1196. — Gloire de Sceaux . . . . .	2 50	1191. — rubella . . . . .	2 "
1153. — Gogoensis . . . . .	2 "		

NOUVEAUTÉS. — Les douze : 24 francs.

1250. Charles Louis.	1260. Pavonia.
1251. Mad. Alphen.	1261. Aurélie.
1252. Stellata.	1262. Maya.
1253. Le Zèbre.	1263. Madem. Verlot.
1254. Mad. Eyen.	1264. Mrs. Duplessis.
1255. Mad. Ziegler.	1265. Mad. Paté.
1256. Beerschoten.	1266. Le sage.
1257. Le Poussin.	1267. Jeanne d'Arc.
1258. Mad. Lothar-Strassner.	1268. Mad. Bambert.
1259. Emeraude.	1269. Henriette Lusseau.

## BÉGONIAS SEMI-LIGNEUX.

	Fr. C.		Fr. C.
189. hybrida multiflora . . . . .	1 "	168. Laura . . . . .	1 "
321. Globula nivis . . . . .	2 "	381. Limminghei . . . . .	2 "
952. Olbia . . . . .	2 "	830. metallica . . . . .	1 "
962. <i>Marguerite</i> . . . . .	2 "	831. — fol. var. ( <i>Marie Kraus</i> ) . . . . .	2 "
340. argyrostigma gigantea . . . . .	2 "	1167. mira . . . . .	2 "
Espèce brésilienne à feuilles pointillées de blanc argenté ; très-belle hampe garnie de fleurs rouges.		1192. Semperflorens Ameliæ . . . . .	2 "
829. Bruanti . . . . .	2 "	1079. — gigantea carminea . . . . .	2 "
Espèce naine excessivement florifère, toujours couverte de petits fleurons blancs ; bonne acquisition pour les bouquets.		1080. — — rosea . . . . .	2 "
480. corallina . . . . .	2 "	1166. B. Wettsteini . . . . .	2 "
815. Diadema . . . . .	2 "	1294. Arthur Malet . . . . .	10 "
Espèce très-distincte, à feuilles digitées d'un vert sombre, maculé et pointillé de blanc argenté très-éclatant.			

## BROMÉLIACÉES.

Les **Broméliacées** sont aujourd'hui en grand honneur, et c'est justice; ce sont d'admirables plantes qui décorent aussi luxueusement les serres tempérées que les appartements, où elles trouvent un milieu approprié à leur nature. Leur port distingué, leur feuillage ornemental, panaché ou zébré chez bon nombre d'espèces, leurs épis de fleurs singulières, diversement colorées et accompagnées presque toujours de bractées des teintes les plus vives, les font rechercher avidement par les amateurs. Ce sont de précieuses plantes de collection, d'une culture facile.

	Fr. C.		Fr. C.
2. <i>Æchmea cærulescens</i> . . . . .	3 à 5 "	73. <i>Crypthanthus acaulis</i> . . . . .	2 "
1. — <i>coelestis</i> ( <i>Hyplophytum</i> ) . . . . .	4 "	115. — — <i>ruber</i> . . . . .	2 "
117. — <i>distiacaantha</i> . . . . .	4 "	179. — <i>Beuckerii</i> . . . . .	3 "
118. — <i>fulgens</i> . . . . .	5 "	178. — <i>Lacerdæ</i> . . . . .	3 "
119. — — <i>glomerata</i> . . . . .	5 "	74. <i>Echynostachys Pineliana</i> . . . . .	4 "
71. — <i>Melinoni</i> . . . . .	5 "	128. <i>Eneholirion corallinum</i> . . . . .	3 à 5 "
120. — <i>miniata</i> . . . . .	3 "	75. — <i>Jongh-i</i> . . . . .	10 à 25 "
135. — <i>Regina Amalia, fort</i> . . . . .	10 à 20 "	133. — <i>roseum</i> var. . . . .	10 "
37. — <i>spectabilis</i> . . . . .	4 à 10 "	77. — <i>Saundersii</i> . . . . .	2 à 5 "
4. — <i>Weilbachii</i> . . . . .	3 "	Magnifique Broméliacée à beau feuillage d'un blanc argenté,	
203. <i>Ananassa cochinchinensis, fort</i>		60. — <i>speciosum, fort</i> . . . . .	15 "
	25 à 50 "	183. <i>Guzmannia Devansayana</i> . . . . .	5 à 10 "
7. — <i>sativa foliis variegatis</i> . . . . .	15 à 50 "	29. — <i>fragans</i> . . . . .	5 à 30 "
158. <i>Anoplophytum subulatum</i> . . . . .	5 "	78. — <i>tricolor</i> (FLORE, IX, 159) . . . . .	3 à 6 "
8. <i>Billbergia amoena</i> . . . . .	3 "	Epi dressé de grandes bractées squamiformes, imbriquées, dont les supérieures brillent du vermillon le plus vif; le reste offre des panachures violacées sur un fond vert; fleurs blanches sortant des écailles et complétant, par leur teinte neigeuse, le triple coloris de l'ensemble.	
129. — <i>Baraquiniana</i> . . . . .	4 "	31. <i>Hechtia glomerata, fort</i> . . . . .	10 "
139. — <i>chlorosticta</i> . . . . .	4 "	141. <i>Hoplophyton calyculatum</i> . . . . .	5 "
130. — <i>gigantea</i> . . . . .	20 à 30 "	166. — <i>Lindeni</i> . . . . .	3 à 6 "
106. — <i>horrida</i> . . . . .	3 "	156. <i>Karatas Plumieri</i> . . . . .	5 à 10 "
175. — <i>hybrida Colleri</i> . . . . .	3 "	195. <i>Lobatia pendiculata</i> . . . . .	3 "
174. — — <i>Joliboisii</i> . . . . .	3 "	185. <i>Nidularium acanthocrater</i> . . . . .	10 à 20 "
172. — — <i>Rhedonensis</i> . . . . .	3 "	32. — <i>agavefolium</i> . . . . .	3 "
Ces trois hybrides sont le produit d'un croisement entre le <i>Billbergia amoena</i> (mère) et le <i>B. Leopoldi</i> (père). Ils partagent des qualités des deux parents et leur sont supérieurs pour le port, la beauté du feuillage et l'éclat des inflorescences. Ils sont dus à M. C. Danzanvilliers, de Rennes.		28. — <i>fulgens</i> ( <i>Guzmannia picta</i> ) . . . . .	5 "
169. — <i>iridifolia</i> . . . . .	2 "	33. — <i>Innocentii</i> . . . . .	3 "
59. — <i>Joinvillei</i> . . . . .	3 "	35. — <i>Meyendorffi</i> . . . . .	2 à 4 "
13. — <i>Leopoldi</i> . . . . .	4 "	134. — <i>maculatum</i> . . . . .	8 "
14. — <i>Liboniana</i> (FLORE, X, 195) . . . . .	2 "	36. — <i>Scheremetieffi</i> . . . . .	4 "
15. — <i>longifolia</i> . . . . .	2 "	46. — <i>triste</i> . . . . .	3 "
16. — <i>melanacantha</i> . . . . .	3 "	116. <i>Pepinia aphelandræflora</i> . . . . .	2 "
17. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	4 "	38. <i>Pholidophyllum zonatum</i> . . . . .	3 "
18. — <i>Quesneliana</i> ( <i>Quesnelia rufa</i> )		167. <i>Pitcairnia Andreana</i> . . . . .	2 "
(FLORE, X, 157) . . . . .	20 "	144. — <i>corallina</i> . . . . .	5 à 15 "
Epi floral présentant le plus agréable mélange des trois couleurs nationales de la France, savoir : sur le fond même des bractées, les diverses nuances du carmin au rose tendre; sur leur disque une poussière argentée, et, parmi les écailles comme autant de saphirs encadrés de rubis et de perles, des corolles du plus vif azur.		85. — <i>imbricata</i> . . . . .	4 "
12. — <i>rhodocyanea</i> . . . . .	4 "	87. — <i>polyanthoides</i> . . . . .	3 "
112. — <i>Skinneri</i> . . . . .	4 "	88. — <i>punicea</i> . . . . .	3 "
22. — <i>thyrsoides</i> . . . . .	3 "	93. — <i>undulata</i> . . . . .	3 "
188. — <i>Windi</i> . . . . .	5 "	94. — <i>undulatifolia</i> . . . . .	5 "
23. — <i>Wiotiana</i> . . . . .	3 "	40. <i>Portea kermesina</i> . . . . .	6 à 10 "
24. — <i>zebrina</i> . . . . .	5 "	42. <i>Pourretia brevifolia</i> . . . . .	3 à 15 "
132. <i>Bromelia Binoti, fort</i> . . . . .	5 à 15 "	151. — <i>dasyliroides</i> . . . . .	3 à 10 "
113. — <i>macrodosa</i> . . . . .	3 "	43. — <i>mexicana</i> . . . . .	2 à 6 "
98. <i>Caraguata lingulata</i> . . . . .	3 "	204. <i>Puya gigas</i> . . . . .	35 "
170. <i>Chevalliera Veitchi</i> ( <i>Æchmea</i> ) . . . . .	4 à 8 "	44. — <i>heterophylla</i> . . . . .	5 "
Superbe espèce nouvelle dont les fleurs sont réunies en un thyrses compacte de fort bel effet.		205. — <i>Pastensis, extra fort</i> . . . . .	50 "
		47. — <i>xanthocalyx</i> . . . . .	5 "
		18. <i>Quesnelia rufa</i> . . . . .	20 "



## Fr. C.

159. *Quesnelia Van Houtteana* . . 10 "

Espèce introduite par l'Établissement; feuillage original, compacte, fortement garni d'épines brunes sur les bords, d'un vert très-foncé, parfois zébré; énorme épi de forme admirable, garni de fleurs tubuleuses, portant un peu de duvet amiantoides; d'un splendide ensemble où le blanc pur, le rouge vif, le bleu de cobalt et le brun forment un tout harmonieux et sans pareil dans les Broméliacées.

176. *Ronnbergia Morreniana* . . 6 à 15 "

Très-jolie Broméliacée à larges feuilles ovales, d'un vert clair et à fortes macules d'un vert noirâtre; épi de fleurs bleues.

198. *Streptocalyx Vallerandi* . . 8 à 15 "48. *Tillandsia bivittata* . . . . . 5 "168. — *complanata* . . . . . 5 à 10 "193. — *fenestralis*, *fort.* . . . . 8 à 40 "27. — *glaucophylla* . . . . . 8 "186. — *ionantha* . . . . . 10 "122. — *Legrellei* . . . . . 5 "114. — *Lindeni*, *fort.* . . . . 15 à 50 "

Charmante espèce à long épi de grandes fleurs d'un suave bleu de cobalt, à bractées d'un rose tendre.

182. — — *vera* . . . . . 35 "

Spathes courtes de couleur rose.

210. — — *var. latispatha* . . . 25 à 50 "

NOUVEAUTE obtenue en 1884 de graines reçues de Costa-Rica.

Feuilles en rosace, de 35 à 40 centimètres de long sur 1 1/2 à 2 cent. de large, gracieusement recourbées, lisses sur les bords et se terminant en pointe, d'un beau vert bronze légèrement strié de pourpre à la base.

Inflorescence en épi fortement comprimé, en ovale allongé de 16 cent. de long sur 7 cent. de large, émergeant du centre des feuilles et pour ainsi dire sans tige. Les bractées sont d'un vert clair sur la partie non fleurie et d'un beau rose chair sur la partie fleurie; les fleurs, qui se présentent en plus grand nombre à la fois que chez le type, sont aussi plus grandes, plus rondes et d'une belle couleur mauve azurée, avec une grande macule blanche au centre.

211. — *macropetala* . . . . . 15 à 40 "138. — *Musica* . . . . . 20 à 100 "

Feuilles en lanier, ployées en gouttière vers le bas, marquées en dessus, sur un fond vert clair, de nombreuses bandes transversales vert foncé, auxquelles correspondent en dessous

autant de bandes noires; fleurs d'un jaune orangé avec le tiers supérieur blanc, sortant de l'aisselle de grandes bractées d'un vermillon vif.

## Fr. C.

206. *Tillandsia Pastuchoffiana*, *extra**fort* . . . . . 50 à 200 "212. — *punctulata* . . . . . 15 "50. — *splendens* (*Vriesea*) (FLORE, II, mai, pl. IV) . . . . . 2 à 5 "

Feuilles lisses, d'un beau vert, marquées en dessus et en dessous de nombreuses zones brunes; fleurs jaunes sortant de l'aisselle de bractées brunes; long épi d'un splendide effet.

207. — — *major* . . . . . 10 "213. — *variegata* . . . . . 15 "126. — *tessellata* . . . . . 6 à 100 "137. — *Zahii* . . . . . 5 "201. *Vriesea amethystina* . . . . . 30 "184. — *Barilleti* . . . . . 8 à 15 "97. — *brachystachys* . . . . . 4 "196. — *Davaleana* . . . . . 6 à 10 "189. — *gladioliflora* . . . . . 10 à 20 "161. — *guttata* . . . . . 6 "

Broméliacée à feuillage vert orné de points bruns régulièrement disséminés en tous sens; fleurs en épi pendant, d'un vert jaunâtre, enveloppées par des bractées roses, farineuses.

192. — *hieroglyphica* . . . . . 3 à 200 "140. — *Hillegeeriana*, *très-fort.* . 100 "

Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille.

191. — *incurvata* . . . . . 4 à 8 "153. — *Malzinei* . . . . . 10 "54. — *psittacina* . . . . . 4 "

Épi de fleurs oranges à extrémité verte, entourées de bractées rouges à la base, jaune dans le haut.

154. — — *aureo vittata* . . . . . 50 "209. — — *scolaris* . . . . . 10 "190. — — *Morreni* . . . . . 15 "

Douze Broméliacées à mon choix 24 "

Plantes de tout premier ordre pour garnir les rochers dans les serres chaudes et tempérées.

## CYCADÉES.

Les *Cycadées* sont des plantes ornementales par excellence. La plupart des espèces de cette famille sont curieuses sous le rapport de leur végétation, et bon nombre d'entre elles sont considérées, à juste titre, comme de premier ordre pour l'ornementation des serres et des appartements. Elles offrent une tige unique, garnie, à son sommet et en couronne, de grandes feuilles ornées d'un très-grand nombre de folioles raides, épaisses. Les Cycadées sont de riches pendants aux Palmiers, auxquels on les associe avantageusement pour la décoration des serres et des jardins d'hiver.

## Fr. C.

31. *Cycas Boddami* (*gracilis glauca*) 10 à 50 "2. — *circinalis* . . . . . 10 à 2000 "57. — *commorensis*, *fort.* . . . . 15 à 50 "49. — *madagascariensis* . . . . . 10 à 75 "3. — *media* . . . . . 10 à 200 "14. — *Neo-Caledonica* . . . . . 3 à 10 "4. — *revoluta* . . . . . 3 à 100 "

L'Établissement possède une grande quantité d'exemplaires de toutes dimensions, avec belles couronnes; prix et force par correspondance.

47. *Macrozamia horrida* . . . . . 15 à 40 "17. — *plumosa*, *fort.* . . . . 40 "

L'une des espèces les plus gracieuses du genre, n'atteignant pas de fortes dimensions.

## Fr. C.

60. *Zamia Frederici Wilhelmi* . . 25 à 50 "51. — *Lehmani* . . . . . 10 à 150 "53. — — *glauca* . . . . . 25 à 100 "8. — *Mac Kenziei* (*Macrozamia*) . 2 à 5 "28. — *Miqueli* . . . . . 5 "27. — *Perowskiana* (*Denisoni*) . . 15 à 35 "63. — *pumila* . . . . . 25 "55. — *Skinneri ovata* . . . . . 15 à 75 "38. — *Van Houttei* . . . . . 25, 50 à 150 "

Espèce à très-larges feuilles.

13. — *villosa* . . . . . 25 à 100 "

## CYRTANDRACÉES.

Cette famille confine de très-près à celle des *Gesnériacées* ; les fleurs ressemblent assez à celles des *Tydaea*. Ce sont des plantes, la plupart volubiles, qu'on peut mettre dans des vases suspendus, ou faire grimper le long des murs.

	Fr. C.		Fr. C.
7. <i>Æschynanthus</i> Boschianus. . . . .	2 "	11. <i>Æschynanthus</i> splendidus. . . . .	2 "
1. — cordifolius . . . . .	2 "	5. — tricolor . . . . .	2 "
1. — javanicus . . . . .	2 "	6. — zebrianus. . . . .	2 "
9. — Lobbianus . . . . .	2 "	† <i>Didymocarpus</i> argenteo-maculatus 3 "	
2. — longiflorus . . . . .	2 "	<i>Streptocarpus</i> caulescens. . . . .	2 "
3. — ramosissimus . . . . .	2 "		

## FOUGÈRES.

DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

## (FILICES).

Les *Fougères*, par leur frondaison si pittoresque, si diversifiée et toujours également gracieuse dans les nombreux genres et les innombrables espèces, sont un ornement perpétuel pour les serres et les jardins d'hiver.

N. B. Les *Fougères* de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucun signe ; celles de SERRE FROIDE sont précédées d'une croix (†) ; enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par un astérisque (\*).

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront données par correspondance.

Acrophorus PRESL.	Fr. C.	Adiantum L.	Fr. C.
298. hemipterus M. . . . .	2 "	471. Luddemannianum. . . . .	3 "
Acrostichum L.		135. macrophyllum Sw. . . . .	2 "
600. drynarioides . . . . .	8 "	543. mundulum M. . . . .	2 "
524. villosum Sw. . . . .	2 à 10 "	Mignonne Fougère atteignant rarement 15 centimètres de hauteur, à frondes non retombantes, d'un vert foncé, très-propre pour garnitures de bouquets, etc.	
Adiantum L.		367. polyphyllum WILLD. . . . .	2 à 5 "
548. Bausei . . . . .	1 "	576. rhodophyllum . . . . .	2 à 4 "
122. †Capillus Veneris L. . . . .	1 "	311. rubellum . . . . .	2 "
365. † — — amabile . . . . .	1 "	316. Sanctæ Catharinæ. . . . .	2 "
328. † — — crispulum . . . . .	1 "	331. Veitchii. . . . .	2 "
366. † — — undulatum . . . . .	2 "	342. velutinum M. . . . .	5 "
589. Collisii. . . . .	8 "	496. venustum DON. . . . .	2 "
123. concinnum . . . . .	2 "	590. Weigandi. . . . .	3 "
126. — latum M. . . . .	1 "	517. Williamsii . . . . .	2 "
128. †cuneatum LANGSD et FISCH. . . . .	1 "	Alsophila R. Br.	
577. — deflexum. . . . .	2 "	140. †*australis R. Br. . . . .	1 à 25 "
369. curvatum KLEFS . . . . .	5 "	141. †*elegans MART. . . . .	5 à 25 "
542. dissectum . . . . .	2 "	142. †*excelsa R. Br. . . . .	2 "
581. dolabriforme . . . . .	2 "	559. †*Rebecca . . . . .	5 "
487. Edgeworthii Hook . . . . .	2 "	Gracieuse Fougère arborescente de l'Australie. Tronc très-mince, frondes elliptiques, bipennées, d'une texture solide et à surface glabre. L'ensemble est des plus distingués.	
340. excisum Leyl . . . . .	2 "	426. †*Van Geerti . . . . .	5 à 30 "
129. — multifidum M. . . . .	2 "	565. †*Williamsii . . . . .	5 "
130. farleyense M. (FLORE, XIX, 9) . . . . .	3 "	Anemia Sw.	
Charmante Fougère dont le feuillage est d'une rare élégance et d'une extrême légèreté.		430. †Phyllitidis Sw. . . . .	2 "
440. Funckii . . . . .	3 "	Angiopteris HOFFM.	
424. gracillimum . . . . .	1 "	149. longifolia DEVR. . . . .	.5 à 600 "
les douze. . . . .		150. macrophylla HORT. . . . .	.5 à 100 "
425. bispidulum Sw. . . . .	1 "		
564. Legrandi . . . . .	2 "		



	Angiopteris HOFFM.	Fr. C.
151.	pruinosa KZE. . . . .	.5 à 500 "
152.	Verschaffelti HORT. . . . .	.5 à 100 "
	<b>Antigramma PRESL.</b>	
380.	rhizophylla SM. . . . .	. . . 4 "
	<b>Aspidium Sw.</b>	
593.	melanocaulis . . . . .	.10 à 25 "
202.	†Sieboldi . . . . .	. . . 1 à 2 "
	<i>les douze . . . . .</i>	. . . 9 à 18 "
	<b>Asplenium SWARTZ.</b>	
153.	alatum HUMB. et BP. . . . .	. . . 2 à 5 "
155.	†dimorphum KZE. . . . .	. . . 2 à 10 "
497.	†Hookerianum COLENSO. . . . .	. . . 1 "
265.	Nidus L. . . . .	. . . 2 "
371.	normale DON. . . . .	. . . 2 "
381.	†obtusatum FORST. . . . .	. . . 2 "
162.	†Veitchianum M. ( <i>Bellangeri</i> ) . . . . .	. . . 2 "
302.	†viviparum PRESL. . . . .	. . . 2 "
	<b>Athyrium ROTH.</b>	
164.	†decurtatum PRESL. . . . .	. . . 2 à 5 "
	<b>Balantium KLFs.</b>	
180.	††antarcticum PRESL. . . . .	. . . 2 à 5 "
	<b>Blechnum L.</b>	
165.	††brasiliense DESV. . . . .	. . . 1 à 5 "
499.	pulchellum . . . . .	. . . 10 "
	<b>Campyloneuron PRESL.</b>	
317.	decurrens PRESL. . . . .	. . . 2 "
	<b>Cheilanthes Sw.</b>	
169.	elegans . . . . .	. . . 3 "
	<b>Cibotium KLFs.</b>	
170.	††princeps LINDL., <i>forts.</i> . . . . .	. . . 2 à 50 "
171.	††regale M. . . . .	. . . 3 à 40 "
172.	††Schiedei . . . . .	. . . 3 "
	<b>Cyathea SM.</b>	
428.	††Burkei, <i>forts troncs</i> . . . . .	. . . 100 à 550 "
	<i>— jeunes plantes</i> . . . . .	. . . 5 à 10 "

L'une des plus belles Fougères arborescentes de serre froide. Le tronc, fort et droit, est couronné d'un riche ensemble de frondes d'un vert foncé, très-gracieusement retombantes.

582.	††Cunninghamii. . . . .	. . . 250 à 400 "
	<i>Très-rare.</i>	
175.	††dealbata Sw. . . . .	. . . 2 à 500 "
303.	††medullaris, <i>forts</i> . . . . .	. . . 2 à 25 "
	<i>Imposante Fougère à pétioles noirs.</i>	
445.	††Smithii . . . . .	. . . 5 à 75 "
	<b>Davallia SM.</b>	
177.	†canariensis SM. . . . .	. . . 2 "
560.	†elegans polydactylon . . . . .	. . . 10 "
559.	†jiensis plumosa . . . . .	. . . 5 à 15 "
594.	†japonica, <i>fort.</i> . . . . .	. . . 2 à 5 "
538.	†Mariesii. . . . .	. . . 3 à 25 "
312.	†Moorei HOOK. . . . .	. . . 3 "
463.	††Novae-Zelandiae COLENSO . . . . .	. . . 2 "
	<b>Dicksonia PHÉRIT.</b>	
180.	††antarctica LABILL. . . . .	. . . 2 à 5 "
583.	††fibrosa . . . . .	. . . 500 "
584.	††Smithii . . . . .	. . . 150 à 500 "
408.	††squarrosa Sw. . . . .	. . . 5 "
	<b>Diplazium Sw.</b>	
184.	†grandifolium Sw. . . . .	. . . 40 "

	Doodia R. BR.	Fr. C.
550.	†caudata R. BR. . . . .	. . . 1 "
551.	†lunulata R. BR. . . . .	. . . 1 "
	<b>Doryopteris FÉE.</b>	
465.	†nobilis M. . . . .	. . . 3 "
	<b>Eupodium J. SM.</b>	
185.	Kaulfussii J. SM. . . . .	. . . 5 à 50 "
	<b>Gleichenia R. BR.</b>	
187.	†dicarpa R. BR., <i>forts</i> . . . . .	. . . 10 "
449.	†rupestris glaucescens, <i>forts</i> . . . . .	. . . 8 à 15 "
188.	†pelunceae R. BR., <i>forts</i> . . . . .	. . . 10 "
	<b>Gymnogramma DESV.</b>	
574.	calomelanos . . . . .	. . . 2 "
190.	chrysophylla Laucheana HORT. . . . .	. . . 2 "
378.	decomposita HORT. . . . .	. . . 2 "
592.	Schyzophylla . . . . .	. . . 2 "
599.	— var. gloriosa . . . . .	. . . 5 à 15 "
273.	Parsoni . . . . .	. . . 2 "
304.	sulphurea . . . . .	. . . 2 "
386.	tartariaca DESV. . . . .	. . . 2 "
195.	Wettenhalliana M. . . . .	. . . 2 "
349.	— Flandriae . . . . .	. . . 2 "
	<b>††Hemitelia.</b>	
585.	Smithii . . . . .	. . . 125 à 500 "
	<b>Hymenodium FÉE.</b>	
198.	crinitum FÉE (FLORE, IX, 203) . . . . .	. . . 10 "
	<b>Lastrea BORY.</b>	
443.	†aristata Sw. . . . .	. . . 2 "
519.	† — variegata . . . . .	. . . 2 "
	<i>Une des plus jolies Fougères à feuillage panaché; feuilles charnues, d'un riche vert foncé avec une bande d'un vert jaunâtre pâle au milieu de chaque pinnule.</i>	
595.	†Fortunei . . . . .	. . . 5 "
	<b>Litobrochia PRESL.</b>	
501.	†vespertilionis PRESL. . . . .	. . . 2 "
	<b>Lomaria WILLD.</b>	
567.	†corcovadensis. . . . .	. . . 2 "
217.	†Patersoni SPRENG. . . . .	. . . 2 "
	<b>Marattia SM.</b>	
219.	Laucheana HORT. . . . .	. . . 5 à 50 "
586.	Mooreana . . . . .	. . . 50 "
	<b>Microlepia PRESL.</b>	
485.	†hirta cristata. . . . .	. . . 3 à 125 "
221.	†strigosa M. . . . .	. . . 1 à 5 "
	<b>Nephrodium RICH.</b>	
222.	†molle corymbiferum M. . . . .	. . . 2 "
	<b>Nephrolepis SCHOTT.</b>	
591.	Bausei . . . . .	. . . 5 "
510.	†davallioides furcans . . . . .	. . . 4 à 15 "
488.	Duffii . . . . .	. . . 3 "
223.	†neglecta . . . . .	. . . 2 à 5 "
601.	†Phillipinensis . . . . .	. . . 5 "
224.	†undulata J. SM. . . . .	. . . 2 "
	<b>Nipholobolus KLFs.</b>	
390.	Lingua corymbifer M. . . . .	. . . 3 à 5 "
	<b>Onychium KLFs.</b>	
227.	†japonicum KZE. . . . .	. . . 2 "
	<b>Phymatodes PRESL.</b>	
450.	†leiorrhiza WALL. . . . .	. . . 3 à 5 "

<b>Platyserium DESV.</b>	<b>Fr. C.</b>
228. †alcicorne DESV. . . . .	.2 à 100 "
393. † — majus . . . . .	.10 à 75 "
229. biforme BL. . . . .	.10 à 50 "
230. grande . . . . .	.6 à 20 "
598. Hilli . . . . .	.25 "
473. Willinckii . . . . .	.25 à 50 "

<b>Polypodium L.</b>	
307. †albo-punctatum RADD. . . . .	.3 "
533. †angustifolium KZE. . . . .	.2 "
514. falcatum. . . . .	.3 "
321. †glaucum RADD. . . . .	.2 "

Espèce rustique.

<b>Pteris L.</b>	
310. †arguta AIT. . . . .	.1 "
234. †argyræa M., <i>forts</i> . . . . .	.1 à 5 "
235. †eretica albo lineata HOOK. . . . .	.1 "
236. †hirsuta excelsa . . . . .	.2 à 4 "
546. †leptophylla SW. . . . .	.2 "
417. semipinnata L. . . . .	.3 "
239. †serrulata L. . . . .	.1 "
597. † — Dixoni cristata. . . . .	.2 "
477. † — Leyi . . . . .	.1 "
545. — ouvrardi cristata . . . . .	.1 "
308. tricolor (FLORE, VIII, 157) . . . . .	.2 "

**Selaginella PALIS. DE BEAUV.**

244. africana A. BRAUN. . . . .	.2 "
579. amœna . . . . .	.2 "
245. apoda SPRING. . . . .	.1 "
246. atroviridis SPRING. . . . .	.2 "
520. bellula . . . . .	.2 "
573. Brauni . . . . .	.2 "
296. brevipes . . . . .	.2 "
247. cæsia HORT. ( <i>uncinata</i> ) . . . . .	.2 "
278. caulescens SPRING. . . . .	.2 "
280. convoluta SPRING. . . . .	.2 "
281. cuspidata LINK. . . . .	.2 "
282. — elongata SPRING. . . . .	.2 "
249. denticulata LINK. <i>par mètre de longueur</i> . . . . .	.2 "

Selaginelle propre à former des bordures à l'intérieur des serres froides et tempérées.

12 sortes de Fougères de serre chaude, à notre choix, en bonnes plantes : 9 francs.

12 — — — froide, — — — 9 "

<b>Selaginella PARIS. DE BEAUV.</b>	<b>Fr. C.</b>
250. denticulata variegata . . . . .	.1 "
251. dichroa ( <i>flectiana</i> ) . . . . .	.2 "
580. Emiliana . . . . .	.2 "
252. erythropus SPRING. ( <i>umbrosa</i> ) . . . . .	.2 "
571. grandis, <i>extra forts</i> . . . . .	.3 à 50 "
253. Griffithii SPRING. . . . .	.2 "
453. japonica ( <i>involutens</i> ) . . . . .	.3 "
534. Kraussiana aurea . . . . .	.2 "
556. lævigata SPRING. . . . .	.2 "
290. Martensii SPRING. . . . .	.2 "
388. — compacta ( <i>formosa</i> ) . . . . .	.2 "
257. — — foliis argenteo varieg. HORT. . . . .	.2 "
258. microphylla . . . . .	.2 "
578. Pervillei . . . . .	.2 "
259. Poulteri M. . . . .	.2 "
293. rubricaulis HORT. . . . .	.2 "
322. setosa . . . . .	.2 "
522. texta, <i>très-rare</i> . . . . .	.15 "
260. variabilis ( <i>serpens</i> ) . . . . .	.2 "
261. viticulosa KLZ. . . . .	.2 "
262. Wallichii SPRING. . . . .	.2 "
253. Willdenowii HORT. ( <i>pubescens</i> ) . . . . .	.2 "

12 Selaginella en 12 sortes à notre choix. . . . . 12 "

**Selliguea BORY.**

536. Feei . . . . .	.2 à 5 "
<b>Thamnopteris PRESL.</b>	
264. †australasica M. . . . .	.4 à 8 "
265. †nidus PRESL. . . . .	.5 "

**Todea WILLD.**

568. †pellucida ( <i>hymenophylloïdes</i> ) . . . . .	.5 "
521. †plumosa, <i>fort.</i> . . . . .	.10 à 50 "

Fougère excessivement élégante, d'un port compacte, de petite stature, à frondes courtes, recourbées, ainsi que les pinnales.

267. †superba COLENSE . . . . .	.5 à 50 "
---------------------------------	-----------

**Trichomanes L.**

268. †radicans Sw., <i>fort.</i> . . . . .	.10 à 75 "
535. Woodwardia angustifolia . . . . .	.2 "

**GESNÉRIACÉES.**

Les *Gesnériacées* ci-après ont un tout autre caractère que celles qui se trouvent énumérées et décrites dans notre Catalogue n° 226, page 58 et suivantes, qui toutes ont des rhizomes ou des tubercules se conservant à l'état sec pendant l'hiver, tandis que celles indiquées ci-dessous gardent leur végétation en tout temps, à l'exception des *Gesneria Donchelaariana*, qui conservent leurs tiges, mais perdent leurs feuilles.

	<b>Fr. C.</b>
<b>Alloplectus bicolor</b> . . . . .	.2 "
<b>Centrosolenia ænea</b> . . . . .	.2 "
Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique en dessus, violet lile de vin en dessous.	
— bullata . . . . .	.3 "
<b>Columnnea Kalbreyeriana.</b> . . . .	.3 "
— scandens . . . . .	.2 "

	<b>Fr. C.</b>
<b>Columnnea Schiedeana.</b> . . . .	.2 "
Longues fleurs jaunes panachées de brun.	
<b>Cyrtodeira cuprea.</b> . . . .	.2 "
— fulgida . . . . .	.2 "
— metallica . . . . .	.1 "
Feuilles veloutées d'un vert brunâtre, avec la partie médiane blanchâtre; jolies petites fleurs d'un écarlate vif.	



## Fr. C.

*Drymonia Turrialvæ* . . . . . 3 "   
 Feuilles crénelées, irrégulièrement gaufrées, d'un vert foncé à reflet blanchâtre en dessus, rouges en dessous; fleurs en grappes, à calice d'un rouge brique et à ample corolle blanche.

*Episcia Luciani* . . . . . 2 "   
 Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert noirâtre vers le milieu du limbe, s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords, à grandes fleurs d'un rouge vif.

90. *Gesneria Donckelaariana* (FL., IX, 119) . . . . . 5 "   
 La plus riche de floraison et de coloris des *Gesneria*. Feuilles grandes, d'un beau vert foncé; tiges et pétioles d'un rouge noirâtre; fleurs grandes, d'un carmin vif, à gorge jaunâtre.

114. — *Millisi* . . . . . 3 "   
 115. — *pyramidalis* . . . . . 5 "   
 2154. — *Gloxinia gesnerioides* . . . . . 2 "

## Fr. C.


57. *Locheria magnifica* (FL., X, 117). 1 "   
 Fleur à limbe très-large, du cramoisi le plus vif, élégamment panaché de lignes et de macules pourpre noirâtre.

*Moussonia elegans* . . . . . 2 "

*Pearcea hypocyrtidiflora* (FLORE, XVII, 85) . . . . . 3 "   
 Espèce d'un beau port, à beau feuillage, à élégantes fleurs presque globuleuses, d'un rouge minium en dessus, jaune d'or en dessous.

*Sinningia purpurea* . . . . . 2 "

*Tapeinotes Carolinæ* (FLORE, XVIII, 43) . . . . . 3 "   
 Feuilles très-grandes, vertes en dessus, rouges en dessous; fleurs très-curieuses, ventruës, couvertes de poils, d'un blanc pur.

 Pour l'énumération, la description et les prix des autres GESNÉRIACÉES à rhizomes et à tubercules, telles qu'ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIA, GESNERIA, GLOXINIA, KOLLIKERIA, NÆGELIA, PLECTOPOMA, REICHSTEINERIA, ROSANOWIA, SCHEERIA, TYDÆA, etc., voir notre Catalogue n° 226, pages 58 et suivantes.

## Fr. C.

1866. *Gloriosa Planti* (*Methonica*) (FLORE, IX, 21) . . . . . " 50

Belles fleurs très-bizarrement conformées, d'une riche teinte capucine sur les divisions, avec les onglets jaunes.

les douze . . . . . 5 "

1867. — *superba* . . . . . 5 à 10 "

## ORCHIDÉES EXOTIQUES.

La vaste et intéressante famille des Orchidées dont les genres, les espèces et les variétés ne se comptent plus et tendent à s'accroître d'une façon prodigieuse, par suite de la chasse continue qui leur est faite par d'intrépides voyageurs dans les diverses régions tropicales et extra-tropicales du globe, et des hybridations dont elles sont l'objet, surtout en Angleterre; cette famille, disons-nous, n'est plus aujourd'hui l'apanage exclusif des privilégiés de la fortune. Depuis quelques années surtout, les Orchidées, jadis réputées plantes aristocratiques par excellence, se sont tellement répandues dans les cultures, qu'on peut dire, en quelque sorte, qu'elles y ont acquis leur droit de bourgeoisie. Il n'est plus de vrais anthophiles, de ceux, du moins, qui ont le feu sacré, qui ne leur aient donné l'hospitalité dans une de leurs serres, quelque modeste qu'elle puisse être, et vraiment, ces brillants représentants de la flore exotique méritent à tous égards, par la bizarrerie et la diversité des formes et des coloris de leurs fleurs, la grande faveur qui a fini par les accueillir, un peu tardivement peut-être, et ne fera que s'accroître dans l'avenir. Aussi l'Établissement a-t-il considérablement accru sa collection, dans le but de pouvoir satisfaire à toutes les demandes, à des prix défiant toute concurrence.

12 Orchidées de serre froide, à notre choix : 75 à 100 francs.

25	—	—	—	150 à 200	"
12	—	—	chaude	100 à 125	"
25	—	—	—	200 à 250	"

Les Orchidées de serre chaude (16° à 20° cent) sont précédées d'un C.

Celles de serre tempérée (10° à 12° cent.) — — T.

Celles de serre froide (6° à 8° cent.) — — F.

## Fr. C.

e *Acampe papilio* . . . . . 6 "   
 t *Acineta Humboldtii* (FL., X, 65) . 10 à 25 "   
 " — *Luddemanniana* . . . . . 10 à 25 "   
 " *Acropera atropurpurea* . . . . . 10 "   
 " — *Loddigesii* . . . . . 15 "

## Fr. C.

f *Ada aurantiaca* . . . . . 8 "   
 c *Aerides affine* . . . . . 10 à 25 "   
 " — *majus* . . . . . 30 "   
 " — *verum* . . . . . 25 "   
 " — *Balantinum* . . . . . 20 "

	Fr. C.		Fr. C.
<i>c</i> <b>Aerides crispum</b> (FLORE, V, 438) 15 à 30 "		<i>t</i> <b>Cattleya Eldorado</b> . . . . . 25 "	
Très-belle espèce fleurissant en longs racèmes de fleurs blanches teintées de rose.		" — <b>splendens</b> . . . . . 35 "	
" — <b>Fieldingi</b> . . . . . 20 à 30 "		" — <b>elegans</b> ( <i>Lælia</i> ) . . . . . 50 "	
" — <b>Houlletianum</b> . . . . . 25 "		" — <b>Gaskelliana</b> . . . . . 10 à 30 "	
" — <b>Leeanum</b> . . . . . 20 à 40 "		" — <b>gigas</b> . . . . . 20 à 40 "	
" — <b>Lawrenceanum</b> . . . . . 25 "		" — <b>guttata</b> Leopoldi (FLORE, XIV, 209) . . . . . 15 à 30 "	
" — <b>odoratum</b> . . . . . 15 à 30 "		" — <b>Harrisoniana</b> . . . . . 8 "	
" — <b>quinquevulnerum</b> . . . . . 15 "		" — <b>intermedia</b> . . . . . 10 à 20 "	
" — <b>Rohanianum</b> . . . . . 25 "		" — <b>labiata</b> (FLORE, XVIII, 115) . 25 à 50 "	
" — <b>Sanderianum</b> . . . . . 25 "		" — <b>Percivaliana</b> . . . . . 15 à 30 "	
" — <b>roseum</b> . . . . . 15 "		" — <b>Warnerii</b> . . . . . 15 à 25 "	
" — <b>Thibautianum</b> . . . . . 25 "		" — <b>Lawrenciana</b> . . . . . 15 à 25 "	
" — <b>virens</b> Dayanum . . . . . 40 "		" — <b>Luddemanniana</b> . . . . . 30 "	
" <b>Angræcum Leonii</b> . . . . . 15 "		" — <b>Mendelii</b> . . . . . 20 à 40 "	
" — <b>sesquipedale</b> (FL., XIV, 49) 50 à 100 "		" — <b>Mossiae</b> . . . . . 8 à 50 "	
<i>f</i> <b>Anguloa Clowesii</b> . . . . . 10 à 25 "		" — <b>Perrinii</b> ( <i>Lælia</i> ) . . . . . 10 à 40 "	
" — <b>Ruckeri</b> . . . . . 50 "		Belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.	
" — <b>sanguinea</b> . . . . . 75 "		" — <b>Pineli</b> . . . . . 15 à 25 "	
Variété extra.		" — <b>marginata</b> . . . . . 30 "	
" — <b>unidora</b> . . . . . 15 "		" — <b>præstans</b> ( <i>Lælia</i> ) (FLORE, XVIII, 127) . . . . . 15 à 30 "	
<i>c</i> <b>Anæctochilus chlorophrys</b> ( <i>Microstylis</i> ) . . . . . 5 "		" — <b>purpurata</b> ( <i>Lælia</i> ) (FLORE, XI, 133) . . . . . 15 à 100 "	
" — <b>pulcher</b> ( <i>Nephelaphyllum</i> ) . . . . . 5 "		" — <b>alba</b> , <i>fort.</i> . . . . . 75 "	
<i>f</i> <b>Arpophyllum giganteum</b> . . . . . 15 à 35 "		" — <b>Rœzlii</b> . . . . . 35 "	
<i>f</i> <b>Battemania Burtii</b> . . . . . 30 "		" — <b>Sanderiana</b> . . . . . 25 à 50 "	
<i>f</i> <b>Bletia Gebinæ</b> . . . . . 10 "		" — <b>Schilleriana</b> . . . . . 10 "	
" — <b>Shepherdii</b> . . . . . 10 "		" — <b>Schröderii</b> . . . . . 20 "	
<i>t</i> <b>Brassavola Digbyana</b> (FLORE, III, 237) . . . . . 15 à 25 "		" — <b>Skinneri</b> . . . . . 15 à 40 "	
" — <b>fragrans</b> . . . . . 15 "		" — <b>superba splendens</b> . . . . . 20 "	
" — <b>nodosa</b> . . . . . 10 "		" — <b>Trianae</b> . . . . . 10 à 30 "	
" — <b>Perrinii</b> . . . . . 15 "		" — <b>Papayan</b> . . . . . 15 à 30 "	
" <b>Brassia brachyata</b> . . . . . 15 à 25 "		" — <b>velutina</b> . . . . . 20 "	
" — <b>guttata</b> . . . . . 15 "		" — <b>Warszewiczii</b> . . . . . 30 "	
" — <b>Keiliana</b> . . . . . 15 "		<i>f</i> <b>Chysis lævis</b> . . . . . 25 "	
" — <b>verrucosa</b> . . . . . 10 à 15 "		<i>t</i> <b>Celia macrostachya</b> . . . . . 5 à 15 "	
" — <b>major</b> . . . . . 20 "		" <b>Cœlogyne cristata</b> (FLORE, XVII, 163) . . . . . 8 à 50 "	
" <b>Calanthe luteo-aculeata</b> . . . . . 15 "		<i>c</i> — <b>Lemoïniana</b> . . . . . 50 "	
" — <b>oculata grandiflora</b> . . . . . 15 "		<i>t</i> — <b>maxima</b> . . . . . 75 "	
" — <b>gigantea</b> . . . . . 15 "		<i>t</i> — <b>lagenaria</b> ( <i>Pleione</i> ) (FL., XXIII, 37) . . . . . 10 "	
" — <b>Regnieri</b> . . . . . 15 "		" — <b>flaccida</b> . . . . . 10 "	
" — <b>Veitchii superba</b> . . . . . 10 "		" — <b>Massangeana</b> , <i>fort.</i> . . . . . 200 "	
" — <b>veratrifolia</b> . . . . . 15 "		" — <b>ocellata</b> . . . . . 20 "	
" — <b>vestita</b> (FLORE, VIII, 181) . . . . . 10 "		<i>t</i> <b>Colax jugosus</b> . . . . . 10 à 20 "	
" — <b>grandiflora</b> . . . . . 15 "		" — <b>viridis</b> . . . . . 10 "	
" — <b>rosea</b> . . . . . 15 "		" <b>Comparetia rosea</b> . . . . . 15 "	
" — <b>rubra</b> . . . . . 15 "		" <b>Cymbidium aloifolium</b> . . . . . 5 à 15 "	
" <b>Cattleya Aclandiae</b> . . . . . 15 "		<i>f</i> — <b>caniculatum</b> , <i>fort.</i> . . . . . 5 à 10 "	
" — <b>amethystiglossa</b> , <i>fort.</i> . . . . . 15 à 25 "		<i>t</i> — <b>eburneum</b> . . . . . 10 à 20 "	
" — <b>amethystina</b> . . . . . 10 à 25 "		" — <b>grandiflorum</b> . . . . . 10 à 15 "	
" — <b>aurea</b> . . . . . 20 à 40 "		" — <b>Hookerianum</b> . . . . . 10 à 25 "	
" — <b>Bowringiana</b> . . . . . 20 à 50 "		" — <b>longifolium</b> . . . . . 15 à 30 "	
" — <b>chirguensis</b> . . . . . 20 "		<i>t</i> — <b>Lowianum</b> . . . . . 25 à 100 "	
<i>f</i> — <b>citrina</b> (FLORE, XVI, 147) . . . . . 10 à 25 "		" — <b>Mastersii</b> . . . . . 15 à 30 "	
<i>t</i> — <b>crispa</b> ( <i>Lælia</i> ) . . . . . 10 à 100 "		" <b>Cypripedium ænanthum</b> . . . . . 60 à 100 "	
" — <b>Dormaniana</b> . . . . . 10 "		" — <b>superbum</b> . . . . . 150 "	
" — <b>Dowiana</b> (FLORE, XVI, 185) 30 à 50 "			



	Fr. C.
<i>t</i> <i>Cypripedium albanense</i> . . . . .	25 "
<i>f</i> — <i>albo marginatum</i> . . . . .	20 "
" — <i>album</i> . . . . .	100 "
" — <i>amandum</i> . . . . .	200 "
<i>t</i> — <i>Argus</i> . . . . .	10 à 25 "
" — <i>Arthurianum</i> . . . . .	200 "
" — <i>Ashburtoniæ</i> . . . . .	25 à 75 "
" — <i>Augusti Regoieri</i> . . . . .	25 à 50 "
" — <i>barbatum</i> (FLORE, III, 190) . . . . .	5 à 25 "
" — — <i>Crossi</i> . . . . .	20 "
" — <i>grandiflorum</i> . . . . .	10 à 50 "
" — — <i>Warneri</i> . . . . .	40 "
<i>f</i> — <i>Boxalii</i> . . . . .	10 à 25 "
" — <i>atratum</i> . . . . .	25 "
<i>t</i> — <i>Bullenianum</i> . . . . .	5 "
" — <i>calurum</i> . . . . .	25 à 50 "
" — <i>cardinale</i> . . . . .	225 "
" — <i>caudatum</i> ( <i>Selenipedium</i> ) (FLORE, VI, 99) . . . . .	15 "
" — — <i>roseum</i> . . . . .	50 à 175 "
" — <i>ciliolare</i> . . . . .	10 à 25 "
" — <i>concolor</i> (FLORE, XXII, 107). . . . .	20 "
" — — <i>chlorophyllum</i> . . . . .	140 "
" — <i>Dauthieri</i> . . . . .	15 à 50 "
" — <i>Dayanum</i> (FLORE, XV, 55) . . . . .	25 à 40 "
Feuillage bien tacheté. Un des plus beaux du genre.	
<i>c</i> — <i>Dominianum</i> . . . . .	15 à 30 "
<i>t</i> — <i>expansum</i> . . . . .	200 "
" — <i>Druryi</i> . . . . .	15 à 30 "
" — <i>euryandrum</i> (FLORE, XXII, 19) . . . . .	75 "
" — <i>Godefroyæ, vrai</i> . . . . .	50 "
Variété nouvelle, proche parente des beaux <i>Cypripediums niveum, concolor</i> , lesquels elle se distingue par son feuillage et par les remarquables moucheures de ses fleurs blanches, recouvertes dans toutes leurs parties d'un pointillé magenta.	
" — <i>grande</i> . . . . .	75 "
<i>f</i> — <i>Harrisianum</i> (FLORE, XXII, 33) . . . . .	10 à 40 "
<i>t</i> — <i>Haynaldianum</i> . . . . .	15 "
" — <i>Hinksianum</i> . . . . .	20 "
<i>f</i> — <i>hirsutissimum</i> (FLORE, XIV, 97) . . . . .	20 à 150 "
<i>t</i> — <i>Hookeri</i> (FLORE, XV, 125) . . . . .	15 "
<i>f</i> — <i>insigne</i> . . . . .	5 à 50 "
" — — <i>Chantini (violaceum punctatum)</i> . . . . .	20 à 50 "
Magnifique variété dont le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.	
" — — <i>Maulei</i> (FLORE, XV, 123) . . . . .	20 "
<i>c</i> — <i>Javanicum</i> . . . . .	25 "
" — — <i>majus</i> . . . . .	60 "
" — <i>lævigatum</i> (FLORE, XVII, 83) . . . . .	20 à 50 "
<i>t</i> — <i>Lawrenceanum</i> (FLORE, XXIII, 5) . . . . .	10 à 25 "
Nouveau <i>Sabat de Vénus</i> , très-florifère, à fleurs de coloris très-diversifiés.	
" — <i>Leeanum</i> . . . . .	75 à 150 "
" — — <i>superbum</i> . . . . .	125 à 200 "
Issue comme la précédente du <i>C. Spicerianum</i> et du <i>C. insigne</i> cette variété lui est en tout point supérieure comme forme et comme coloris.	
<i>c</i> — <i>Lindenii (Uropedium)</i> . . . . .	50 "

	Fr. C.
<i>t</i> <i>Cypripedium longifolium</i> ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .	10 à 100 "
<i>c</i> — <i>Lowii</i> (FLORE, IV, 375) . . . . .	25 à 50 "
" — <i>marmorophyllum</i> . . . . .	50 "
" — <i>Meirax</i> . . . . .	100 "
" — <i>Morganisæ</i> . . . . .	" "
<i>t</i> — <i>nitens superbum</i> . . . . .	100 "
Variété extra.	
<i>c</i> — <i>niveum</i> . . . . .	10 à 20 "
<i>t</i> — <i>pardium</i> . . . . .	15 "
<i>c</i> — <i>Parishii</i> . . . . .	35 "
" — <i>politum</i> . . . . .	75 "
" — <i>prostrans</i> . . . . .	75 "
<i>t</i> — <i>Regnieri, vrai</i> . . . . .	50 "
<i>c</i> — <i>Robelinii</i> . . . . .	15 à 30 "
<i>t</i> — <i>Roezlii (Selenipedium)</i> . . . . .	10 à 100 "
" — <i>Sallieri</i> . . . . .	125 "
<i>c</i> — <i>Sanderianum</i> . . . . .	25 "
Le labelle ressemble beaucoup par sa forme à celui du <i>C. Stonei</i> mais est d'une couleur bronze verdâtre. Le sépale dorsal est magnifiquement rayé de rouge brun sur un fond vert-jaunâtre et les pétales, qui forment le trait saillant de la fleur, sont rejetés en arrière, puis descendent en spirale et enfin s'allongent, comme ceux du <i>C. caudatum</i> , en rubans de 43 à 60 centimètres.	
<i>t</i> — <i>Schlimii (Selenipedium)</i> (FLORE, XVIII, 153) . . . . .	15 "
" — <i>Schroederii</i> . . . . .	250 "
" — <i>Sedeni</i> . . . . .	20 "
" — — <i>candidulum</i> . . . . .	75 "
Perfectionnement du <i>C. Sedeni</i> . Les sépales et les pétales sont d'un blanc d'ivoire, les premiers veinés de jaune verdâtre pâle les seconds teints de rose vers la pointe; le labelle en forme de pantoufle est rose pâle.	
" — <i>selligerum</i> . . . . .	50 à 100 "
" — <i>majus</i> . . . . .	100 à 150 "
<i>c</i> — <i>Spicerianum</i> . . . . .	20 à 100 "
<i>t</i> — <i>stenophyllum</i> . . . . .	10 à 40 "
<i>c</i> — <i>Stonei</i> (FLORE, XVII, 137). . . . .	15 à 30 "
<i>t</i> — <i>superbiens (Veitchii)</i> (FLORE, XIX, 115) . . . . .	20 à 40 "
" — <i>superciliare</i> . . . . .	20 à 40 "
" — <i>Swanianum</i> . . . . .	35 "
" — <i>Sylhetense</i> . . . . .	20 "
" — <i>Thibautianum</i> . . . . .	500 "
<i>t</i> — <i>toasum</i> . . . . .	25 à 50 "
<i>f</i> — <i>venustum</i> . . . . .	5 à 25 "
<i>t</i> — <i>vernixum</i> . . . . .	20 à 60 "
<i>c</i> — <i>vexillarium</i> . . . . .	75 "
Espèce à grandes fleurs de brillant effet, l'une des plus jolies du genre.	
<i>f</i> — <i>villosum</i> (FLORE, XIV, 223). . . . .	8 à 25 "
Ses fleurs, que l'on compte parmi les plus grandes du genre, sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.	
" — — <i>superbum</i> . . . . .	15 "
" — <i>Warneri</i> . . . . .	40 "
<i>c</i> <i>Cyrtopodium flavum</i> . . . . .	15 "
<i>t</i> <i>Dendrobium barberianum</i> . . . . .	15 à 25 "
" — <i>Cambridgeanum</i> . . . . .	15 à 25 "
" — <i>chrysanthum</i> . . . . .	15 "
" — <i>chrysotoxum</i> . . . . .	10 à 25 "
" — <i>crassinodum Barberianum</i> . . . . .	15 "

	Fr. C.		Fr. C.
c <i>Dendrobium cretaceum</i> (FLORE, VIII, 187) . . . . .	10 à 20 "	t <i>Loelia Pineli</i> . . . . .	10 à 20 "
" — <i>Dearei</i> . . . . .	15 "	" — — <i>marginata</i> . . . . .	30 "
" — <i>densiflorum</i> (FLORE, XIV, 5) 15 à 50 "		" — — <i>purpurata</i> ( <i>Cattleya</i> ) FLORE, XI, 133) . . . . .	15 à 75 "
" — <i>Devonianum</i> . . . . .	15 "	" — — <i>alba, fort.</i> . . . . .	75 "
" — <i>eburneum</i> . . . . .	15 "	" <i>Leptotes bicolor</i> . . . . .	10 "
" — <i>Farmeri</i> . . . . .	10 "	f <i>Limatodes rosea</i> (FLORE, XXII, 43) . . . . .	10 à 20 "
" — <i>fimbriatum</i> . . . . .	10 à 15 "	" <i>Lissochilus giganteus</i> . . . . .	15 "
f — <i>nobile</i> . . . . .	10 à 30 "	" <i>Lycaste aromatica</i> . . . . .	8 à 15 "
c — <i>Parishii</i> . . . . .	10 à 25 "	" — <i>balsamina</i> . . . . .	10 "
" — <i>Pierardi</i> . . . . .	10 "	" — <i>candida</i> . . . . .	25 "
" — <i>primulium</i> . . . . .	10 à 25 "	" — <i>citrina</i> . . . . .	10 "
" — <i>pulchellum</i> . . . . .	15 "	" — <i>Cobbyana</i> . . . . .	20 "
" — <i>species du Sikkim</i> . . . . .	10 "	" — <i>gigantea</i> . . . . .	15 à 30 "
" — <i>speciosum</i> . . . . .	25 "	" — <i>Harrisoni</i> . . . . .	10 à 15 "
" — <i>stratiotes</i> . . . . .	50 "	" — <i>macrophylla</i> . . . . .	15 à 25 "
" — <i>suavissimum</i> . . . . .	30 "	" — <i>Skinneri</i> (FLORE, IV, 303-4) . . . . .	10 à 25 "
" — <i>transparens</i> . . . . .	10 "	" — — <i>delicatissima</i> . . . . .	35 "
" — <i>Wardianum</i> . . . . .	15 "	" — <i>tetragona</i> . . . . .	15 "
c <i>Dendrochilum filiforme</i> . . . . .	10 "	" <i>Masdevallia amabilis</i> . . . . .	5 à 25 "
" — <i>glumaceum</i> . . . . .	15 "	" — — <i>grandiflora</i> . . . . .	5 à 20 "
f <i>Disa grandiflora</i> (FLORE, II, 160) . . . . .	10 "	" — <i>attenuata</i> . . . . .	8 "
t <i>Epidendrum atropurpureum</i> . . . . .	15 "	" — <i>Backhousiana</i> . . . . .	20 "
" — <i>bicornutum</i> . . . . .	10 "	" — <i>Barclayana</i> . . . . .	10 "
" — <i>bifidum</i> . . . . .	8 "	" — <i>bella</i> . . . . .	10 "
" — <i>ciliare</i> . . . . .	10 à 15 "	" — <i>Benedicti (psittacina)</i> . . . . .	5 à 25 "
" — <i>cochleatum</i> . . . . .	10 "	" — <i>Bonplandi</i> . . . . .	5 à 30 "
" — <i>fragrans</i> . . . . .	10 "	" — <i>Bruchmulleri</i> . . . . .	5 à 30 "
" — <i>macrochilum</i> . . . . .	10 "	" — <i>caudata</i> . . . . .	5 à 20 "
" — — <i>roseum</i> . . . . .	10 "	" — <i>Chimæra</i> . . . . .	15 à 25 "
" — <i>odoratissimum</i> . . . . .	15 à 25 "	" — — <i>var. Sander</i> . . . . .	20 "
" — <i>prismatocarpum</i> . . . . .	15 à 30 "	" — <i>civilis</i> . . . . .	5 à 10 "
" — <i>venosum</i> . . . . .	10 "	" — <i>coriacea</i> . . . . .	5 à 10 "
t — <i>verrucosum</i> . . . . .	10 "	" — <i>cucullata</i> . . . . .	5 à 10 "
f — <i>vitellinum majus</i> . . . . .	10 "	" — <i>Davissii</i> . . . . .	5 à 20 "
Variété très-florifère à fleur orange et jaune, beaucoup plus grande que celle du type.		" — <i>erythrochaete</i> . . . . .	10 "
t <i>Eria excelvata</i> . . . . .	5 "	" — <i>estradae</i> . . . . .	10 "
" <i>Galeandra Browni</i> . . . . .	5 "	" — <i>Harryana</i> (FLORE, XXI, 155) . . . . .	5 à 30 "
f <i>Gongora purpurata</i> . . . . .	10 "	" — — <i>Bull's Blood</i> . . . . .	25 "
" <i>Houlletia Brocklehurstiana</i> . . . . .	10 à 25 "	" — — <i>Calenderi</i> . . . . .	25 "
t <i>Ionopsis paniculata</i> . . . . .	15 "	" — — <i>grandiflora</i> . . . . .	15 à 40 "
f <i>Loelia acuminata</i> (FLORE, I, 51) . . . . .	15 à 25 "	" — — <i>lilacina</i> . . . . .	10 à 20 "
" — <i>albida</i> . . . . .	10 "	" — — <i>Van Houttei</i> . . . . .	20 à 40 "
" — <i>anceps</i> . . . . .	15 à 30 "	" — <i>Houtteana</i> (FLORE, XX, 87) . . . . .	15 "
" — <i>alba</i> . . . . .	30 "	" — <i>igneae</i> . . . . .	5 à 20 "
" — <i>autumnalis</i> . . . . .	10 à 25 "	" — — <i>Beckhardi</i> . . . . .	20 "
" — — <i>atrorubens</i> . . . . .	15 à 30 "	" — — <i>major</i> . . . . .	15 "
t — <i>Boothiana</i> . . . . .	25 à 40 "	" — <i>infracta</i> (FLORE, XXIII, 43) . . . . .	5 à 15 "
" — <i>cinnabarina</i> . . . . .	15 "	" — <i>ionocharis</i> . . . . .	8 "
t — <i>crispa</i> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	10 à 100 "	" — <i>Lindeni</i> . . . . .	5 à 75 "
f — <i>Dayana</i> . . . . .	15 "	" — — <i>Cannarti</i> . . . . .	10 à 40 "
t — <i>elegans</i> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	50 "	Espèce à très-grandes fleurs, mais de même coloris que le <i>Lindeni</i> .	
f — <i>flava</i> . . . . .	10 à 20 "	" — — <i>grandiflora</i> . . . . .	10 à 25 "
t — <i>harpophylla</i> . . . . .	15 "	" — — <i>macrura</i> . . . . .	100 "
f — <i>majalis</i> . . . . .	10 "	" — <i>maculata</i> (FLORE, XXI, 11) . . . . .	5 à 20 "
t — <i>peduncularis</i> . . . . .	10 à 20 "	" — — <i>gigantea</i> . . . . .	10 "
" — <i>Perrinii</i> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	10 à 40 "		

Très-belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.



	Fr. C.
<i>f</i> Masdevallia melanopoda . . .	5 à 10 "
" — nycterina ( <i>Gorgona</i> ) . . .	15 "
" — ochtodes . . .	5 "
" — Peristeria (FLORE, XXII, 171)	5 à 10 "
" — — pygmaea . . .	10 "
" — polysticta . . .	5 à 15 "
" — Reichenbachiana . . .	5 à 15 "
" — Rœzlii . . .	20 "
" — Schlimii . . .	20 "
" — Shuttleworthii . . .	20 "
" — swertiaefolia . . .	5 "
<i>t</i> — Tovarensis ( <i>candida</i> ) . . .	5 à 25 "
" — triangularis . . .	5 à 15 "
<i>f</i> — Trochilus . . .	25 à 50 "
" — Veitchiana (FLORE, XVII, 155)	20 "
" — versicolor . . .	25 "
" — Wagneriana . . .	5 à 20 "

6 Masdevallia en 6 sortes, à notre  
choix en bonnes plantes. 25 "

12 Masdevallia en 12 sortes, à notre  
choix, en bonnes plantes. 40 "

Les Masdevallia fleurissent abondamment dans la serre froide, et produisent de brillantes fleurs, carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, écarlate ou orange, chez le *coccinea*, l'*igneus* et le *Veitchiana*, ou bien tigrées, ponctuées, etc.; comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.

<i>f</i> Maxillaria cinabarina . . .	20 "
<i>t</i> — leontoglossa . . .	15 "
" — species, très-rare . . .	75 "
<i>f</i> Mesospinidium sanguineum . . .	15 à 25 "

Fleur d'un beau rouge vif.

<i>c</i> Microstylis chlorophrys . . .	5 "
<i>t</i> Miltonia clowesii . . .	15 à 25 "
Très-belles fleurs tricolores.	
" — Moreliana . . .	20 à 35 "
" — spectabilis . . .	10 à 20 "
" — virginalis . . .	10 "
" — Warcewiczii ( <i>Oncidium fuscum</i> )	
(FLORE, XVIII, 23).	15 à 30 "
" Mormodes luxatum eburneum . . .	15 "
" — pardinum . . .	15 "
<i>c</i> Nephelaphyllum pulcher . . .	5 "

<i>f</i> Odontoglossum Alexandræ ( <i>crispum</i> )	5 à 20 "
" — — Mariæ . . .	20 "
" — — roseum . . .	25 "

L'*O. Alexandræ* est de toutes les orchidées celle dont la culture est la plus facile et la plus agréable. Une température de 50 à 60 lui suffit, et pendant toute l'année elle donne ses belles grappes de fleurs d'un blanc de neige, plus ou moins tachetées de carmin et à labele tricolore, blanc, carmin et citron. Tous les amateurs de fleurs devraient posséder cette charmante orchidée, qui n'exige presque pas de soins spéciaux et qui vient également bien dans n'importe quelle serre.

Ses fleurs coupées sont inappréciables pour bouquets, tant par leur délicatesse que par leur abondance.

" — angustatum . . .	20 "
" — bictoniense . . .	10 "
" — blandum . . .	20 "
" — Cervantesii . . .	10 "
" — cirrhosum . . .	15 à 25 "
" — citrosimum (FLORE, VI, 307)	10 à 40 "
" — constrictum . . .	10 à 25 "

	Fr. C.
<i>f</i> Odontoglossum cordatum . . .	8 à 15 "
" — cristatum . . .	10 à 30 "
" — dominianum . . .	15 "
" — gloriosum . . .	15 à 25 "
" — grande (FLORE, I, 125).	10 à 20 "
" — guttatum . . .	20 "
" — Hallii . . .	20 "
<i>t</i> — hastilabium . . .	15 "
" — Harryanum . . .	10 à 25 "
<i>f</i> — Hystrix . . .	15 à 25 "
" — Insleayi (FLORE, I, 243)	10 à 25 "
" — leopardinum . . .	10 à 20 "
<i>c</i> — Kramerianum . . .	25 "
" — Lindleyanum . . .	15 "
<i>t</i> — Londesboroughianum . . .	15 à 40 "
<i>f</i> — luteo-purpureum . . .	15 à 30 "
" — maculatum . . .	8 à 15 "
" — — superbum . . .	10 "
<i>t</i> — madrense . . .	10 à 15 "
<i>f</i> — membranaceum . . .	6 "
" — nebulosum . . .	10 à 20 "
" — album . . .	15 "
<i>t</i> — Oerstedtii . . .	5 à 10 "
<i>f</i> — pardinum . . .	25 "
" — Pescatorei (FLORE, XVI, 23)	10 à 25 "
<i>t</i> — phalaenopsis . . .	20 "
<i>f</i> — pulchellum . . .	10 à 20 "
" — grandiflorum . . .	10 à 20 "
" — punctatum . . .	25 "
" — recurvum . . .	10 "
<i>c</i> — Rœzlii . . .	15 à 50 "
" — album . . .	15 à 50 "
<i>f</i> — Rossii . . .	8 "
" — — majus (FLORE, XX, 95)	10 à 25 "
" — Sanderianum . . .	15 à 35 "
" — Schlieperianum . . .	10 à 20 "
" — triumphans . . .	15 à 30 "

Belle espèce à fleurs d'un jaune d'or, tachées de bronze.

" — Uro-Skinneri . . .	15 à 25 "
<i>t</i> — vexillarium (FL., XX, 27).	15 à 100 "

Une des plus jolies Orchidées introduites dans ces derniers temps. Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre.

6 Odontoglossum en 6 sortes à  
notre choix. 40 "

12 — en 12 sortes à  
notre choix 75 à 100 "

" Oncidium albo-violaceum . . .	15 à 25 "
" — altissimum . . .	10 à 25 "
" — ampliatus majus (FLORE, XX,	
147).	15 à 30 "
" — armillare . . .	15 "
" — Batemanii . . .	15 à 25 "
<i>f</i> — bifolium . . .	6 "
<i>t</i> — cæsium . . .	15 "
" — caminophorum . . .	15 "
" — Cavendishianum . . .	15 à 25 "
<i>f</i> — cheiroporum . . .	20 "
" — concolor . . .	10 à 20 "

	Fr. C.	
f <i>Oncidium crispum</i> (FL., XXI, 7)	10 à 25	"
" — <i>cuculatum</i> (FL., VIII, 235)	10 à 25	"
" — <i>dasystyle</i> . . . . .	10	"
" — <i>flexuosum</i> . . . . .	10 à 30	"
" — <i>Forbesii</i> . . . . .	10 à 25	"
t — <i>fuscatum</i> ( <i>Miltonia Warsceviczii</i> ) (FLORE, XVIII, 23)	15 à 30	"
" — <i>guttatum</i> . . . . .	10 à 15	"
" — <i>Harrisoni</i> . . . . .	15	"
" — <i>Janeirense</i> . . . . .	6	"
" — <i>Jonesianum</i> . . . . .	10	"
c — <i>Kramerianum</i> (FLORE, XIX, 41)	15 à 25	"
" — <i>Lanceanum</i> (FLORE, XVIII, 37)	25	"
t — <i>laxense</i> . . . . .	15	"
" — <i>leopardinum</i> . . . . .	15	"
" — <i>macranthum</i> . . . . .	15 à 25	"
f — <i>Marshallianum</i> . . . . .	20	"
t — <i>microchilum</i> . . . . .	5 à 10	"
f — <i>obryzatum</i> . . . . .	15 à 25	"
" — <i>orientale</i> . . . . .	15	"
" — <i>ornithorynchum</i> . . . . .	15	"
c — <i>papilio majus</i> (FLORE, IX, 165)	15 à 25	"
f — <i>phalænopsis</i> . . . . .	20	"
t — <i>prætextum</i> . . . . .	15 à 30	"
f — <i>pulvinatum</i> . . . . .	15 à 35	"
" — <i>ramosum</i> . . . . .	15 à 30	"
" — <i>sarcodes</i> . . . . .	15 à 40	"
" — <i>sceptrum luteum-purpureum</i> . . . . .	15	"
" — <i>Semele</i> . . . . .	15	"
" — <i>sphacelatum</i> . . . . .	10 à 35	"
" — <i>tigrinum</i> ( <i>Barkeri</i> ) . . . . .	15 à 30	"
Grandes fleurs à labelle jaune vif, d'une odeur suave.		
" — <i>ungiculatum</i> . . . . .	20 à 35	"
" — <i>varicosum Rogersii</i> . . . . .	10 à 20	"
t — <i>volvox</i> . . . . .	10 à 30	"
" — <i>Weitonii</i> . . . . .	15	"
" — <i>Wentworthianum</i> . . . . .	15	"
c <i>Pescatorea cerina</i> . . . . .	25 à 50	"
" — <i>lamellosa</i> . . . . .	50	"
" — <i>Lehmanni</i> . . . . .	40	"
" — <i>Sanderiana</i> . . . . .	30	"
t <i>Phajus grandiflorus</i> . . . . .	5 à 15	"
Hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs.		
" — <i>maculatus</i> . . . . .	15	"
" — <i>Woodfordii</i> . . . . .	10 à 15	"
c <i>Phalænopsis amabilis</i> (FLORE, I, 201)	20 à 50	"
" — <i>grandiflora</i> . . . . .	25 à 50	"
" — <i>Ludemanniana</i> (FLORE, XVI, 53)	35 à 75	"
Les <i>Phalænopsis</i> sont les perles des Orchidées. L' <i>amabilis</i> et le <i>grandiflora</i> (blanc), et le <i>Schilleriana</i> (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.		
" — <i>Schilleriana</i> (FLORE, XV, 115)	20 à 75	"
" — <i>Stuartiana</i> . . . . .	35	"
t <i>Pholidota imbricata</i> . . . . .	10	"
<i>Pilumna nobilis</i> . . . . .	10 à 20	"

	Fr. C.	
f <i>Pleione lagenaria</i> ( <i>Cælogine</i> ) (FLORE, XXII, 37)	10	"
" — <i>humilis</i> . . . . .	10	"
Les <i>Pleione</i> sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Le plus beau et le plus riche en couleur est, sans contredit, le <i>P. lagenaria</i> .		
" <i>Promenæa stapelioides</i> . . . . .	15	"
" — <i>xanthica</i> . . . . .	10	"
c <i>Saccolabium ampullaceum</i> . . . . .	5 à 30	"
" — <i>Blumei</i> . . . . .	10 à 25	"
" — — <i>majus</i> . . . . .	15 à 30	"
" — <i>giganteum</i> ( <i>Vanda densiflora</i> ) (FLORE, XVII, 89)	15 à 25	"
Magnifique espèce à forte tige garnie de grandes fleurs blanches.		
" — <i>guttatum</i> . . . . .	10 à 30	"
" — <i>illustre, fort.</i> . . . .	25 à 50	"
" <i>Sarcopodium multicaule</i> ( <i>acampe</i> ) . . . . .	10	"
t <i>Schomburgkia marginata</i> . . . . .	15 à 25	"
" — <i>rosea</i> . . . . .	25	"
" — <i>species</i> . . . . .	15	"
" <i>Scuticaria Steelii</i> . . . . .	10	"
c <i>Selenipedium caudatum</i> (FLORE, VI, 99)	15	"
" — — <i>roseum</i> . . . . .	50 à 175	"
t — <i>longifolium</i> . . . . .	10 à 100	"
" — <i>Roezii</i> . . . . .	10 à 100	"
c — <i>Schlimii</i> (FLORE, XVIII, 153)	15	"
f <i>Sobralia macrantha</i> (FLORE, VII, 69)	20 à 200	"
" — — <i>pumila</i> . . . . .	30 à 200	"
" <i>Sophronitis cernua</i> . . . . .	10	"
Espèce d'un port nain, à grandes fleurs d'un rouge vif.		
" — <i>grandiflora</i> (FLORE, I, 48)	10 à 25	"
" — <i>violacea</i> . . . . .	10	"
" <i>Stanhopea aurea</i> . . . . .	15	"
" — <i>grandiflora</i> . . . . .	15	"
" — <i>insignis</i> . . . . .	20	"
" — <i>Jenishiana</i> . . . . .	15 à 30	"
" — <i>Martiana</i> . . . . .	15	"
" — <i>oculata</i> . . . . .	10 à 15	"
" — <i>saccata</i> . . . . .	10 à 25	"
" — <i>Schmidcheni</i> . . . . .	20	"
" — <i>tigrina</i> . . . . .	20	"
" — — <i>superba</i> (FLORE, VII, 191)	20	"
" — <i>Wardiana</i> . . . . .	10	"
c <i>Thunia alba</i> . . . . .	6 à 0	"
" — <i>Dodgsonii</i> . . . . .	10	"
" — <i>Marshallii</i> . . . . .	25	"
t <i>Trichopilia crispa marginata</i> (FLORE, XVIII, 167)	50 à 100	"
Variété hors ligne. Toutes les parties de la fleur sont légèrement ondulées et le carmin vif du labelle est gracieusement bordé d'un liseré blanc.		
" — <i>fragrans</i> . . . . .	15 à 25	"
" — <i>suavis</i> (FLORE, VIII, 29)	10 à 25	"
" — <i>torilis</i> . . . . .	10 à 15	"
Les <i>Trichopilia</i> sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre au dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.		
" <i>Trichosma suavis</i> . . . . .	10	"
c <i>Uropedium Lindenii</i> (FLORE, VI, 123)	50	"



	Fr. C.		Fr. C.
<i>f</i> <i>Utricularia montana</i> . . . . .	15 "	<i>c</i> <i>Vanilla aromatica</i> . . . . .	10 "
<i>c</i> <i>Vanda Boxalii</i> . . . . .	20 à 35 "	Orchidée grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on a fécondé artificiellement les fleurs. Les fruits de cette espèce, fournissent la Vanille du commerce.	
" — <i>lamellata</i> . . . . .	25 à 50 "	<i>t</i> <i>Warrea cyanea</i> . . . . .	10 à 20 "
" — <i>cærulea</i> . . . . .	25 "	<i>c</i> <i>Warszewiczella discolor</i> . . . . .	10 à 30 "
" — <i>Denisoniana</i> . . . . .	40 "	" — <i>quadrata speciosa</i> . . . . .	20 à 35 "
" — <i>densiflora</i> ( <i>Saccolabium giganteum</i> )		<i>f</i> <i>Xylobium squalens</i> . . . . .	10 à 20 "
(FLORE, XVII, 89)	15 à 25 "	" <i>Zygopetalum aromaticum</i> . . . . .	50 "
" — <i>insignis</i> . . . . .	50 "	" — <i>crinitum</i> . . . . .	8 à 15 "
" — <i>Leopoldi</i> . . . . .	40 "	" — <i>superbum</i> . . . . .	25 "
" — <i>Lobbii</i> . . . . .	40 "	" — <i>intermedium</i> . . . . .	10 "
" — <i>Roxburghii</i> (FLORE, II, fév.,		" — <i>Mackayi</i> . . . . .	5 "
pl. II).	25 "	" — <i>compactum</i> . . . . .	20 "
" — <i>species</i> . . . . .	20 "	" — <i>compurum</i> . . . . .	25 "
" — <i>suavis</i> . . . . .	25 à 150 "	" — <i>maxillare</i> . . . . .	10 à 20 "
" — <i>teres</i> . . . . .	10 à 20 "	Les <i>Zygopetalum</i> surtout le <i>Mackayi</i> et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile.	
" — <i>tricolor</i> (FLORE, VI, 329) .	20 à 300 "		

## PALMIERS.

Il est inutile de faire l'éloge des *Palmiers*, auxquels l'illustre Linné a appliqué, à juste titre, la dénomination de *Princes* du règne végétal, et ils le sont, en effet, aussi bien dans les abris vitrés que nous leur consacrons, que dans les régions intertropicales où ils s'étalent dans toute leur majesté. On sait le rang prédominant qu'ils occupent dans les serres et les jardins d'hiver, dont ils sont le principal ornement. Port, frondaison, etc., tout, chez eux, excite l'admiration.

La force des exemplaires sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Acanthophoenix crinita</i> ( <i>Areca crinita</i> . BORY) (FL., XVI, 181).	50 "	493. † <i>Brahea glauca</i> ( <i>Ræzlii</i> ) . . . . .	2 "
très-forts spécimens . . . . .	1000 "	Palmier d'un port magnifique, très-ornemental, à frondes en éventail, d'un vert glauque en dessus, d'un blanc bleuâtre en-dessous.	
Palmier d'un port gracieux, à feuillage léger, très-divisé, à revers blanc, d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à l'ensemble leur riche contingent d'ornementation.		538. † — <i>dulcis</i> . . . . .	5 "
3. <i>Acanthorhiza Warszewiczii</i> . . . . .	200 "	495. <i>Calamus calicarpus</i> . . . . .	50 "
4. <i>Acrocomia lasiospatha</i> , <i>fortis</i> 35 à 100 "		74. <i>Carludovica atrovirens</i> ( <i>plicata</i> )	8 à 15 "
6. <i>Areca alba</i> . . . . .	3 à 40 "	76. — <i>humilis</i> . . . . .	20 "
77. † — <i>Baueri</i> ( <i>Seaforthiarobusta</i> ) 2 à 75 "		326. — <i>macropoda</i> . . . . .	25 "
extra fort spécimen . . . . .	1500 "	78. — <i>microcephala</i> . . . . .	4 à 15 "
10. — <i>furfuracea</i> . . . . .	125 à 400 "	79. — <i>palmata</i> . . . . .	15 "
12. † — <i>lutescens</i> . . . . .	2 à 75 "	Ses feuilles plissées en éventail, partagées en 3-5 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.	
14. † — <i>monostachya</i> . . . . .	5 à 10 "	83. <i>Caryota excelsa</i> . . . . .	20 à 100 "
18. — <i>rubra</i> HORT. (non BORY) . . . . .	2 à 15 "	84. — <i>furfuracea</i> . . . . .	100 "
194. † — <i>sapida</i> ( <i>Kentia</i> ) . . . . .	2 à 100 "	542. — <i>plumosa</i> . . . . .	10 "
très-fort spécimen . . . . .	1500 "	88. — <i>sobolifera</i> . . . . .	5 à 200 "
191. — <i>Verschaffeltii</i> ( <i>Hyophorbe</i> ) (FL., XVI, 171), <i>fortis</i> . 2 à 1000 "		90. — <i>urens</i> , <i>fort.</i> . . . . .	3 à 125 "
Un des plus beaux Palmiers connus.		92. † <i>Ceroxylon andicaula</i> . . . . .	25 "
20. <i>Arenga saccharifera</i> . . . . .	5 à 500 "	94. — <i>niveum</i> . . . . .	6 à 250 "
22. <i>Astrocaryum Ayri</i> . . . . .	5 à 500 "	98. † <i>Chamædorea atrovirens</i> . . . . .	15 à 50 "
26. † — <i>mexicanum</i> . . . . .	10 "	497. † — <i>Casperiana</i> . . . . .	10 à 25 "
extra fort spécimen . . . . .	300 à 2000 "	101. † — <i>concolor</i> . . . . .	10 à 30 "
Beau Palmier à frondes pinnées blanches en dessous.		104. † — <i>elegans</i> (FL., XIII, 133) . . . . .	25 à 50 "
42. <i>Attalea spectabilis</i> . . . . .	10 à 50 "	374. † — <i>elegantissima</i> . . . . .	3 "

## Fr. C.

105. †*Chamædorea Ernesti-Augusti*  
(FLORE, XIII, 123) . . . 5 à 15 "  
Palmier d'une grande élégance, dont la tige cylindrique, verte, est entrecoupée de nœuds comme un Bambou.
108. — *fragrans* . . . . . 10 à 50 "  
110. — *glaucofolia, fort.* . . . . 25 "  
311. — *graminifolia, fort.* . . . . 50 "  
112. — *lunata* . . . . . 10 à 75 "  
364. — *Martiana* . . . . . 15 à 50 "  
541. — *nec-plus-ultra* . . . . . 10 "  
344. † — *oblongata* . . . . . 10 à 20 "  
116. — *Sartorii* . . . . . 5 à 35 "  
544. — *tenella* . . . . . 10 "  
444. — *Wallisii* . . . . . 25 à 50 "
120. †*Chamærops excelsa (Trachycarpus)*  
(FLORE, XXII, 207) . . . 1 à 50 "  
122. † — *humilis* . . . . . 1 à 200 "  
428. † — *hystrix, vrai.* . . . . 40 "  
292. — *stauracantha* . . . . . 10 à 500 "  
531. †*Cocos campestris* . . . . . 5 à 200 "  
526. — *coronata* . . . . . 2 à 20 "  
131. † — *flexuosa* . . . . . 3 à 40 "  
133. — *Mikaniana* . . . . . 6 à 500 "  
134. — *nucifera, fort.* . . . . 75 "  
138. † — *Romanzoffiana* . . . . . 2 à 20 "  
142. — *Weddelliana* . . . . . 1 à 3 "  
532. † — *Yatai, très-forts.* . . . 40 à 150 "
207. †*Corypha australis (Livistona)* . . . 1 à 50 "  
429. † — *filifera* . . . . . 25 "  
504. †*Diplotemium maritimum* . . . 10 "  
161. *Elæis guineensis macrocarpa,*  
*très-forts spécimens* . . . . . 300 "  
164. *Euterpe edulis* . . . . . 2 à 200 "  
515. — *sylvestris* . . . . . 8 à 15 "  
416. *Geonoma gracilis* . . . . . 3 à 15 "  
Palmier très-élégant, d'un beau port.
173. — *intermedia* . . . . . 10 "  
451. — *princeps* . . . . . 10 à 25 "  
181. — *Schottiana* . . . . . 5 à 100 "  
462. — *Seemanni* . . . . . 3 à 25 "
191. *Hyophorbe Verschaffelti (Areca)*  
(FLORE, XVI, 171), *forts.* . . 2 à 1000 "
227. †*Jubæa spectabilis (Micrococos)* . . 2 "  
*les douze* . . . . . 18 "  
*très-fort spécimen* . . . . . 500 "
365. †*Kentia Balmoreaana* . . . . 1 à 250 "  
366. † — *Canterburyana (Veitchia)* . . 4 à 10 "  
367. † — *Forsteriana* . . . . . 1 à 150 "  
453. † — *Lindeni, très-fort* . . . . 10 à 400 "  
473. — *Macarthurii* . . . . . 25 "  
Très-élégant Palmier à feuilles subérigées, mi-retombantes, d'un beau vert gai et d'un charme inexprimable.
507. † — *Mooreana* . . . . . 5 à 50 "  
527. † — *rupicola, extra* . . . . . 200 "  
194. † — *sapida (Areca)* . . . . . 2 à 100 "  
*très-forts spécimens* . . . . . 1500 "
460. — *Wendlandiana* . . . . . 6 "  
213. †*Latania borbonica (Livistona sinensis)* . . . . . 1 à 75 "

## Fr. C.

202. *Licuala amplifrons* . . . . . 10 "  
203. — *elegans, forts* . . . . . 40 "  
492. — *grandis (Pritchardia)* . . . 2500 "  
Palmier nouveau de tout premier ordre, d'un port superbe, d'une élégance de feuillage sans pareille.
206. *Livistona altissima (FLORE, XVII 51)* . . . . . 6 à 500 "  
207. † — *australis (Corypha)* . . . . 1 à 50 "  
208. † — *Hoogendorpii* . . . . . 10 à 50 "  
209. † — *humilis* . . . . . 5 "  
210. — *Jenkinsiana, fort spécimen* . . 1000 "  
380. — *mauritiana* . . . . . 5 à 10 "  
213. † — *sinensis (Latania borbonica)* . 1 à 75 "  
214. — *subglobosa* . . . . . 25 à 40 "  
219. *Martinezia caryotæfolia* . . . 10 à 200 "  
227. †*Micrococos chilensis* . . . . . 2 "  
*les douze* . . . . . 18 "  
*très-forts spécimens.* . . . . 500 "
443. †*Morenia Van Houttei, forts* . . . 75 "  
445. — *Wendlandii, forts* . . . . . 75 "  
236. *Oncosperma van Houtteana* . . . 75 "  
241. *Oreodoxa regia* . . . . . 3 à 6 "  
243. *Phœnicophorium Sechellarum*  
(*Stevensonia grandifolia*) (FLORE, XV, 177), *forts et très-forts spécimens* . . . . . 75 à 600 "
- L'un des Palmiers les plus beaux et les plus majestueux par son feuillage grandiose; pétioles courts, d'un jaune chamois, garnis de longues épines droites, apicales, d'un noir de jais; feuilles gigantesques, plissées, tout d'une pièce, cuneiformes-ovales, s'élargissant de la base jusqu'au sommet, qui est obtus et divisé en deux lobes séparés par une longue échancrure.
534. *Phoenix dactylifera reclinata* . . 10 à 25 "  
535. — — *farinifera* . . . . . 10 à 25 "  
536. — — *Leonensis* . . . . . 10 à 25 "  
Ces trois variétés du *P. dactylifera* se distinguent par leurs folioles très-étroites et très-longues et aussi par une rusticité hors ligne; elles conviennent parfaitement pour la culture en pleine terre, dans le midi.
540. — *leucophæa, fort.* . . . . . 500 "  
Le port est celui du *P. reclinata*, mais les feuilles sont plus nombreuses et plus compactes et elles paraissent entièrement couvertes d'une poussière argentée; c'est un Palmier très-rare et très-ornemental et de plus très-rustique.
250. — *reclinata* . . . . . 1 à 50 "  
Excellent Palmier pour appartement.
470. — *rupicola* . . . . . 5 "  
252. — *tenuis, extra fort* . . . . . 5 à 550 "  
255. *Pinanga Kuhlei* . . . . . 10 à 100 "  
387. — — *alba* . . . . . 200 "  
463. *Plectocomia elongata* . . . . . 100 à 200 "  
464. *Pritchardia aurea* . . . . . 10 à 400 "  
441. † — *filifera, fort* . . . . . 50 "  
514. — *Gaudichaudi* . . . . . 10 à 75 "  
418. — *macrocarpa* . . . . . 15 à 400 "  
Palmier très-robuste, décoratif au suprême degré et l'un des plus beaux de cette magnifique famille.
211. — *pacifica (Fl., XXII, 1)* . . . 300 à 800 "  
513. — *Vuystekiana* . . . . . 40 "  
263. †*Ptychosperma Alexandræ* . . . 2 à 350 "  
503. † — *Veitchii* . . . . . 100 "  
469. †*Ravenea Hildebrandtii* . . . . 500 "  
Palmier de serre tempérée, très-bain, introduit récemment de l'île Johanna, à l'est de Madagascar.



	Fr. C.	
267. † <i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . .	5 à 50 "	
268. † — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	100 "	
524. † — <i>humilis</i> . . . . .	50 "	
270. † <i>Sabal Adansonii</i> . . . . .	2 à 5 "	
465. † — <i>havanensis</i> . . . . .	5 à 10 "	
415. † — <i>longipedunculata</i> . . . . .	10 "	
325. † — <i>umbraculifera</i> . . . . .	5 à 10 "	
276. † <i>Seaforthia elegans</i> . . . . .	1 à 100 "	
277. † — <i>robusta (Areca Baueri)</i> . . . . .	2 à 75 "	
<i>très-fort spécimen</i> . . . . .		1500 "

Les *Seaforthia* sont de superbes Palmiers de serre froide à grandes frondes pinnés.

*Stevensonia*, voir *Phenacophorum*.

529. <i>Thrinax Chuco</i> . . . . .	75 "
280. — <i>elegans, fort</i> . . . . .	5 à 500 "
282. — <i>gracilis</i> . . . . .	5 à 10 "
543. — <i>Legrellei</i> . . . . .	50 "
539. — <i>Miraguana</i> . . . . .	100 à 200 "

### A mon choix en jolies plantes.

6 *Palmiers* pour décoration d'appartement de 12 à 25 francs.

12 — — — — — 25 à 50 "

	Fr. C.
287. <i>Thrinax parviflora</i> . . . . .	10 à 75 "
289. — <i>Robinii</i> . . . . .	300 "
366. † <i>Veitchia Canterburyana (Kentia)</i> . . . . .	4 à 10 "
295. <i>Verschaffeltia melanochætes</i> . . . . .	10 à 200 "
296. — <i>splendida</i> (FL., XV, 181) . . . . .	10 à 100 "
299. <i>Wallichia oblongifolia</i> . . . . .	600 "
300. — <i>Oranii</i> . . . . .	50 " 50 "
510 † <i>Washingtonia robusta</i> . . . . .	50 à 300 "
<i>jeunes plantes</i> . . . . .	5 à 10 "

Palmier remarquable au sujet duquel nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ce que nous écrivait, il y a quelques années, l'homme le plus compétent de notre époque en fait de Palmiers, M. Hermann Wendland, de Herrenhausen. « La plante que vous venez de m'envoyer est précieuse et surpasse tous les autres Palmiers. Je ne saurais trop la recommander pour le midi de la France et le nord de l'Italie où elle résistera fort bien en pleine terre, en plein air. A mon avis, elle est préférable au *Latania borbonica* comme plante d'appartement. C'est le Palmier le plus méritant qui ait paru en ces dernières années; il égale le *Brahea dulcis* et *Roezlii*, c'est une perle de premier ordre et je ne saurais en dire trop de bien. »

## PANDANÉES.

Les *Pandanées* sont des plantes très-ornementales, d'un port pittoresque, à tige forte, rameuse au sommet, à nombreuses longues feuilles, ordinairement rapprochées au point de s'imbriquer, quelquefois pennées ou palmatides.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Pandanus amaryllidifolius</i> . . . . .	4 à 10 "	18. <i>Pandanus reflexus</i> . . . . .	15 à 40 "
34. — <i>Desmetianus</i> . . . . .	10 "	25. — <i>utilis</i> . . . . .	1 à 4 "
31. — <i>D'Haenei</i> . . . . .	100 "	Feuilles mesurant 2 mètres de longueur sur 12 centimètres de largeur, ornées de piquants rouges sous la côte et sur les bords. Cette espèce est très-utile à cause de ses feuilles qui, divisées en lanières, servent à faire les nattes sur lesquelles on fait sécher le café et que l'on utilise ensuite pour l'emballage.	
9. — <i>graminifolius</i> . . . . .	4 "	26. — <i>Van der Meerschii</i> . . . . .	3 "
11. — <i>javanicus foliis variegatis</i> . . . . .	5 à 10 "	Espèce dans le genre de <i>l'utilis</i> , mais à feuilles érigées et étroites; très-robuste, excellente pour appartement.	
32. — <i>Kerchovei</i> . . . . .	5 à 10 "	29. — <i>Van Houttei, très-rare</i> . . . . .	50 "
33. — <i>Liaisianus</i> . . . . .	5 à 20 "	27. — <i>Veitchii</i> . . . . .	4 à 100 "
15. — <i>ornatus</i> . . . . .	25 "		

Espèce très-décorative, à feuilles d'un vert glauque, garnies d'épines blanches sur les bords, excellente pour appartement.

## PASSIFLORÉES.

Plantes grimpantes pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, colonnettes, treillis, etc., à fleurs charmantes et du plus gracieux effet.

	Fr. C.		Fr. C.
4. <i>Passiflora alata</i> . . . . .	2 "	30. <i>Passiflora Impératrice Eugénie</i> . . . . .	2 "
77. — <i>arc-en-ciel</i> . . . . .	2 "	88. — — <i>fol. varieg.</i> . . . . .	2 "
10. — <i>Bijou</i> . . . . .	2 "	69. — <i>Junesii</i> . . . . .	2 "
11. — <i>Bonapartei</i> . . . . .	2 "	65. — <i>Loudoniana</i> . . . . .	2 "
71. — <i>cærulea</i> . . . . .	2 "	39. — <i>Neumannii</i> . . . . .	2 "
13. — <i>cardinalis</i> . . . . .	2 "	42. — <i>princeps</i> . . . . .	2 "
15. — <i>coelestina</i> . . . . .	2 "	72. — <i>quadrangularis aucubæfolia</i> . . . . .	3 "
20. — <i>Decaisneana</i> (FLORE, VIII, 267) . . . . .	2 "	58. — <i>trifasciata</i> . . . . .	2 "
22. — <i>edulis</i> . . . . .	2 "	84. — <i>violacea</i> . . . . .	3 "
78. — <i>filamentosa</i> (FLORE, VI, 7) . . . . .	2 "		

## SARRACÉNIÉES, PLANTES CARNIVORES, ETC.

Fr. C.

Fr. C.

Cephalotus follicularis. . . . . 5 "

1. *Darlingtonia californica* (FLORE,

XIV, 125) . . . . . 10 "

Ascidies en forme de S. vertes, avec des taches et des stries brunes sur la partie supérieure, surmontées d'un opercule bilobé.

Dionæa muscipula. . . . . 3 "

Une des plus curieuses plantes que l'on connaisse; ses feuilles radicales en rosette ont de larges bords ciliés qui se referment brusquement, emprisonnant l'insecte imprudent qui vient se poser sur elles.

Drosera capensis. . . . . 10 "

— *dichotoma* (*binata*). . . . . 8 "

Les *Drosera* sont des plantes vivaces de marais très-curieuses, dont les feuilles sont couvertes de cils glanduleux exsudant un suc gommeux qui, ramassé en petits points brillants, fait paraître la plante comme chargée de rosée; les insectes qui se reposent sur ces feuilles sont retenus par la matière gluante.

— *spatulata*. . . . . 20 "32. *Nepenthes bicalcarata*, fort 100 à 300 "21. — *Chelsoni*. . . . . 15 à 100 "41. — *Courtii*. . . . . 25 à 75 "3. — *gracilis major*. . . . . 8 à 40 "18. — *Hookeriana*. . . . . 20 à 100 "37. — — *elongata*. . . . . 25 à 150 "5. — *hybrida* Dominiana. . . . . 15 à 100 "6. — *maculata*. . . . . 20 à 125 "22. — *intermedia*. . . . . 25 à 100 "7. — *lævis*. . . . . 5 à 20 "8. — *lanata*, très-rare. . . . . 50 "27. — *Lawrenceana*. . . . . 25 "34. — *Mastersi*. . . . . 40 à 200 "45. — *Morganæ*. . . . . 50 "28. — *Outramiana*. . . . . 15 à 100 "40. *Nepenthes paradisæ*. . . . . 20 à 75 "9. — *phyllamphora*. . . . . 5 à 25 "10. — *Rafflesiana* (FLORE, XVI, 167 et

XXII, 161) . . . . . 25 à 75 "

39. — *Stewartii*. . . . . 25 à 75 "47. — *Veitchi*. . . . . 50 "43. — *Wrigleyana*. . . . . 25 à 100 "

La plupart des *Nepenthes* ci-dessus ont été décrits page 87 du présent Catalogue.

8 *Sarracenia Drummondii* (FLORE,

VI, 81 et X, 239) . . . . . 8 "

Grandes ascidies vertes, parsemées de taches blanches, bordées de rose sur la partie supérieure et sur l'opercule; fleurs d'un pourpre noirâtre. C'est incontestablement la plus belle espèce du genre.

7. — — *alba*. . . . . 15 "2. — *flava*. . . . . 5 "

Ascidies vertes, fleurs jaunes.

11. — *Maddisoniana*. . . . . 15 "12. — *Mitchelliana*. . . . . 15 "3. — *psittacina*. . . . . 10 "4. — *purpurea* (FLORE, X, 247) . . . . . 5 "

Grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé, fleurs rouges.

5. — *rubra* (FLORE, X, 243) . . . . . 5 "

Longues ascidies à opercule striolé de brun acajou; fleurs d'un rouge sang.

13. — *Tolliana*. . . . . 10 "6. — *variolaris*. . . . . 10 "

Ascidies vertes, lavées de violet sur la partie supérieure, parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches, presque transparentes et surmontées d'un opercule violet; fleurs d'un vert jaunâtre.

Les *Sarracénies* sont des plantes singulières par leurs feuilles ou ascidies, creusées en tube ou entonnoir, avec un petit limbe simulant un couvercle.

## SCITAMINÉES.

Les *Scitaminées* sont de charmantes plantes décoratives, à magnifique feuillage, superbement panaché chez un grand nombre d'entre elles; quelques unes, comme les *Strelitzia*, ont des fleurs très-grandes, d'une étrange conformation et d'une splendide coloration.

Fr. C.

Fr. C.

125. *Alpinia Bangka*. . . . . 2 "2. — *nutans* (*Globba*) . . . . . 4 à 20 "

Magnifique espèce à grandes feuilles ciliées de poils roussâtres, à jolies fleurs pendantes, d'un bel orange ligné de rouge.

116. — *vittata*. . . . . 3 à 15 "

Superbe espèce très-décorative, à feuilles d'un beau vert, ornées de larges bandes blanches.

5. *Amomum Granum Paradisi*. . . . . 2 "156. *Burbridgea nitida*. . . . . 2 à 5 "170. *Cienkowskia Kirkii*. . . . . 10 "

Magnifique scitaminée originaire de l'Afrique orientale. Par son feuillage elle ressemble au *Kaempferia*, mais elle en diffère totalement par son inflorescence.

Les fleurs d'un rose pourpre tendre, avec une belle macule jaune au centre, s'étendant sur le staminode, se montrent en grand nombre et successivement au sommet d'une hampe latérale. Par leur forme trilobée et leur staminode relevé à l'extrémité, elles rappellent les plus belles Orchidées.

7. *Costus discolor*. . . . . 3 "8. — *Malortianus* (*elegans*) . . . . . 2 "171. *Costus musaica*. . . . . 10 "11. *Curcuma elata*. . . . . 2 "12. — *leucorrhiza*. . . . . 2 "14. — *Roscoeana*. . . . . 5 "

Épi dressé de fleurs ornées de magnifiques bractées oranges.

15. — *rubricaulis*. . . . . 3 "16. — *Zedoaria* (*aromatica*, *Zerumbet*) 2 "167. *Globba alba*. . . . . 5 "162. — *coccinea*. . . . . 3 "

Nouveauté à belles fleurs rouges.

17. — *saltatoria* (*Mantisia*) (FLORE,

XX, 41) . . . . . 3 "

Curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom spécifique dérive de ce que ces charmantes fleurs simulent des danseurs qu'un fil tenu met en mouvement, à la moindre secousse qu'on imprime à la plante.

21. *Hedychium Gardnerianum*. . . . . 3 "23. *Heliconia angustifolia*. . . . . 4 "



	Fr. C.
24. <i>Heliconia aurantiaca</i> . . . . .	2 "
157. — <i>aurea vittata</i> . . . . .	4 à 10 "
25. — <i>Bihai</i> (FLORE, XII, 67) . . . . .	10 "
163. — <i>metallica</i> . . . . .	6 à 10 "
161. — <i>triumphans</i> . . . . .	5 "
159. <i>Kämpferia Gilberti</i> . . . . .	3 à 10 "
Superbe nouveauté à feuilles d'un beau vert, bordé de blanc pur, formant une touffe ressemblant à celle d'un <i>Funkia</i> .	
32. <i>Maranta argyræa</i> . . . . .	3 à 10 "
113. — <i>arundinacea</i> . . . . .	6 "
168. — <i>Bachemiana</i> . . . . .	4 "
36. — <i>bicolor</i> . . . . .	3 "
165. — <i>conspicua</i> . . . . .	15 "
35. — <i>coreifolia</i> . . . . .	3 à 6 "
Splendide feuillage d'un vert gai, moiré et zébré de vert bouteille, aurolé de dessins fantastiques où apparaissent le blanc, le rose, le bleuâtre et diverses nuances de vert.	
172. — <i>iconifera</i> . . . . .	15 "
146. — <i>Kegeljaniana</i> . . . . .	3 à 10 "
152. — <i>Kerchoveana</i> . . . . .	2 à 10 "
141. — <i>Kummeriana</i> . . . . .	3 à 100 "
147. — <i>leuconeura</i> . . . . .	8 "
46. — <i>majestica</i> . . . . .	5 "
136. — <i>Lietzei</i> . . . . .	3 "
45. — <i>Lindenii</i> . . . . .	4 "
114. — <i>Makoyana</i> (FLORE, XX, 15) 3 à 200 "	
Espèce naine, très-ornementale par son feuillage d'un vert pâle, orné de macules régulières d'un vert plus foncé, à revers jaunâtre strié et maculé de rouge lie de vin.	
148. — <i>Massangeana</i> (Fl, XXII, 201) . . . . .	3 "
Très-beau feuillage dont la bande centrale, d'un vert clair, passant au vert opalin, est entourée de bandes et de mouchetures transversales d'un vert presque noir, à ton de velours, se fondant vers les bords, en nuances plus ou moins mordorées; revers d'un rose lilacé.	
144. — <i>medio picta</i> . . . . .	3 "
164. — <i>musaica</i> . . . . .	10 "
137. — <i>Oppenheimiana</i> . . . . .	4 à 200 "
49. — <i>orbifolia</i> . . . . .	5 "
50. — <i>ornata-picta</i> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	4 "
133. — <i>porphyrocaulis</i> . . . . .	3 à 10 "
52. — <i>Porteana</i> . . . . .	3 à 100 "
134. — <i>prasiina</i> . . . . .	4 "
94. — <i>princeps</i> . . . . .	5 "
56. — <i>sanguinea</i> . . . . .	2 "
95. — <i>setosa</i> . . . . .	3 "

	Fr. C.
96. <i>Maranta smaragdina</i> . . . . .	5 "
57. — <i>spicata</i> . . . . .	2 à 5 "
59. — <i>tubispatha</i> . . . . .	5 "
60. — <i>Van den Heckeii</i> . . . . .	3 "
62. — <i>Veitchii</i> . . . . .	4 "
98. — <i>Wagneri</i> . . . . .	5 "
66. — <i>Warscewiczii</i> (FLORE, IX, 209). . . . .	4 "
Feuillage vert foncé à large veine médiane d'un jaune légèrement verdâtre, présentant des tons veloutés et chatoyants à revers pourpre.	
138. — <i>Wiotii</i> . . . . .	5 "
67. — <i>zebrina</i> . . . . .	3 à 100 "
68. <i>Musa Cavendishi</i> ( <i>sinensis</i> ) . . . . .	8 à 25 "
Le Bananier de Chine.	
69. — <i>coccinea</i> (FLORE, VII, 213) . . . . .	8 à 10 "
71. — <i>Ensata</i> (FLORE, XIV, 65) . . . . .	3 à 10 "
73. — <i>paradisica, forts.</i> . . . .	10 à 25 "
Le Bananier commun dont les feuilles atteignent 2 mètres de longueur et qui produit d'énormes grappes de fruits, vulgairement nommés <i>régimes</i> .	
74. — <i>rosacea</i> . . . . .	5 à 10 "
155. — <i>sanguinea</i> . . . . .	10 à 20 "
99. — <i>violacea</i> . . . . .	15 "
77. — <i>vittata</i> (FLORE, XV, 25) . . . . .	10 à 20 "
Majestueux feuillage orné d'une belle et élégante panachure de bandelettes blanches sur fond vert nuancé, où vient parfois miroiter, dans la direction des nervures, une jolie strie ou zone rosée.	
78. — <i>zebrina</i> (FLORE, X, 223). . . . .	15 "
Feuillage présentant de fortes mouchetures brunâtres avec un bord très-irrégulier, rarement allongées en bandes.	
158. <i>Phrynium Lubbersi</i> . . . . .	3 à 8 "
81. <i>Ravenala madagascariensis</i> (Fl., XII, 117 et XXI, 161) . . . . .	3 "
L'Arbre du Voyageur, dont les feuilles distiques, longuement pétioles peuvent atteindre 5 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magnifique effet.	
84. <i>Strelitzia Nicolai</i> (FLORE, XIII, 121). . . . .	5 à 25 "
85. — <i>Regina</i> (FLORE, XXIII, 1) . . . . .	10 à 20 "
Fleurs très-belles et très-curieuses, ressemblant à quelque oiseau fantastique, renfermées dans une spathe au nombre de 8 ou 10, à sépales d'un beau jaune orange; à pétales d'un bleu violacé.	
86. — — <i>humilis</i> . . . . .	10 "
56. <i>Stromanthe sanguinea</i> (FLORE, VIII, 97) . . . . .	2 "

## PLANTES UTILES, OFFICINALES, ETC.

	Fr. C.
† <i>Acacia arabica</i> var. <i>nilotica</i> . . . . .	10 "
L'arbre qui donne la gomme arabique, dont les usages sont suffisamment connus.	
or <i>Albizzia Lebbeck</i> . . . . .	10 "
L'Ébénier d'Orient fournit un peu de gomme arabique; le bois, nommé <i>bois noir</i> , est employé à l'île Bourbon, comme bois de charpente.	
» <i>Alibertia edulis</i> . . . . .	5 "
Le Goyavier à fruit noir, de la Guyane.	
† <i>Anamirta cocculus</i> . . . . .	5 "
Son bois donne une couleur jaune; ses fruits, très-vénéneux sont connus sous le nom de <i>cogue du levant</i> et servent à enivrer le poisson; séchés et réduits en poudre, ils sont insecticides.	

	Fr. C.
† <i>Anchietea salutaris</i> . . . . .	5 à 10 "
La racine est employée, au Brésil, comme purgative et dépurative.	
» <i>Anemopaegma racemosa</i> . . . . .	15 "
» <i>Anona antioquiensis</i> . . . . .	4 "
» — <i>Cherimolia</i> . . . . .	5 "
Les fruits en sont fort estimés au Pérou et employés dans la dysenterie.	
» — <i>muricata</i> . . . . .	5 "
Les fleurs, les bourgeons et les fruits sont usités, aux Antilles, comme adoucissants; les fruits, quand ils sont bien mûrs, sont en outre mangés par les naturels du pays.	
» <i>Anomatheca cruenta</i> . . . . .	5 "

	Fr. C.
or <i>Antiaris toxicaria</i> . . . . .	10 à 20 "
L'Upas de Java, d'où découle un suc très-vénéneux, dont les Malais se servent pour empoisonner leurs armes.	
pt <i>Aralia papyrifera (Tetrapanax)</i> (FLORE, VIII, 153) . . . . .	2 à 4 "
Arbuste dont les tiges renferment une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour le tirage des gravures fines.	
t <i>Arenga saccharifera</i> . . . . .	5 à 500 "
Beau Palmier à très-longues frondes ailées, d'un effet original, de la sève duquel on extrait du sucre.	
" <i>Artabotrys odoratissima</i> . . . . .	10 "
Plante originaire de l'Archipel Malaisien. Avec les feuilles on fait une infusion aromatique que l'on considère, à Java, comme très-bonne contre le choléra.	
" <i>Artocarpus imperialis</i> . . . . .	3 à 10 "
or — <i>incisa grande</i> . . . . .	30 à 50 "
Le célèbre Arbre à pain des îles de la mer du Sud.	
" <i>Ataccia palmatifida</i> . . . . .	10 "
" — <i>pinatifida (Tacca)</i> . . . . .	10 "
Les Taïtiens mangent sa racine, qui est cependant vénéneuse, mais dont ils savent extraire le principe nuisible. On en retire l'Arrow-root.	
" <i>Barringtonia racemosa</i> . . . . .	10 "
Immenses thyrses de fleurs à filaments blancs et pourpres auxquelles succèdent des fruits.	
" <i>Bassia latifolia</i> . . . . .	10 "
t <i>Beaumontia grandiflora</i> . . . . .	10 "
L'écorce est employée dans l'Inde, contre la dysenterie.	
e <i>Benthamia fragifera</i> . . . . .	2 "
Porte-fraises. Ses fruits sont, dit-on, comestibles.	
" <i>Bertholletia excelsa</i> . . . . .	15 "
L'arbre produisant ces noix triangulaires connues sous le nom de Noix du Brésil.	
t <i>Bixa Orellana</i> . . . . .	5 "
Plante tinctoriale produisant le <i>Rocou</i> , couleur rouge dont les Indiens de l'Amérique du Sud se teignent le corps.	
or <i>Blighia sapida</i> . . . . .	15 "
Le fruit cuit se mange dans les ragouts à la Jamaïque.	
e <i>Boehmeria macrophylla</i> . . . . .	2 "
" — <i>tenacissima</i> . . . . .	2 "
L'écorce, qui est très-forte, sert à faire des tissus et des cordes.	
t <i>Bombax Ceiba</i> . . . . .	5 "
Un des Arbres à soie dont le duvet sert à faire des chapeaux.	
" <i>Bucklandia populnea</i> . . . . .	5 "
or <i>Calophyllum inophyllum</i> . . . . .	15 "
" — <i>Madruno</i> . . . . .	10 "
Beau feuillage, fleurs blanches auxquelles succèdent des fruits comestibles aux Indes.	
On extrait de l'huile des graines et les racines donnent une résine que quelques auteurs croient la même que le <i>Tacamahaca</i> de l'île Bourbon.	
" <i>Campomanesia hypoleuca</i> . . . . .	5 à 10 "
" <i>Carapa guianensis</i> . . . . .	5 à 15 "
L'écorce du <i>Carapa Guyanensis</i> a une grande réputation comme fébrifuge; on retire des graines une huile anthelminthique que l'on emploie en outre, paraît-il, pour préserver le fer de la rouille.	
t <i>Carissa grandiflora</i> . . . . .	5 "
Grandes fleurs blanches, odorantes, auxquelles succèdent des baies.	
" 79. <i>Carludovica palmata</i> . . . . .	8 à 25 "
Palmier, dont les feuilles plissées, en éventail, partagées en 5-7 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.	
" <i>Caryota urens</i> . . . . .	3 à 125 "
On retire du tronc du vin de palme et dans les temps de disette on fait de la moelle une farine semblable au tapioca, mais moins agréable.	

	Fr. C.
t <i>Cassia fistula</i> . . . . .	5 "
Les fruits ou graines se nomment <i>Casse</i> en bâtons, <i>Casse à siliques</i> . La pulpe est très-usitée en médecine comme tempérante et laxative.	
" — <i>moschata</i> . . . . .	5 "
or <i>Cavanillea philippensis</i> . . . . .	10 à 20 "
Le fruit comestible se sert sur les tables aux îles Philippines.	
" <i>Cephaelis Ipecacuanha</i> . . . . .	3 "
Plante médicinale herbacée du Brésil, dont les racines jouissent de propriétés anti-dysentériques et émetiques.	
e <i>Ceratonia siliqua</i> . . . . .	2 "
Le <i>Caroubier</i> , comme ornement, n'a d'autre mérite que la verdure perpétuelle de son feuillage et de petites fleurs rougeâtres; la pulpe contenue dans l'intérieur de la gousse est bonne à manger, mais un peu laxative. Le bois est très-dur, presque incorruptible.	
" <i>Cerbera antioquiensis</i> . . . . .	15 "
t <i>Chavica officinarum</i> . . . . .	3 "
Constitue le véritable <i>Poivre long</i> des pharmaciens par ses chatons femelles, que l'on fait sécher au soleil avant leur maturité.	
" <i>Chlorocodon Whitei</i> . . . . .	5 "
" <i>Chrysophyllum albidum</i> . . . . .	10 "
" — <i>antioquiensis</i> . . . . .	10 "
" — <i>glabrum</i> . . . . .	15 "
or — <i>macrophyllum</i> . . . . .	20 à 500 "
Magnifiques feuilles au revers tissé de jaune d'or. Les <i>Chrysophyllum</i> donnent des fruits estimés aux Antilles; les amandes sont mucilagineuses et émulsives.	
t <i>Cinchona Calisaya</i> . . . . .	10 "
L'écorce du <i>Quinquina</i> , est le fébrifuge le plus puissant que l'on connaisse, elle a aussi des propriétés toniques et antiputrides.	
" — <i>Josephinae</i> . . . . .	10 "
" — <i>Ledgeriana</i> . . . . .	10 "
Connue comme la meilleure espèce de Quinquina et celle que l'on paye le plus cher dans le commerce.	
" — <i>succi-rubra</i> . . . . .	10 "
or <i>Cinnamomum aromaticum</i> . . . . .	10 "
Le Cannelier de Chine.	
t — <i>Kiamis</i> . . . . .	3 à 8 "
Le Cannelier de Java, dont l'écorce est à la fois douce et astringente.	
" — <i>laurifolium</i> . . . . .	3 à 8 "
" — <i>pedunculatum</i> . . . . .	5 "
e — <i>sericeum</i> . . . . .	3 "
Le Cannelier soyeux du Japon.	
" <i>Citrosma thea</i> . . . . .	10 "
t <i>Clausena corymbiflora</i> . . . . .	10 "
" <i>Coccoloba pubescens</i> . . . . .	15 à 75 "
L'arbre aux parasols, d'un aspect tout exotique, produisant un fruit qu'on mange aux Antilles.	
" <i>Cocculus Plukenetii</i> . . . . .	10 "
Arbre du Malabar dont les fruits, bien qu'employés en médecine, sont un violent poison.	
or <i>Cocos nucifera</i> . . . . .	75 "
Produisant la noix de coco proprement dite, qui renferme avant sa maturité un lait très-agréable à boire et dont l'amande, alimentaire, donne par expression une huile émoullente connue sous le nom de <i>beurre de coco</i> .	
t <i>Coffea arabica</i> . . . . .	3 "
Le Caféier ordinaire à feuillage luisant d'un vert foncé, à jolies fleurs blanches légèrement odorantes, auxquelles succèdent des baies rougeâtres.	
" — <i>angustifolia</i> . . . . .	4 "
" — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	5 à 10 "
Le Caféier à feuilles panachées de jaune pâle.	
" — <i>liberica</i> . . . . .	2 "
Feuillage plus grand, plus vigoureux que celui des autres espèces; fruits plus gros et d'un arôme plus prononcé quand ils sont torréfiés.	



## Fr. C.

- t *Coffea marapagypa* . . . . . 6 "  
 — *myrtifolia* . . . . . 5 "  
 e 14. *Colocasia esculenta* . . . . . 2 "  
 Vulgairement appelé *Chou Carabé*; ses racines et ses feuilles sont alimentaires et d'un grand usage chez les nègres.  
 or *Cookiea punctata* . . . . . 15 à 25 "  
 Produit un fruit comestible, acide comme la groseille et dont on se sert aux Indes en guise de citron.  
 e *Cratæva gynandra* . . . . . 10 "  
 Fruit comestible ayant le goût de l'ail; l'écorce des racines est un vésicant énergique.  
 t *Crescentia Cujete* . . . . . 5 à 10 "  
 Le *Calebassier*, dont les habitants de l'Amérique équinoxiale tirent leur vaiselle; sa pulpe est astringente, laxative, apéritive; les nègres la mangent et on en fait aussi des cataplasmes.  
 — *regalis* . . . . . 10 "  
 i *Croton Cascarilla* . . . . . 3 "  
 L'écorce est très-employée en médecine comme stimulante, tonique, légèrement astringente; les feuilles, données en infusion théiforme, sont digestives.  
 n *Cupania undulata* . . . . . 10 "  
 Les fruits du *Cupania*, cuits avec du sucre et de la cannelle, sont administrés dans les diarrhées.  
 ag *Cyperus papyrus* . . . . . 2 "  
 Plante aquatique très-curieuse, justement célèbre, parce que des lames du tissu léger de sa grosse tige formaient le papier des anciens ou le papyrus.  
 Variété à feuilles glauques en dessous.  
 c *Cyrtosiphonia spectabilis* . . . . . 5 "  
 or *Dillenia speciosa* . . . . . 10 "  
 Le jus encore acide du *Dillenia speciosa*, mêlé avec du sirop de sucre, est considéré, aux Indes, comme un excellent bécique. On dit que les fruits mûrs sont laxatifs et provoquent même la diarrhée.  
 n *Dischidia Bengalensis* . . . . . 5 "  
 Employé comme dépuratif dans certaines affections spéciales.  
 n *Dorstenia multiformis* . . . . . 10 "  
 c *Dracæna draco* . . . . . 2 "  
 Sang-dragon. Cette espèce laisse couler de son tronc une gomme-résine rouge, qui constitue l'une des sortes de Sang-dragon des pharmacies. Cet arbre est susceptible d'acquiescer des proportions colossales.  
 or *Dipterix odorata* . . . . . 20 "  
 Cette espèce produit la fève odorante dite *Tonka*; feuilles ailées, fleurs pourpres en panicle.  
 t *Durio zibethinus* . . . . . 5 à 10 "  
 Le *Dourian* produit l'un des meilleurs fruits des Moluques, atteignant la grosseur d'une tête d'homme.  
 n *Elæococca cordata* . . . . . 15 "  
 f *Eriobothrya Japonica* . . . . . 5 "  
 Le *Bibacier*, dont les fruits nommés *Nêfles du Japon*, sont excellents; on en fait une bonne liqueur de table.  
 t *Erythroxylon Coca* . . . . . 3 à 6 "  
 Plante officinale à fleurs blanches, très-recherchée des Indiens pour les propriétés excitantes de ses feuilles, qui sont aujourd'hui très-employées en médecine.  
 n *Erythrina indica* ou *corallodendron* 5 "  
 Arbre immortel. L'écorce est fébrifuge. Les semences servent à faire des chapelets et, de temps immémorial, sont employées comme poids, en Abyssinie. Le bois, nommé *bois corail*, *bois immortel*, est très-employé par les tourneurs pour faire des gaines d'épée et de couteau. On peut en fabriquer des laques.  
 n *Eugenia littoralis* . . . . . 3 "  
 — *Michellii* . . . . . 5 à 10 "  
 On en mange les fruits au Brésil, en guise de cerise.  
 n — *pseudocaryophylloides* . . . . . 5 à 10 "  
 Ses feuilles ont l'odeur des clous de Girofle.  
 n 164. *Euterpe edulis* . . . . . 2 à 200 "  
 Palmier à très-grandes feuilles pennées-pectinées, produisant des fruits globuleux d'un violet noirâtre, luisants, renfermant un liquide épais et crêmeux ayant un goût de noix, et dont les naturels du Brésil font un grand usage.

## Fr. C.

- t *Ficus edulis* . . . . . 2 "  
 pl — *elastica* . . . . . 2 à 10 "  
 L'une des plus belles plantes de la serre tempérée, passant l'été en pleine terre, en plein air; feuilles grandes, luisantes, d'un vert sombre; son suc laiteux produit du Caoutchouc.  
 n *Galipea pentandra* . . . . . 15 "  
 or *Garcinia indica* . . . . . 20 à 50 "  
 On en retire la *Gomme-gutte* par l'incision des jeunes rameaux; on mange les fruits acides.  
 n — *Mangostana* (FLORE, XXII, 191)  
 75 à 150 "  
 Le *Mangoustain*, dont le fruit rouge, violacé, acidulé, est un des plus exquis des régions tropicales.  
 — *Livingstonei* . . . . . 10 à 25 "  
 Le *Mangoustain* d'Afrique.  
 fr *Gelsemium sempervirens* . . . . . 2 "  
 n *Genipa americana* . . . . . 25 "  
 Le fruit, de la grosseur d'une orange et d'un vert blanchâtre, contient du jus d'un pourpre foncé, d'un goût agréablement vineux.  
 or *Gnetum Gnemon* . . . . . 10 à 20 "  
 Aux Moluques on mange les graines cuites, rôties et frites et les feuilles, préparées comme les épinards, constituent un des mets favoris des habitants.  
 On fait des filets avec les fibres de l'écorce.  
 n *Guayacum arboreum* . . . . . 15 "  
 — *officinale* . . . . . 15 "  
 e *Guilandina Bonducella* . . . . . 10 "  
 Légumineuse vulgairement nommée *Bondué*; la graine est amère, vomitive; la racine est astringente et se donne en décoction contre la morsure des serpents.  
 n *Gynocardia odorata* . . . . . 15 "  
 Les graines sont beaucoup employées par les naturels de l'Inde pour la guérison des maladies cutanées.  
 Après les avoir débarrassées de leurs téguments on les pile et, au moyen de beurre clarifié, on en fait une pâte molle que l'on applique trois fois par jour sur la partie affectée.  
 t *Hæmatoxylon campechianum* . . . . . 10 "  
 Bois de Campêche ou bois rouge; l'écorce, légèrement astringente, est employée dans les diarrhées chroniques et la dysenterie.  
 n *Heritiera littoralis* . . . . . 5 "  
 Feuilles ovales, blanchâtres en dessous; fleurs petites, rouges, en panicle axillaire; fruits comestibles.  
 n *Hippobromus alatus* . . . . . 6 "  
 D'un usage général, comme bois de charpente, au Cap de Bonne-Espérance.  
 n *Hippomane ilicifolium* . . . . . 10 "  
 Le fruit en est très-vénéneux.  
 fr *Illicium anisatum* . . . . . 2 à 5 "  
 Anis de la Chine. Bois d'Anis. Les Chinois en mâchent continuellement les capsules comme stomachiques, carminatives, surtout après le repas. On les emploie aussi aux mêmes usages en Europe, soit en médecine humaine, soit en médecine vétérinaire.  
 Elles servent à faire la liqueur dite anisetée.  
 n — *floridanum* . . . . . 2 à 6 "  
 — *religiosum* . . . . . 5 "  
 Les graines de cette espèce sont tellement odoriférantes que les Chinois les brûlent dans leurs temples, comme on brûle l'encens dans les églises catholiques.  
 t *Jambosa densiflora* . . . . . 5 "  
 n — *Korthalsi* . . . . . 2 "  
 — *purpurascens* . . . . . 5 à 10 "  
 Le *Jambosier* produit des fruits dont la médecine a tiré parti et qui servent aussi à des usages culinaires.  
 or *Jonesia asoca* . . . . . 10 "  
 n *Kopsia fruticosa* . . . . . 5 "  
 Arbre des Moluques à fleurs roses, auxquelles succèdent des drupes coriaces.

	Fr. C.
t <i>Landolphia florida</i> . . . . .	5 "
" — <i>Kirkii</i> . . . . .	10 "
" — <i>Watsoniana</i> . . . . .	5 "
fr <i>Laurus camphora</i> . . . . .	5 à 15 "
Le <i>Camphrier</i> , en belles tiges de près d'un mètre de hauteur, à magnifique feuillage. A cultiver à la manière des Lauriers.	
t <i>Machærium firmum</i> . . . . .	3 "
D'un port très-distiqué; produit une sorte de Palissandre.	
" <i>Maranta arundinacea</i> . . . . .	3 "
La racine de ce <i>Maranta</i> donne de l' <i>Arow-root</i> .	
t <i>Memecylon ramiflorum</i> . . . . .	5 "
Ses feuilles sont employées à Ceylan pour teindre le coton en jaune.	
" <i>Monodora Myristica grandiflora</i> . . . . .	10 "
Le <i>Muscadier</i> de Guinée.	
" <i>Morinda Rojoc</i> . . . . .	5 "
L'extraît de la racine, ainsi que la poudre, sont purgatifs. On s'en sert aussi pour faire de l'encre.	
" <i>Murraya exotica</i> . . . . .	10 "
Le buis de Chine. Le bois sert dans l'ébénisterie et surtout aux tourneurs.	
t 68. <i>Musa Cavendishi (sinensis)</i> . . . . .	8 à 25 "
Le <i>Bananiér</i> de Chine.	
" 69. — <i>coccinea</i> (FL., VII, 213) . . . . .	8 à 10 "
e 71. — <i>Ensete</i> (FLORE, XIV, 65) . . . . .	10 "
Le grand <i>Bananiér</i> d'Abyssinie, très-rustique, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques; ses feuilles sont d'un beau vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Cette magnifique plante produit un effet très-pittoresque et très-ornemental quand on la met l'été en plein air. Il va de soi qu'on doit la rentrer en serre à l'approche de la mauvaise saison.	
t 73. — <i>paradisica, forts</i> . . . . .	10 à 25 "
Le <i>Bananiér</i> ordinaire, produisant un fruit dit <i>Pomme de Paradis</i> .	
" 74. — <i>rosacea</i> . . . . .	5 à 10 "
t 75. — <i>sanguinea</i> . . . . .	10 à 20 "
" 99. — <i>violacea</i> . . . . .	15 "
Son fruit est astringent, alimentaire; on en tire de l'alcool.	
cr 77. — <i>vittata</i> (FLORE, XV, 25) . . . . .	10 à 20 "
" 78. — <i>zebrina</i> (FLORE, X, 223) . . . . .	15 "
" <i>Myristica moschata</i> . . . . .	50 à 200 "
Le <i>Muscadier</i> des Moluques, à beau feuillage et à jolies fleurs jaunes auxquelles succèdent les noix si connues.	
t <i>Myroxylon balsamiferum</i> . . . . .	10 "
Produit le <i>Baume</i> dit du <i>Pérou</i> , mais est originaire du Brésil.	
" <i>Myrrhinium sarcopetalum</i> . . . . .	10 "
e <i>Myrthus Pimenta</i> . . . . .	4 à 6 "
Son fruit ou coque est excitant et aromatique; on s'en sert dans l'art culinaire et dans la parfumerie.	
fr — <i>Ugni</i> . . . . .	2 "
Au Chili les feuilles servent en guise de thé et on fait, avec les baies très-aromatiques, une sorte de vin que l'on préfère au muscat pour ses qualités stomachiques.	
t 25. <i>Pandanus utilis</i> . . . . .	15 "
Avec ses feuilles divisées en lanières, on fait les sacs dans lesquels on emballe le café. Ses graines sont mangeables ainsi que les feuilles de l'intérieur des faisceaux de la tige. Un bouquet de ses fleurs suffit pour parfumer une chambre pendant un mois.	
e 22. <i>Passiflora edulis</i> . . . . .	2 "
On mange le fruit et on en fait un sirop acide.	
t <i>Paullinia oceanica</i> . . . . .	5 "
Poison violent.	
" <i>Persea gratissima</i> . . . . .	4 "
L' <i>Avocatier</i> , très-estimé pour son fruit qui est astringent; grandes feuilles coriaces, fleurs blanchâtres.	
pt <i>Phormium tenax</i> . . . . .	1 à 25 "
Le Lin de la Nouvelle-Zélande.	

	Fr. C.
t <i>Physocalyx edulis</i> . . . . .	5 "
" <i>Platonia insignis</i> . . . . .	20 "
" <i>Pilocarpus pinnatifidus</i> . . . . .	15 "
" <i>Piper Betle</i> . . . . .	3 "
Le suc des feuilles est prescrit comme fébrifuge; on le donne aussi dans l'hystérie. Les feuilles, mêlées à de la chaux éteinte, constituent le <i>bétel</i> , dont les habitants de l'Asie tropicale se servent continuellement comme masticatoire et digestif.	
" 10. — <i>Cubeba</i> . . . . .	5 "
Le <i>Cubèbe</i> est aromatique, stomachique, stimulant et employé surtout dans le traitement des maladies des voies urinaires.	
" 11. — <i>excelsum</i> . . . . .	2 "
Quelques tribus sauvages s'en servent pour faire une boisson enivrante.	
e 14. — <i>Futokadsura</i> . . . . .	2 "
<i>Poirier</i> du Japon.	
t 12. — <i>incanum</i> . . . . .	2 "
" 13. — <i>nigrum</i> . . . . .	5 "
Produit le poivre commun, condiment ordinaire de tous nos mets.	
pt <i>Plectranthus fruticosus</i> . . . . .	2 "
Genre de <i>Coleus</i> à feuillage charnu, à senteur de citron.	
e <i>Pogostemon Patchouli</i> . . . . .	2 "
Plante bien connue pour le parfum aromatique qu'on en tire, feuillage velu, fleurs blanchâtres.	
fr <i>Punica granatum</i> . . . . .	50 "
Le <i>Grenadier</i> commun. L'écorce de la racine a des propriétés anthelminthiques très-énergiques, on l'emploie avec succès contre le ténia.	
t <i>Quivisia heterophylla</i> . . . . .	10 "
" 81. <i>Ravenala madagascariensis</i> (FL., XIII, 117 et XXI, 161) . . . . .	3 "
L' <i>Arbre du Voyageur</i> , dont les feuilles distiques, longuement pétiolées, peuvent atteindre 5 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magnifique effet.	
t <i>Saccharum officinarum</i> . . . . .	10 "
Le <i>Canne à sucre</i> des Indes.	
" — <i>violaceum</i> . . . . .	10 "
Le <i>Canne à sucre</i> de Batavia; on en retire le sucre des Iles dont les usages sont si connus et si multiples, en médecine et en économie domestique.	
" <i>Salvadora persica</i> . . . . .	5 "
L' <i>Arbre Sénévé</i> , dont parle l'Écriture, ainsi que l'a démontré le docteur Boyle. Le fruit, succulent, a une odeur aromatique fortement prononcée et le goût du cresson; on le dit comestible. L'écorce des racines est singulièrement âcre; écrasée et appliquée sur le peau, elle sert de vésicatoire aux indigènes de l'Inde. Les feuilles sont purgatives.	
" <i>Sapindus emarginatus</i> . . . . .	10 "
Les fruits écrasés dans de l'eau donnent une mousse abondante et servent au lessivage du linge aux Indes.	
t <i>Sapota Achras</i> . . . . .	8 "
Le <i>Sapotillier</i> , dont les fruits sont comestibles et délicieux.	
" <i>Sideroxylon Mastichodendron</i> . . . . .	5 à 10 "
Le <i>Bois de fer</i> , dont on fait usage dans les arts industriels.	
" — <i>argenteum</i> . . . . .	10 "
" <i>Simaruba excelsa</i> . . . . .	5 "
Plante officinale à feuillage ornemental; sa racine et son écorce sont toniques et antidyssentériques.	
" <i>Smilax Salsaparilla</i> . . . . .	3 "
La <i>Salsepareille</i> , si usitée en médecine, est un sudorifique très-actif.	
" — <i>medica</i> . . . . .	5 "
Mêmes propriétés que la précédente.	
e <i>Stadmannia sorbifolia</i> . . . . .	15 "
Feuillage très-ornemental.	
t <i>Sterculia foetida</i> . . . . .	10 "
La décoction des fruits est mucilagineuse et astringente. On extrait des semences beaucoup d'huile bonne à manger et à brûler.	



## Fr. C.

- t* **Stravadium insigne** . . . . . 10 "  
*"* **Swietenia Mahagoni** . . . . . 10 "  
 Cette espèce fournit l'*Acajou* dont l'usage est aujourd'hui universel.

*or* **Tamarindus indica** . . . . . 5 "  
 Ce *Tamarin* a des feuilles pennées et des fleurs jaunes; la pulpe de son fruit est rafraîchissante à petite dose et laxative à haute dose.

*"* **Terminalia Catappa** . . . . . 5 "  
 Le *Badamier*; arbre de Malabar, qui donne des amandes émulsives très-agréables à manger et fournissant par l'expression une huile douce analogue à celle de l'olive, mais supérieure à celle-ci en ce qu'elle ne rancit pas.

*pt* **Tetrapanax papyrifera (Aralia)**  
 (FLORE, VIII, 153) . . . . . 2 à 4 "

Arbuste dont les tiges renferment, dans leur intérieur, une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour le tirage des gravures fines.

*e* **Thea Bohea** . . . . . 3 à 6 "  
*"* — **japonica foliis argenteo-marginatis** . . . . . 2 à 4 "

## Fr. C.

*e* **Thea viridis** . . . . . 3 "  
 Les feuilles de *Thea* constituent le thé du commerce, dont l'usage est aujourd'hui si universellement répandu.

*or* **Theobroma Cacao** . . . . . 10 à 25 "  
 Ses graines sont la base du *Chocolat*.

*t* **Urostigma Vogelii** . . . . . 5 à 10 "  
 Plante cultivée sur une grande échelle aux Indes pour la production de la gomme élastique, qu'elle contient en grande quantité.

*"* **Urvillea ferruginea** . . . . . 5 "

*"* **Vanguiera edulis** . . . . . 10 "

Porte des fruits très-estimés à Madagascar, où il est connu sous le nom de *Voa-Vanga*.

*"* **Vanilla aromatica** . . . . . 10 "

Orchidée grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres, quand on en féconde artificiellement les fleurs. Ses fruits constituent la *Vanille* du Commerce.

*"* **Xanthochymus pictorius** . . . . . 15 à 30 "  
 Le suc peut servir en teinture.

## SERRE FROIDE.

## Fr. C.

**Abelia rupestris** . . . . . 2 "  
 Jolies fleurs d'un blanc pur, à odeur suave.

— **grandiflora** . . . . . 2 "

22. **Abutilon Darwinii** . . . . . 1 "

25. — **majus** . . . . . 1 "

26. — **robustum** . . . . . 1 "

27. — **roseum floribundum** . . . . . 1 "

23. — **tessellatum** . . . . . 1 "

4. — **megapotamicum** . . . . . 1 "

11. — **variegatum** . . . . . 1 "

35. — **striatum Bouletii** . . . . . 1 "

6. — **foliis variegatis** . . . . . 1 "

13. — **var. Boule de neige** . . . . . 1 "

37. — **Jules Pourbaix** . . . . . 1 "

36. — **Le Rhône** . . . . . 1 "

30. — **Prince d'Orange** . . . . . 1 "

32. — **Rêve d'or** . . . . . 1 "

28. — **roseiflorum** . . . . . 1 "

34. — **Thompsoni flore pleno** . . . . . 2 "

Variété à fleur bien pleine, d'un riche orange strié et nerve de cramoi, ressemblant pour le port et le feuillage panaché à l'ancien *Ab. Tomponi*.

31. — **Violet Queen** . . . . . 1 "

Les *Abutilon* sont des arbustes très-florifères, à grandes feuilles cordées, à grandes et gracieuses fleurs pendantes, blanches, roses, jaunes, etc., parfois veinées ou reticulées.

**Acacia albicans** . . . . . 2 à 5 "

— **angustifolia** . . . . . 2 "

— **argyrophylla** . . . . . 2 "

— **cordata** . . . . . 2 à 5 "

— **dealbata** . . . . . 2 "

— **Drummondii, fort** . . . . . 8 à 15 "

— **exsudata** . . . . . 2 "

— **floribunda splendens** . . . . . 2 "

— **glauca Hugelii** . . . . . 2 "

— **grandis** . . . . . 2 à 15 "

— **heterophylla** . . . . . 2 "

## Fr. C.

**Acacia Latrobæi** . . . . . 2 à 4 "

— **laucophylla** . . . . . 2 "

— **lineata** . . . . . 2 à 6 "

— **longifolia** . . . . . 2 à 5 "

— **lophantha** . . . . . 1 à 3 "

— **Neumanni** . . . . . 1 à 3 "

— **ornata** . . . . . 1 "

— **paradoxa** . . . . . 1 à 10 "

— **pendula** . . . . . 2 "

— **Riceana** . . . . . 2 à 15 "

— **rusciflora** . . . . . 2 "

— **salicifolia** . . . . . 2 "

— **Sophoræ** . . . . . 1 "

— **spectabilis excelsa** . . . . . 2 "

— **verticillata, fort** . . . . . 2 à 10 "

Les *Acacias* sont de charmants arbrisseaux à feuillage très-diversifié, à fleurs en boules ou gouppillons, formés des filets staminaux, fort légères et d'un effet très-agréable, variant du jaune très-pâle au jaune foncé.

**Adenandra fragrans** . . . . . 2 à 10 "

3204. **Agapanthus minor Mooreanus** . . . . . 25

les douze . . . . . 2 50

3205. — **minor Saundersianus** . . . . . 2 "

les douze . . . . . 20 "

3208. — **umbellatus** . . . . . 50

les douze . . . . . 5 "

Grande plante à feuilles gladiées, distiques, à fleurs en fortes ombelles, d'un beau bleu ardoisé.

3209. — **flore albo** . . . . . 2 "

3210. — — **monstrosus** . . . . . 50

les douze . . . . . 5 "

3211. — — **bicolori** . . . . . 2 "

3216. — — **pleno** . . . . . 6 "

Nouveauté de premier ordre, à très-grands bouquets de fleurs doubles, bleues.

3212. — — **foliis albo-vittatis** . . . . . 2 50

Agapanthe à beau feuillage nettement rubané de blanc, propre pour la décoration des appartements.

	Fr. C.
3213. <i>Agapanthus umbellatus foliis aureo-vittatis</i> . . . . .	6 "
Variété à beau feuillage, rubané de jaune.	
3217. — — <i>giganteus</i> . . . . .	12 "
Variété remarquable par les dimensions du feuillage et de l'inflorescence.	
3214. — — <i>maximus</i> . . . . .	2 "
<i>les douze</i> . . . . .	
Fleurs bleues, plus grandes que celles du type.	
3215. — — — <i>flore albo.</i> . . . .	2 50
<i>les douze</i> . . . . .	
<i>Agave americana</i> . . . . .	2 à 5 "
— — — <i>foliis medio pictis</i> . . . . .	5 "
— — — <i>striatis</i> . . . . .	2 à 5 "
— — — <i>variegatis</i> . . . . .	2 à 5 "
— <i>applanata</i> . . . . .	2 à 6 "
<i>les douze</i> . . . . .	
— <i>attenuata</i> . . . . .	5 à 15 "
— <i>Celsiana, fort.</i> . . . .	15 "
— <i>chloracantha</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>densiflora</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>filifera</i> . . . . .	5 à 10 "
— — <i>major, fort.</i> . . . .	5 à 40 "
— <i>heteracantha Toneliana</i> . . . . .	5 "
— <i>Kerchovai</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>macrodonta</i> . . . . .	25 "
— <i>mexicana</i> . . . . .	2 à 10 "
— <i>micracantha</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>Milleri picta</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>mitræformis</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>Ousselghemiana</i> . . . . .	5 "
— <i>Palmerii</i> . . . . .	5 "
— <i>Parreyi</i> . . . . .	5 à 15 "
— <i>Pringlei</i> . . . . .	5 "
— <i>Salmiana</i> . . . . .	5 à 25 "
— <i>Sartorii latifolia</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>univittata, fort.</i> . . . .	15 "
— <i>Vandervini</i> . . . . .	5 à 10 "
— <i>Verschaffelti</i> . . . . .	5 à 25 "
— <i>xalapensis, fortis</i> . . . . .	5 à 25 "
— <i>Yxtli</i> . . . . .	5 à 25 "
12 <i>Agave (en 12 sortes, belles plantes)</i> . . . . .	30 à 50 "

Les *Agaves* sont des plantes qui font un fort bel effet dans les jardins, sur les perrons ou sur les murs bas; leurs feuilles, en touffes régulières, sont très-charnues, épineuses pour la plupart. Les fleurs, en girandole étagée, rarement en grappe, très-hautes, sont remarquables par leur port et par leur ensemble,

<i>Ageratum celestinum</i> . . . . .	" 50
<i>Agnostus sinuatus (Stenocarpus Cunninghamii)</i> (FLORE, III, 189) . . . . .	4 à 25 "
— — <i>integrifolius</i> . . . . .	3 à 40 "
<i>Aloe albo-cincta</i> . . . . .	5 "
— <i>depressa</i> . . . . .	1 "
— <i>ferox</i> . . . . .	5 à 40 "
— <i>retusa</i> . . . . .	2 "
— <i>tessellata</i> . . . . .	2 "
— <i>variegata</i> . . . . .	2 "

Les *Aloes* sont de petites plantes presque sans tige, à feuilles distiques ou en rosette, très-charnues et d'un aspect original; les fleurs blanchâtres, verdâtres, rouge brique, etc., sont réunies en longs épis. On peut les ranger parmi les plantes d'ornement, à côté des *Agaves*.

	Fr. C.
<i>Ampelopsis sempervirens</i> . . . . .	2 "
— <i>striata</i> . . . . .	1 "
Vigne vierge de récente introduction, très-ornementale, à feuilles vertes persistantes, se colorant à l'automne d'une teinte rougeâtre.	
<i>Amphicome arguta</i> . . . . .	1 "
<i>Andromeda floribunda</i> . . . . .	4 "
<i>Anigossanthus coccineus</i> . . . . .	1 "
— <i>pulcher</i> . . . . .	1 "
<i>Anopterus glandulosa</i> . . . . .	2 à 4 "
<i>Anthericum variegatum (Phalangium)</i> . . . . .	1 "
<i>Aotus gracillima</i> . . . . .	2 "
<i>Aponogeton distachyon (FLORE, XVII, 125)</i> . . . . .	2 à 4 "
Plante aquatique à jolies fleurs distiques, blanches, odorantes.	
<i>Aralia crassifolia</i> . . . . .	3 à 15 "
— <i>spathulata</i> . . . . .	4 à 15 "
— <i>papyrifera</i> . . . . .	2 à 4 "
— <i>quinquefolia</i> . . . . .	3 à 10 "
— <i>Sieboldii</i> . . . . .	1 à 2 "
— <i>aureo-reticulata</i> . . . . .	4 à 8 "
— <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . .	2-50 à 5 "
— <i>aureo-marginatus</i> . . . . .	3 à 6 "
— <i>Moseri</i> . . . . .	3 "
— <i>trifoliata</i> . . . . .	2 à 10 "
— <i>Baueri</i> . . . . .	3 à 10 "
— <i>Cookii</i> . . . . .	3 "
— <i>Cunninghamii</i> . . . . .	3 à 10 "
— <i>Enkei</i> . . . . .	3 à 10 "
— <i>heteromorpha</i> . . . . .	3 à 10 "
— <i>latifolia</i> . . . . .	3 à 10 "

Les *Aralia* sont des arbrisseaux d'un port distingué, à feuillage ample, ordinairement digité, palmé, etc., à grandes panicules de fleurs blanchâtres.

<i>Araucaria Bidwilli (FL., XXI, 119)</i> . . . . .	5 à 15 "
— <i>Cunninghamii</i> . . . . .	5 à 600 "
— <i>excelsa</i> . . . . .	5 à 15 "
<i>forts exemplaires.</i> . . . .	
— — <i>glauca</i> . . . . .	20 à 40 "
— — <i>hybrida Joz. Nap. Baumann</i> . . . . .	20 à 100 "
— — <i>robusta</i> . . . . .	20 à 25 "
— <i>Goldiana</i> . . . . .	20 à 40 "

Très-belle espèce à superbe feuillage, d'un port majestueux. Ses feuilles en verticilles sont pendantes et d'un vert foncé.

— <i>imbricata (FLORE XV, 147 et 151)</i> . . . . .	de 60 environ . . . . . 6 "
— <i>Semis de 4 ans la pièce</i> . . . . .	1 25
<i>le cent.</i> . . . .	
— <i>Rulei</i> . . . . .	15 à 100 "

Conifère du Chili, d'un aspect étrange, à branches verticillées garnies de feuilles ovales-lancéolées, luisantes, raides, d'un vert foncé, terminées en pointe plus colorée que le limbe.

— *Rulei* . . . . . 15 à 100 "

Espèce d'un port pieux des plus élégants.

Les *Araucaria* sont des Conifères des plus élégants et constituent, par leur feuillage original, un des principaux ornements des serres froides et des jardins d'hiver.

<i>Aristolochia ciliosa</i> . . . . .	2 "
143. <i>Arundo conspicua</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	
Graminée ornementale d'un bel effet.	
<i>Astelia Banksii</i> . . . . .	1 à 3 "



Fr. C.

- Astelma eximium** (*Helipterum*) . . . 3 "
211. **Bambusa aureo-striata** . . . 1 "
- les douze* . . . 10 "
212. — **Fortunei foliis niveo-vittatis**  
(FLORE, XV, 69) . . . n 50
- les douze* . . . 5 "
- Charmant petit Bambou à feuillage nettement rubané de blanc, très-constant, et dont on fait de très-jolies bordures.
216. — **Simonii** . . . 3 "
- Banksia integrifolia** . . . 4 à 15 "
- **verticillata** . . . 4 à 15 "
- Les Banksia* sont des arbrisseaux touffus, à feuillage d'un vert cendré en dessus, cotonneux ou roussâtre en dessous, de formes diverses et d'un grand effet ornemental. Leurs fleurs en têtes terminales sous forme de gros châtons, presque toujours d'un jeune ferrugineux ou verdâtre, sont fort originales.
- Beaucarnea glauca** (FLORE, XVIII, 26) . . . 2 "
- Benthania fragifera** (FL., VII, 261) . . . 2 "
- Arbrisseau toujours vert, à fleurs blanches, entourées d'un grand involucre jaune, auxquelles succèdent de jolis fruits d'un rouge orange, de la grosseur d'une cerise.
- Berberidopsis corallina** (FL., XX, 141) . . . 3 "
- Arbuste du Chili à joli feuillage dentelé, à jolies fleurs pendantes, d'un beau rouge cocciné.
- Berberis Darwinii** (FLORE, VII, 47) . . . 1 "
- **Jamesoni** . . . 2 "
- **macrophylla** . . . 2 "
- Beschorneria yuccoides** . . . 2 "
- Grande plante à l'aspect de *Yucca*, à feuilles molles, épaisses; hampe florale de plus d'un mètre, garnie de fleurs verdâtres avec bractées colorées.
- Bignonia capreolata** . . . 2 "
- Arbrisseau grimpant à fleurs jaunes en dedans, d'un rouge orangé en dehors.
- Bonaparteia juncea** . . . 2 "
- **gracilis** . . . 2 à 15 "
- Boronia elatior** . . . 2 à 25 "
- **megastigma** . . . 4 à 15 "
- **polygalæfolia** . . . 2 à 15 "
- **tetranda** . . . 10 "
- **viminea major** . . . 2 "
- Les Boronia* sont des arbustes mignons, à très-petit feuillage simple ou ailé, à charmant fleurs très-abondantes, de coloris variés, dans les tons rose vif ou carné.
46. **Bouvardia var. Alfred Neuner** . . . 2 "
- Superbe variété à fleurs doubles, blanches, excellentes pour bouquets.
24. — — **Bridal Wreath** . . . 2 "
28. — — **candidissimum** . . . 2 "
25. — — **Davidsoni** . . . 2 "
50. — — **Dazzler** . . . 2 "
21. — — **elegans** . . . 2 "
54. — — **Hogarthi fl. pl.** . . . 5 "
39. — — **jasminiflora** . . . 2 "
47. — — **Lady Dislop** . . . 2 "
49. — — **President Garfield** . . . 2 "
- Variété très-florifère, produisant de grands bouquets de fleurs doubles, d'un rose vif.
48. — — **Priory Beauty** . . . 2 "
- Belle variété, compacte et bien garnie, donnant des bouquets de fleurs d'un rose tendre satiné.
42. — — **rosea salmonea** . . . 2 "
56. — — **Rubis** . . . 2 "
51. — — **Sang lorrain** . . . 2 "
12. — — **splendens** . . . 2 "
52. — — **Triomphe de Nancy** . . . 3 "

Fr. C.

53. **Bouvardia var. Victor Lemoine** . . . 2 "
- Superbes variétés nouvelles se couvrant de gros bouquets de fleurs doubles, vermillon vif chez la première, rouge feu chez la seconde.
27. — — **Vreelandi (Standish)** . . . 2 "
- 12 **Bouvardia en 12 sortes, à notre choix** 15 "
- Les Bouvardia* sont des plantes de culture très-facile, qui passent l'été dehors, en pleine terre, où elles fleurissent parfaitement; leurs fleurs tubuleuses, réunies en cimes, sont variées de couleurs: blanches, roses, rouges dans tous les tons, etc.
- Brachysema acuminatum** . . . 2 à 10 "
- Bromelia Joinvillei** . . . 2 à 10 "
- Brugmansia arborea alba (Datura)** . . . 4 "
- **coccinea** . . . 4 "
- **Knighti fl. pl.** . . . 4 "
- **sanguinea (Fl., XVIII, 101)** . . . 4 "
- Grandes fleurs pendantes, longues de 20 centimètres, d'abord jaunâtres, puis se colorant en rouge sang sur le limbe et dans la gorge.
- Buxus citrifolia** . . . 2 "
- Calcéolaires herbacées: graines,**  
*le paquet* . . . 5 "
- Chaque paquet est signé de ma main et scellé de mon cachet il porte l'inscription suivante:  
« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite.
- (Signé) L. VAN HOUTTE, »
- Soins à donner aux semis de Calcéolaires.**  
Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre, recouvrir la terrine d'un carreau de verre, couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (torse que les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.
- Camptosema rubicundum** . . . 2 "
- Cantua dependens (FL., VII, 11)** . . . 2 "
- Arbuste donnant de grandes et belles fleurs nantes à tube jaune rougeâtre, à limbe rouge vif.
- Cardwellia sublimis** . . . 5 à 15 "
- Cassia corymbosa** . . . 2 "
- **grandiflora** . . . 2 "
- **lævigata** . . . 2 "
- Espèce naine de la Californie, à feuilles persistantes, d'un jaune d'or en dessous.
- Centaurea candidissima** . . . n 50
- Espèce à feuillage blanchâtre, convenable pour être alternée, dans les massifs, avec d'autres plantes à feuillage diversement coloré, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles elle fera un bel effet de contraste.
- Ceratonia siliqua** . . . 2 "
- Ceratopetalum gummiferum** . . . 2 "
- Cestrum aurantiacum** . . . 2 "
- Arbrisseau du Guatemala à fleurs d'un jaune orangé, disposées en grappes.
- Choisya ternata** . . . 1 à 30 "
- Charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches, odorantes, supportant la pleine terre dans le centre de la France et en Angleterre.
- Chorizema Lawrenceanum** . . . 2 "
- **macrophyllum** . . . 2 "
- **splendens** . . . 2 "
- **rotundifolium** . . . 2 "

	Fr. C.
<b>Chorizema</b> var. <i>ilicifolium</i> . . . . .	2 "
Les <i>Chorizema</i> sont des arbustes de la Nouvelle-Hollande, fort jolis de feuillage et de fleurs.	
<b>Cineraria</b> <i>maritima</i> . . . . .	" 50
Feuillage blanchâtre.	
— <i>candidissima</i> . . . . .	" 50
Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente espèce, de grand effet dans les massifs.	
<b>Cinnamomum</b> <i>brevifolium</i> . . . . .	2 "
— <i>pedunculatum</i> . . . . .	4 "
— <i>foliis variegatis</i> . . . . .	6 "
20. <b>Citrus</b> <i>Aurantium foliis variegatis</i> . . . . .	3 à 10 "
— — à fruits doux, d'environ un mètre de hauteur, de 4 ans de greffe sur fort sujet, garni d'une belle tête . . . . .	
forts . . . . .	10 "
2. — <i>taitensis</i> . . . . .	1 à 3 "
Oranger nain de Taïti, se couvrant, chaque année, de fleurs et de petits fruits, et ne demandant, pour ainsi dire, aucun soin. Mignonne plante d'ornement pour la serre froide.	
330. <b>Clematis</b> <i>coccinea</i> . . . . .	3 "
Espèce toute nouvelle, vivace, grimpante, atteignant 4 à 5 mètres de longueur, fleurissant abondamment depuis juin jusqu'aux gelées; fleurs en forme de clochettes, d'un riche rouge corail corailé, luisant, conservant leur coloris longtemps après avoir été coupées.	
<b>Clethra</b> <i>arborescens</i> . . . . .	4 à 15 "
— <i>foliis variegatis, sur tige</i> . . . . .	10 à 20 "
<b>Cleyera</b> <i>japonica</i> . . . . .	5 "
Bel arbrisseau du Japon à feuilles arrondies, coriaces, rougeâtres.	
— <i>foliis roseo-marginatis, fort</i> . . . . .	25 "
<b>Clianthus</b> <i>puniceus</i> . . . . .	1 "
— <i>magnificus</i> . . . . .	2 "
Arbuste semi-ligneux, à joli feuillage penné, à grappes pendantes de belles et grandes fleurs d'un rouge vif, de grand effet.	
<b>Cobaea</b> <i>scandens</i> . . . . .	" 50
Plante grimpante à fleurs pourprées, longues de 6 à 8 centimètres.	
<b>Cæsalpinia</b> <i>japonica</i> . . . . .	2 "
<b>Colletia</b> <i>ferox bictoniensis</i> (FLORE, XIV, 157) . . . . .	2 "
Arbrisseau du Chili à fleurs axillaires, nutantes, blanches.	
— <i>horrida</i> . . . . .	2 "
<b>Convolvulus</b> <i>mauritanicus</i> (FL., XXI, 61) n 50	
Espèce très-florifère à cultiver en corbeille, se garnissant de charmantes fleurs bleues.	
<b>Coprosma</b> <i>Baueriana foliis albo-marginatis</i> . . . . .	1 à 3 "
Très-joli feuillage, ondulé dans le milieu, largement bordé de blanc, très-ornemental.	
— <i>Stokii</i> . . . . .	2 à 5 "
<b>Correa</b> <i>cardinalis</i> (FLORE, XI, 143) . . . . .	2 "
La fleur a le tube d'un rouge vif, le limbe, découpé en quatre lobes, d'un jaune verdâtre, et le calyce d'un roux ferrugineux.	
— <i>ventricosa</i> . . . . .	2 "
<b>Coronilla</b> <i>glauca fol. var.</i> . . . . .	2 "
<b>Corynocarpus</b> <i>latifolia</i> . . . . .	3 "
<b>Cosbæa</b> <i>coccinea</i> . . . . .	2 à 5 "
<b>Cotyledon</b> <i>orbicularis</i> . . . . .	1 "
— <i>punctatissima</i> . . . . .	1 "
— <i>undulata (sinuata)</i> . . . . .	1 "
Les <i>Cotyledon</i> sont des plantes grasses à feuilles très-charnues, glauques, et à fleurs tubuleuses, rougeâtres.	

	Fr. C.
<b>Crassula</b> <i>coccinea</i> . . . . .	1 "
— <i>jasminia</i> . . . . .	1 "
Fleurs blanches, très-odorantes.	
— <i>lactea</i> . . . . .	1 "
— <i>lycopodioides</i> . . . . .	1 "
— <i>perfoliata</i> . . . . .	1 "
— <i>repens</i> . . . . .	" 50
<b>Crowea</b> <i>elliptica</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>macrantha latifolia</i> . . . . .	3 à 10 "
— <i>saligna</i> . . . . .	2 à 10 "
— <i>stricta</i> . . . . .	3 à 10 "
Fleurs assez grandes, très-jolies, dans les tons roses.	
<b>Cuphea</b> <i>platycentra</i> . . . . .	" 50
Petit sous-arbrisseau du Mexique, très-florifère, se garnissant de jolies petites fleurs rouges, excellent pour la pleine terre.	
3620. <b>Cyclamen</b> <i>coum</i> (FL., XXII, 169) n 75	
3621. — <i>vernium</i> . . . . .	1 "
3623. — <i>europæum</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	
3625. — <i>græcum</i> . . . . .	5 "
3629. — <i>hederæfolium album</i> . . . . .	2 50
3630. — <i>rubrum</i> . . . . .	" 50
3633. — <i>hybr. Atkinsii (ibericum album)</i> (FLORE, XXIII, 153) . . . . .	" 50
3634. — <i>carneum</i> . . . . .	1 "
3636. — <i>ibericum roseum</i> . . . . .	" 50
3640. — <i>macrophyllum (africanum)</i> (FLORE, VII, 249) . . . . .	2 "
3642. — <i>nobile</i> . . . . .	1 50
3644. — <i>persicum album</i> (FLORE, XXII, 169) . . . . .	" 75
3645. — <i>candidissimum (aleppicum)</i> (FLORE, XXII, 169) . . . . .	1 50
3647. — <i>giganteum album</i> . . . . .	3 "
3654. — <i>candidissimum</i> . . . . .	4 "
3648. — <i>maculatum</i> . . . . .	3 "
3649. — <i>amarantinum</i> . . . . .	4 "
3652. — <i>roseum</i> . . . . .	2 50
3653. — <i>rubrum</i> . . . . .	4 "
3646. — <i>roseum</i> (FLORE, XXII, 169) . . . . .	1 "
3650. — <i>repandum (ficariaefolium)</i> . . . . .	1 "
3651. — <i>album</i> . . . . .	1 50
Les <i>Cyclamen</i> sont de magnifiques Primulacées qui seront toujours recherchées pour leurs délicieuses fleurs blanches, roses, rouges, lilacées, violacées, parfois odorantes.	
<b>Cytisus</b> <i>Atleeanus</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>Everestianus</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>racemosus</i> . . . . .	2 à 40 "
— <i>elegans</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>superbus</i> . . . . .	2 à 30 "
Les <i>Cytisus racemosus</i> sont de jolis arbrisseaux à léger feuillage trifolié et à épis de fleurs jaunes, suavement odorantes.	
L'Établissement en possède de forts exemplaires sur tiges, dans les différentes sortes; pièce : 23 à 75 francs.	
<b>Dammara</b> <i>obtusa</i> (FLORE, VII, 274), fort. . . . .	50 "
Les <i>Dammara</i> sont des Conifères à grandes feuilles très-larges, d'un aspect tout particulier.	
<b>Daphne</b> <i>intus rubra</i> . . . . .	3 "
— <i>japonica</i> . . . . .	25 "
Qui ne connaît les <i>Daphne</i> , ces arbustes semi-rustiques, à feuilles persistantes, dont les fleurs blanches, roses, lilas, pourprées, etc., sont si délicieusement odorantes?	



	Fr. C.
<i>Dasyliion glaucophyllum</i> . . . . .	3 "
— <i>juncifolium</i> , très-fort. . . . .	75 "
— <i>longifolium</i> . . . . .	2 à 5 "

Les *Dasyliion* sont des plantes à tige globuleuse ou très-courte, d'où rayonnent en tous sens des feuilles minces, longues et serrées, d'un aspect très-élegant et très-ornemental.

**Desfontainia Hookeri (FLORE, IX,**

207) . . . . . 2 à 50 "

Joli arbuste à feuilles persistantes, épineuses à la manière des houx, à brillantes fleurs d'un rouge cocciné sur leur tube allongé et jaune d'or à l'intérieur.

<i>Dianella intermedia</i> . . . . .	3 "
— <i>latifolia</i> . . . . .	1 "

Les *Dianella* sont des plantes molles, caulescentes, à feuilles ensiformes au sommet des tiges; panicules terminales de jolies fleurs dans les tons bleus.

<i>Dietes bicolor (Morea) (FLORE, VII, 273)</i>	4 "
---	-----

<i>Dillwynia splendens</i> . . . . .	3 "
--------------------------------------	-----

<i>Diosma ambigua</i> . . . . .	2 "
---------------------------------	-----

— <i>ciliata</i> . . . . .	2 "
----------------------------	-----

— <i>Eckloniana</i> . . . . .	3 "
-------------------------------	-----

— <i>fragans</i> . . . . .	2 à 10 "
----------------------------	----------

— <i>purpurea</i> . . . . .	2 à 15 "
-----------------------------	----------

Les *Diosma* sont des arbustes touffus, gracieux, à mignon feuillage aromatique, d'un charmant effet.

6. <i>Dracæna congesta</i> . . . . .	1 "
--------------------------------------	-----

14. — <i>indivisa</i> . . . . .	1 à 5 "
---------------------------------	---------

15. — — <i>lineata</i> . . . . .	2 à 5 "
----------------------------------	---------

124. — — <i>Veitchii</i> . . . . .	1 à 5 "
------------------------------------	---------

26. — <i>rubra</i> . . . . .	2 "
------------------------------	-----

Les *Dracæna* sont de nobles plantes qu'on peut ranger parmi les plus beaux végétaux de serre froide, et même de pleine terre pendant l'été; les feuilles linéaires, étroites ou ensiformes, sont très-ornementales.

<i>Drimys Winteri</i> . . . . .	2 à 5 "
---------------------------------	---------

Arbrisseau à écorce ferrugineuse, à fleurs blanches en faisceau terminal.

<i>Dyckia remotiflora</i> . . . . .	3 "
-------------------------------------	-----

Petite plante charnue à tige globuleuse, garnie de feuilles linéaires, épaisses, épineuses; longue hampe terminée par des fleurs oranges.

2. <i>Echeveria agavoides</i> . . . . .	3 à 5 "
---	---------

19. — <i>californica</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

20. — — <i>viridis</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

40. — <i>De Smetiana</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

17. — <i>fatiosa</i> . . . . .	1 à 2 "
--------------------------------	---------

56. — <i>ferrea</i> . . . . .	1 "
-------------------------------	-----

4. — <i>glauca</i> . . . . .	50 "
------------------------------	------

Cette espèce est très-convenable et très-recherchée pour former de jolies bordures en pleine terre, l'été.

14. — <i>globosa (rosacea)</i> . . . . .	50 c. à 1 "
--	-------------

les douze. . . . . 5 "

58. — <i>grandisepala</i> . . . . .	2 "
-------------------------------------	-----

24. — <i>hybrida Leopoldi</i> . . . . .	2 "
---	-----

55. — <i>imbricatissima</i> . . . . .	1 "
---------------------------------------	-----

6. — <i>metallica</i> . . . . .	1 "
---------------------------------	-----

7. — <i>glauca</i> . . . . .	50 "
------------------------------	------

26. — <i>peruviana</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

3. — <i>pulverulenta (FLORE, XIX, 15)</i>	à 10 "
---	--------

Magnifique espèce s'étalant en une élégante rosette d'une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement couverte d'une pulvérisation blanche comme la neige; fleurs d'un rose clair. On doit la priver de tout arrosage en hiver.

72. — <i>rubescens</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

11. — <i>scapiphylla</i> . . . . .	3 à 5 "
------------------------------------	---------

61. — <i>Scheideckerii</i> . . . . .	50 "
--------------------------------------	------

29. <i>Echeveria secunda</i> . . . . .	50 "
36. — — <i>glauca</i> . . . . .	50 "

les douze . . . . . 4 "

18. — <i>Van Celsii</i> . . . . .	10 "
-----------------------------------	------

**Echeveria: 12 belles variétés distinctes. I "**

Les *Echeveria* sont de belles plantes grasses, à tiges courtes ou nulles, à feuilles en rosette; du centre surgit un épi de jolies fleurs ordinairement jaunes ou rouges. On en fait des corbeilles et des bordures en plein air, pendant l'été.

<i>Elæagnus macrophylla</i> . . . . .	2 "
---------------------------------------	-----

Châlef duré du Japon presque rustique, dont les grandes feuilles persistantes ont le revers d'un blanc argenté.

<i>Embothrium lævigatum</i> . . . . .	2 "
---------------------------------------	-----

<i>Epacris variés</i> . . . . .	pièce. 2 "
---------------------------------	------------

— 12 belles variétés en bonnes plantes. 20 "

Charmantes plantes de l'Australie dans le genre des *Erica* du Cap de Bonne-Espérance, possédant les mêmes qualités de grâce et de diversité dans les coloris.

<i>Erica du Cap</i> . . . . .	pièce. 3 50 "
-------------------------------	---------------

— 12 belles variétés en bonnes plantes. 36 "

Tout le monde connaît les *Bruyères* du Cap de Bonne-Espérance, ces délicieuses plantes qui devraient embellir toutes les serres froides, et dont les fleurs mignonnes brillent par leurs charmans coloris, depuis le blanc pur jusqu'au cramoisi vif.

<i>Eriobothria japonica</i> . . . . .	5 "
---------------------------------------	-----

<i>Eriostemon densiflorum</i> . . . . .	4 à 10 "
---	----------

— <i>floribundum</i> . . . . .	4 à 100 "
--------------------------------	-----------

— <i>linifolium</i> . . . . .	4 "
-------------------------------	-----

— <i>myoporoides</i> . . . . .	4 "
--------------------------------	-----

— <i>ovatum</i> . . . . .	4 "
---------------------------	-----

— <i>pulcheillum</i> . . . . .	5 à 40 "
--------------------------------	----------

— <i>scabrum</i> . . . . .	4 à 10 "
----------------------------	----------

Les *Eriostemon* sont de charmantes plantes, peu élevées, d'un bon port, à petit feuillage et à gracieuses fleurs blanches ou roses.

<i>Erythrina crista galli</i> . . . . .	1 à 3 "
---	---------

<i>Escallonia caracasana</i> . . . . .	2 "
--	-----

— <i>macrantha</i> . . . . .	2 "
------------------------------	-----

Les *Escallonia* sont de jolis arbrisseaux qui méritent une place dans les collections d'amateurs.

<i>Eucalyptus alpina</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

— <i>globulus</i> . . . . .	1 à 10 "
-----------------------------	----------

<i>Eugenia apiculata</i> . . . . .	2 à 5 "
------------------------------------	---------

— <i>Ugni (FLORE, VII, 215)</i> . . . . .	2 "
---	-----

Arbuste produisant des fleurs en grappes, d'un blanc rosé, auxquelles succèdent de petites groseilles comestibles, d'un rouge corail, d'un parfum délicieux.

— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	4 "
--	-----

458. <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i>	
---	--

(FLORE, XXI, 109) . . . . . 1 "

Charmante plante très-ornementale, à longues feuilles étroites, élégamment rubanées de blanc longitudinalement.

459. — — <i>zebrina</i> . . . . .	2 "
-----------------------------------	-----

Graminée introduite récemment du Japon, formant de fortes touffes de longues feuilles étroites, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert quand on la cultive en plein air, mais ne gardant pas sa panachure en serre. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté est excessivement recommandable; outre qu'elle est un ornement pour la serre froide, elle apporte, pendant l'été, son contingent d'ornementation aux parterres en plein air.

<i>Eupatorium odoratissimum</i> . . . . .	2 "
---	-----

— <i>reticulatum</i> . . . . .	2 "
--------------------------------	-----

Pendant les mois de décembre et de janvier, cette variété se couvre de fleurs en grandes panicules corymbiformes du blanc le plus pur, excellentes pour bouquets.

<i>Eurya angustifolia foliis variegatis</i>	6 à 15 "
---	----------

— <i>latifolia foliis aureo-marginatis</i>	2 à 10 "
--	----------

	Fr. C.
<i>Eurybia alpina</i> . . . . .	2 à 10 "
<i>Eutaxia myrtifolia</i> . . . . .	2 "
Papilionacée à fleurs oranges, maculées de mordoré.	
<i>Fagelia bituminosa</i> . . . . .	2 "
Papilionacée grimpante à fleurs jaunes, pendantes.	
<i>Ficus minima</i> . . . . .	2 "
<i>Fitz-Roya patagonica</i> (FLORE, VII, 129)	2 "
<i>Garrya Mac Fadyeni</i> . . . . .	2 "
<i>Gasteria variegata</i> . . . . .	50 "
— <i>verrucosa</i> . . . . .	50 "
Feuilles distiques, régulièrement superposées, très-épaisses, d'un vert noirâtre, couvertes de nombreuses papilles blanches, rugueuses.	
<i>Gelsemium sempervirens</i> . . . . .	2 "
Arbrisseau grimpant à feuilles garnies de petits points transparents, à fleurs jaunes, odorantes.	
<i>Genetylis fuchsoides</i> . . . . .	6 "
— <i>tulipifera</i> . . . . .	5 à 10 "
Plantes de la famille des Myrtacées dont les fleurs sont entourées d'un involucre de grandes bractées rouge carmin chez la première, blanches à taches d'un pourpre vif chez la seconde.	
<i>Gnaphalium eximium</i> . . . . .	3 "
— <i>lanatum</i> . . . . .	50 "
— <i>foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .	50 "
— <i>microphyllum</i> . . . . .	50 "
Les <i>Gnaphalium</i> sont des plantes à feuillage recouvert d'un duvet blanchâtre; on s'en sert comme bordure et pour obtenir un effet de contraste, avec des plantes à feuillage autrement coloré.	
<i>Grevillea alpestris</i> (FLORE, XIV, 149)	2 à 5 "
— <i>Drummondii</i> . . . . .	2 "
— <i>flexuosa</i> . . . . .	4 "
— <i>Hillii</i> . . . . .	2 à 10 "
— <i>Manglesii</i> . . . . .	2 "
— <i>Preissii</i> . . . . .	2 à 4 "
— <i>robusta</i> . . . . .	1 à 3 "
Les <i>Grevillea</i> ont des fleurs originales, gracieuses, dans les tons blanc, rose, rouge, jaune, etc., parfois en longues grappes brillantes.	
<i>Greya Sutherlandii</i> (FL., XVII, 45)	3 "
Magnifique arbuste à beau feuillage, se couvrant de racemes de fleurs très-serrés, d'un rouge éblouissant.	
<i>Hakea cristata</i> . . . . .	3 "
— <i>pectinata</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>repanda</i> . . . . .	5 "
<i>Hardenbergia macrophylla</i> . . . . .	2 "
— <i>monophylla foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
— <i>ovata</i> . . . . .	2 "
— <i>alba</i> . . . . .	2 "
— <i>lilacina</i> . . . . .	2 "
Les <i>Hardenbergia</i> sont des Papilionacées sarmenteuses, grimpantes, à très-jolies fleurs blanches, roses ou bleues.	
<i>Haworthia attenuata</i> . . . . .	1 "
Petites plantes grasses, acalées, à feuilles lisses ou garnies de papilles ou de cils non épineux; fleurs blanches, bilobées ou à divisions peu régulières.	
<i>Helichrysum argenteum</i> . . . . .	2 à 6 "
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	2 à 25 "
— <i>humile</i> . . . . .	2 à 10 "
— <i>purpureum</i> . . . . .	2 à 25 "
— <i>roseum</i> . . . . .	2 à 50 "
— <i>speciosissimum</i> . . . . .	2 à 30 "
— <i>spectabile</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>splendens</i> . . . . .	2 à 10 "
Les <i>Helichrysum</i> sont de brillantes Immortelles donnant de nombreuses fleurs de très-longue durée.	

	Fr. C.
<i>Hibbertia volubilis foliis purpureis</i> . . . . .	2 "
Plante volubile à grande fleur jaune, à feuillage pourpre.	
<i>Hymenocallis adnata princeps</i> (FLORE, XXII, 15)	5 "
Amaryllidée à très-grandes fleurs blanches, d'une grande élégance de forme, à odeur suave.	
— <i>mexicana</i> . . . . .	2 "
<i>Illicium anisatum</i> . . . . .	2 à 5 "
— <i>floridanum</i> . . . . .	2 à 6 "
— <i>religiosum</i> . . . . .	5 "
<i>Ischrochroma coccineum</i> (FLORE, XII, 151)	2 "
— <i>purpureum</i> . . . . .	2 "
— <i>Tonellianum</i> . . . . .	2 "
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.	
— <i>tubulosum</i> . . . . .	2 "
— <i>Warscewiczii</i> . . . . .	2 "
<i>Jasminum grandiflorum</i> . . . . .	1 "
Jasmin à fleurs blanches, très-odorantes.	
— <i>flore pleno</i> . . . . .	2 "
— <i>odoratissimum</i> . . . . .	1 "
Jasmin à fleurs jaunes, très-odorantes.	
— <i>Poiteau</i> . . . . .	2 "
— <i>Reevesi</i> . . . . .	50 "
Fleurit tout l'hiver.	
38. <i>Jovellana punctata</i> ( <i>Calceolaria violacea</i> ) (FLORE, VIII, 85), <i>fortis</i>	2 à 4 "
Calcaolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleurs d'un bleu violacé maculé de jaune d'or et aspergé de gouttelettes brunes.	
730. <i>Juncus zebrinus</i> . . . . .	2 "
Jonc magnifiquement zébré. On ne peut mieux comparer ses feuilles qu'aux piquants d'un porc épic.	
<i>Kadsura japonica</i> . . . . .	2 "
— <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
Arbrisseau sarmenteux du Japon, à fleurs brunes, solitaires, axillaires, portées sur des pédoncules pendants.	
<i>Kennedya bimaculata</i> . . . . .	2 "
— <i>coccinea</i> . . . . .	2 "
— <i>longiracemosa</i> . . . . .	3 "
— <i>nigricans</i> . . . . .	4 "
— <i>ovata</i> . . . . .	2 "
— <i>alba</i> . . . . .	2 "
— <i>lilacina</i> . . . . .	2 "
— <i>rubicunda major</i> . . . . .	3 "
Les <i>Kennedya</i> sont de petits arbustes grêles, sarmenteux, à feuilles trifoliolées, à très-jolies fleurs blanches, roses, rouges, violettes, etc.	
<i>Kleinia cana</i> . . . . .	1 "
— <i>ficoides</i> . . . . .	50 "
— <i>repens</i> . . . . .	50 "
— <i>spiculosa</i> . . . . .	50 "
Les <i>Kleinia</i> sont des plantes charnues, à fleurs blanches en corymbe.	
3860. <i>Lachenalia fragans</i> . . . . .	1 50 "
3864. — <i>pendulatricolor</i> (FL., XVII, 161)	1 "
3868. — <i>tigrina</i> . . . . .	2 "
3869. — <i>tricolor</i> . . . . .	1 50 "
3872. — <i>versicolor</i> . . . . .	1 50 "
Les <i>Lachenalia</i> sont de petites plantes bulbeuses à jolies fleurs tubuleuses, pendantes, variées de rouge, de jaune et de vert.	
<i>Lapageria alba</i> (FL., XX, 39), <i>fort</i>	15 à 150 "
Charmante espèce encore rare, à fleurs blanches.	



Fr. C.

Fr. C.

**Lapageria rosea** (FL., V, 49 et XX, 29) . . . 5 "

Ce noble arbuste grimpant à beau feuillage persistant, à nombreuses et grandes fleurs en clochettes, d'un cramoisi vif moucheté de blanchâtre, passe parfaitement l'été à l'ombre en plein air et orne luxueusement les serres froides.

— — *superba* . . . . . 5 "

**Laurus Camphora**, *fort* . . . . . 5 à 10 "

Le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre de hauteur, garnies d'un magnifique feuillage.

— *nobilis* . . . . . 1 à 100 "

**Lauriers en pyramide ou à tige avec couronne, de toutes dimensions et accouplés. Prix et force par correspondance.**

**Lavatera arborea foliis variegatis** . . . 2 "

**Leptospermum bullatum** . . . . . 2 à 10 "

**Libertia Schlachterii** . . . . . 3 "

Les *Libertia* ont des feuilles radicales gladiées, distiques, et d'agréables fleurs blanches.

**Libonia floribunda** . . . . . 1 "

— *penrhosiensis* . . . . . 1 "

— — *foliis variegatis* . . . . . 1 "

— *rutilans* . . . . . 1 "

Les *Libonia* sont de jolis arbustes fleurissant abondamment; des fleurs tubuleuses, rouges à extrémités jaunes, en clochettes, les garnissent de haut en bas.

**751. Ligularia Kämpferi foliis albo var.** . . 2 "

*les douze* . . . . . 20 "

Plante vivace du Japon, à grand feuillage panaché de blanc, de toute beauté.

**Ligustrum japonicum foliis aureo-varieg** . . 1 "

— *lucidum foliis argenteo-marginatis* . . 1 "

— — — *aureo-variegatis* . . . . . 1 "

Ces trois *Tréènes* ont un mignon feuillage, diversement panaché dans chaque variété.

**Lithospermum fruticosum** . . . . . 1 à 5 "

Cette espèce, cultivée en petite tête bien taillée, est un vrai bijou qui se couvre de fleurs du plus beau bleu.

**Lobelia erinoides Crystal palace** . . . . . 50 "

Grande fleur d'un bleu foncé à oeil blanc pur; excellente pour bordures.

**Lomatia elegantissima** . . . . . 6 à 20 "

— *heterophylla* . . . . . 4 à 10 "

— *longifolia* . . . . . 5 "

Les *Lomatia* sont de magnifiques arbustes de l'Australie, à nombreux feuillages très-variés.

**Lophospermum coccineum** . . . . . 1 "

— *grandiflorum* . . . . . 1 50 "

— *scandens* . . . . . 1 50 "

Les *Lophospermum* sont des plantes herbacées grimpantes, à grandes fleurs roses, rouges, etc.

**Macadamia ternifolia** . . . . . 3 à 10 "

Arbre fruitier du Queensland, en Australie.

**Magnolia fuscata** . . . . . 2 à 4 "

Espèce de Chine à fleurs roussâtres, très-aromatiques.

— *grandiflora* . . . . . 1 "

Cette espèce requiert la serre froide dans nos contrées. Beau feuillage très-décoratif, à revers brun ferrugineux.

— *Exmontanii* . . . . . 3 "

**Mahonia japonica** . . . . . 1 50 "

Les *Mahonia* sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-ample dans quelques espèces, les rend propres pour la formation de beaux massifs toujours verts.

**Mandevilla suaveolens** (FL., XI, 139) . . 2 "

Le *Jasmin du Chili*, arbrisseau grimpant à grandes fleurs en grappes, d'un blanc pur, d'un arôme doux et pénétrant.

**Marica cærulea** . . . . . 4 "

Iridée à majestueuses fleurs bleues.

**48. Mesembryanthemum albicaule** . . . 50 "

**49. — aureum** . . . . . 50 "

**52. — candens** . . . . . 50 "

**6. — cordifolium** . . . . . 50 "

**7. — variegatum** . . . . . 50 "

**8. — crassifolium** . . . . . 1 "

**11. — echinatum** . . . . . 50 "

**12. — Eckloni** . . . . . 50 "

**13. — edule** . . . . . 1 "

**15. — falcatum** . . . . . 50 "

**57. — falciforme** . . . . . 50 "

**63. — intonsum** . . . . . 50 "

**22. — Lehmanni** . . . . . 50 "

**65. — lepidum** . . . . . 50 "

**27. — muricatum** . . . . . 50 "

**34. — spectabile** . . . . . 50 "

**77. — subincanum** . . . . . 50 "

**80. — umbellatum** . . . . . 50 "

**36. — uncinellum** . . . . . 50 "

**86. — virgatum hamatum** . . . . . 50 "

**12 espèces de Mesembryanth. à notre choix** 5 "

Les *Mesembryanthemum* ou *Ficoïdes*, sont des plantes grasses, petites, affectant les formes les plus bizarres, les plus disparates qui se puissent voir; leurs fleurs radiées sont abondantes et de coloris très-variés, blanc, rouge, jaune, etc.

**Metrosideros angustifolia flore albo** . . 4 "

— *florida foliis variegatis* . . . . . 2 à 5 "

— *robusta* . . . . . 3 à 6 "

— *rubrifolia* . . . . . 2 à 10 "

— *semperflorens* . . . . . 1 à 25 "

— *superba* . . . . . 2 à 25 "

Les *Metrosideros* sont des arbrisseaux de l'Australie, à feuilles coriaces, à fleurs terminales composées de longs filaments staminaux, ordinairement d'un rouge vif et très-distinguées.

**Mitraria coccinea** (FLORE, IV, 385) . . . 2 à 10 "

Arbuste rameux, à nombreuses fleurs en clochettes très-allongées pendantes, d'un écarlate vif.

**Monnina obtusifolia** . . . . . 2 "

Arbuste très-recommandable, à fleurs spiciformes terminales et dressées, d'une couleur bleu relevée par un point d'or, auxquelles succède une grappe de jolis fruits rouges.

**Monochætum sericeum multiflorum** . . 2 "

Les *Monochætum* constituent un bel ornement de serre froide et sont des arbustes à joli petit feuillage, à grandes belles fleurs pourpres dont les anthères sont jaunes.

**Moræa bicolor** (*Diets*) (FLORE, VII, 273) . 4 "

Iridée à feuilles ensiformes, très-longues, à fleurs d'un beau jaune, maculées, à la base de chaque sépale, d'une tache brun noirâtre, auréolée de jaune orangé.

— *viridifolia* . . . . . 1 "

**Myoporum crystallinum** . . . . . 2 "

**Myrtus bullata** . . . . . 2 "

*Myrte* à feuilles d'un vert brunâtre entièrement bulleées.

— *communis, tige avec tête* . . . . . 5 à 10 "

— — *flore pleno, tige avec tête* . . . . . 3 "

— *Franklini* . . . . . 2 "

Les *Myrt*s sont des plantes d'orangerie par excellence, à jolies fleurs blanches, simples ou doubles, à joli feuillage dont on retire par la distillation une huile volatile. On les associe avantageusement dans les avenues, sur les terrasses et les perrons, aux Orangers et aux Grenadiers.

**Nandina domestica purpurea** . . . . . 2 à 5 "

Grande panicle de petites fleurs blanchâtres, auxquelles succèdent des fruits rouges.

**31. Nerium album plenum** . . . . . 3 "

1. — *maximum* . . . . . 2 "

Grande fleur simple blanc pur.

	Fr. C.
6. <i>Nerium atropurpureum</i> flore pleno. . . . .	2 "
Fleur bien double carmin pourpré.	
16. — — duplex . . . . .	2 "
Fleur bien double d'un rose pourpré.	
2. — — carneum. . . . .	2 "
Fleur semi-double carmin clair.	
17. — — semi-duplex . . . . .	2 "
8. — — columbianum album-plenum . . . . .	2 "
19. — — Fons columbianum . . . . .	2 "
9. — — luteum novum . . . . .	2 "
Fleur simple, jaune pâle, centre jaune d'or.	
12. — — plenum . . . . .	2 "
Fleur double, jaune pâle, centre jaune d'or.	
30. — — <i>Mad. Charles Cavalier</i> . . . . .	3 "
27. — — <i>Mad. Lesieur</i> . . . . .	2 "
13. — — <i>Madoni grandiflorum</i> . . . . .	2 "
Fleur blanche semi-double.	
28. — — <i>Paul Sahut</i> . . . . .	3 "
24. — — <i>pictum argenteum</i> . . . . .	3 "
Feuillage panaché de jaune clair.	
14. — — <i>purpureum duplex</i> . . . . .	2 "
Fleurs doubles roses avec flammes pourpres sur les pétales.	
18. — — — — <i>superbum</i> . . . . .	2 "
10. — — — — <i>simplex</i> . . . . .	2 "
Fleur simple rouge vif brillant.	
35. — — <i>striatum duplex</i> . . . . .	5 "
Fleur bien double, carmin pourpré ligné de blanc pur.	
Variété nouvelle ressemblant à un œillet.	
4. — — <i>roseum ardens</i> . . . . .	3 "
Fleur semi-double rose vif.	
3. — — — — <i>duplex</i> . . . . .	2 "
Fleur double, rose.	
26. — — — — <i>grandiflorum plenum</i> . . . . .	2 "
32. — — <i>rubrum plenum</i> . . . . .	3 "
29. — — <i>Souvenir de Claude Sahut</i> . . . . .	3 "
34. — — — — <i>de Felix Duval</i> . . . . .	3 "
11. — — <i>splendens foliis aureo variegatis</i> . . . . .	2 "
Feuillage marginé de jaune clair.	
12. <i>Nerium</i> en 12 variétés . . . . .	18 "
Les <i>Nerium</i> , vulgairement nommés <i>Lauriers roses</i> ou <i>Oleandres</i> , sont des plantes excessivement populaires; leurs fleurs sont simples ou doubles, grandes, belles, abondantes et dans les coloris variant du blanc au rose, au pourpre foncé et au jaune; leurs feuilles sont longues, lancéolées, vénéneuses ainsi que leur écorce.	
<i>Nertera depressa</i> (FLORE, XXI, 39) . . . . .	1 "
Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à menu feuillage d'un beau vert, se couvrant de nombreux petits fruits oranges, très-propre pour garnir les rocailles.	
<i>Nierembergia rivularis</i> . . . . .	50 "
<i>Ochna multiflora</i> . . . . .	5 "
<i>Oleobachia macrophylla</i> . . . . .	2 à 5 "
— <i>palustris</i> . . . . .	2 "
853. <i>Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	2 "
Charmante plante de Chine très-estimée pour son feuillage panaché de jaune d'or; semi-rustique.	
<i>Oreopanax dactylifolium</i> . . . . .	6 à 10 "
<i>Oxalis arborea lutea</i> . . . . .	75 "
— <i>Ortgiesii</i> . . . . .	1 "
Très-belle espèce à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.	
<i>Pachyphytum Hookeri</i> . . . . .	1 "
Plantes grasses à physiologie des plus bizarres.	
71. <i>Passiflora cœrulea</i> . . . . .	2 "
83. — — <i>Constance Elliott</i> . . . . .	2 "

	Fr. C.
78. <i>Passiflora filamentosa</i> . . . . .	2 "
39. — — <i>Neumanii</i> . . . . .	2 "
81. — — <i>racemosa</i> . . . . .	2 "
Les <i>Passiflores</i> sont des plantes grimpantes à fleurs charmantes, du plus gracieux effet, et pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, colonnettes, treillis, etc.	
<i>Philesia buxifolia</i> (FLORE, IX, 41) . . . . .	4 "
Charmantes fleurs pendantes, d'un carmin très-vif.	
<i>Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	2 à 25 "
— <i>Cookianum foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	3 à 25 "
— <i>tenax</i> . . . . .	1 "
le cent . . . . .	50 "
— — <i>atropurpureum</i> . . . . .	5 à 10 "
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	20 à 100 "
— <i>Veitchii</i> . . . . .	2 à 25 "
Les <i>Phormium</i> , ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à longues feuilles engainantes gladiiformes constituent le plus luxueux ornement dont on puisse décorer les pelouses en plein air.	
4014. <i>Phycella corusca</i> (FL., IV, 419) . . . . .	5 "
Amaryllidée mignonne, à fleurs d'un rouge étincelant.	
<i>Phygelius capensis</i> (FLORE, XI, 73) . . . . .	1 "
Longues fleurs pendantes, d'un rouge vif, à gorge jaune.	
<i>Phylica capensis</i> . . . . .	2 "
<i>Physianthus albens</i> . . . . .	2 "
Arbrisseau grimpant du Brésil à fleurs blanches, qui retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Cet arbuste passe l'été en plein air.	
<i>Pimblea decussata</i> . . . . .	2 "
— <i>ligustrina</i> . . . . .	2 à 10 "
Les <i>Pimblea</i> sont des arbrisseaux élégants à feuillage mignon à très-jolies fleurs blanches ou rosées, en têtes terminales.	
<i>Pittosporum crassifolium</i> (FLORE, XXI, 13) . . . . .	3 à 10 "
Espèce à fleurs pourpres, à feuilles tomenteuses, jaunâtres en dessous.	
— <i>floribundum</i> . . . . .	2 "
— <i>macrophyllum Tobira</i> . . . . .	2 à 5 "
— <i>Mayi</i> . . . . .	2 à 6 "
— <i>sinense foliis variegatis</i> . . . . .	2 à 15 "
Les <i>Pittosporum</i> sont de charmants arbrisseaux à feuilles coriaces, la plupart à fleurs blanches ou jaunâtres, odorantes.	
<i>Pleroma elegans</i> ( <i>Lasiandra</i> ) (FLORE, XII, 61) . . . . .	3 à 10 "
Très-belle plante extrêmement florifère, à joli feuillage et à grandes fleurs d'un pourpre violacé.	
— <i>macranthum</i> ( " ) (FLORE, XXIII, 169) . . . . .	2 à 10 "
Énormes fleurs d'un bleu violacé, à reflets chatoyants et métalliques, rehaussé par le noir violet des anthères, les tubercules jaunes des connectifs et le pourpre des filets staminaux.	
— <i>floribundum</i> ( " ) . . . . .	4 "
<i>Podocarpus purdianus</i> . . . . .	2 à 4 "
Arbre de Java à fruits globuleux drupacés.	
4019. <i>Polianthes tuberosa foliis varieg.</i> . . . .	2 "
La Tubéreuse à feuillage panaché, à fleurs blanches d'une odeur si exquise.	
<i>Polygala Dalmaisiana</i> . . . . .	1 à 100 "
Très-grandes fleurs d'un violet vif, en grappes terminales.	
— <i>acuminata</i> . . . . .	2 "
<i>Primula sinensis fimbriata alba plena</i> . . . . .	2 "
<i>Prostanthera Lasianthus</i> . . . . .	2 "
— <i>nivea</i> . . . . .	2 "
Arbrisseau aromatique à petites feuilles et à grandes et belles fleurs blanches, mouchetées de lilas chez le <i>Lasianthus</i> , blanc pur chez le <i>nivea</i> .	



Fr. C.

Fr. C.

- Pultenaea flava** . . . . . 2 à 10 "  
 — **stricta** . . . . . 2 à 5 "  
 Nombreses et jolies fleurs jaunes, striées de rouge.  
**Punica Granatum** . . . . . 50 "  
 — — **flore albo pleno** . . . . . 1 "  
 — — **Legrellei flore pleno (FLORE,**  
**XIII, 175)** . . . . . 1 "

Superbe Grenadier à fleurs très-belles, très-grandes, bien doubles, d'un rouge saumon vil, bordé de blanc crème.

Les Grenadiers sont des arbres d'ornement, très-propres pour avenues, terrasses, perons, etc., où on peut les associer avantageusement avec les Orangers et les Myrtes.

- Pyrethrum hybridum Golden Feather** . . . . . 50 "  
 Variété naine à feuillage jaune, propre pour bordures de corbeilles.  
 — — **laciniatum** . . . . . 50 "

Variété remarquable par ses feuilles gracieusement laciniées, d'un jaune orangé, plus naine et plus élégante pour bordures que la variété précédente.

- Quercus glabra** . . . . . 2 à 5 "  
 Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles; elle est de terre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France, sur le littoral du sud et de l'ouest.

- Quillaia japonica** . . . . . 3 "  
 Arbustes à feuilles persistantes, à fleurs blanches ou roses, en grappes.

- Rhipidodendron distichum majus** . . . . . 5 "  
 Arbres d'une grande rareté.

- Rhynchospermum jasminoides** . . . . . 2 "  
 — — **foliis albo-variegatis** . . . . . 2 "  
 — — **aureo-variegatis** . . . . . 2 "  
 — — **pulchrum** . . . . . 2 "

Les *Rhynchospermum* sont des arbrisseaux sarmenteux à feuilles coriaces, à charmantes petites fleurs blanches, odorantes.

- Richardia africana (Calla aethiopica),**  
**en pots** . . . . . 1 "  
 Feuilles d'un vert brillant; grande et belle spathe d'un blanc pur, odorante.

- **albo maculata ( ) (FLORE, XXI,**  
**165), en pots** . . . . . 1 "  
 Feuilles d'un vert foncé, vernissées, tout couvert de mouchetures blanches; fleurs en cornet, d'un blanc pur, d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison. Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs.

- Rochea falcata** . . . . . 1 "  
 Très-beau corymbe terminal de fleurs écarlates.  
**Roezlia regia** . . . . . 3 "  
**1061. Rhodea crinita** . . . . . 5 "  
**1062. — japonica foliis albo-variegatis** . . . . . 2 "  
**1064. — — macrophylla foliis aureo-**  
**marginatis** . . . . . 5 "

- Rondeletia anomala** . . . . . 2 "  
**Rubus australis** . . . . . 1 "

Très-curieuse espèce à feuilles disectées.  
 — **roseifolius coronarius** . . . . . 1 "  
 Charmante variété à fleur pleine comme une renoncule, fleurissant toujours, même sur de petits exemplaires.

- Saxifraga sarmentosa** . . . . . 50 "  
 — — **tricolor (FLORE, XXI, 125)** . . . . . 1 "

Charmante *Saxifrage* propre pour corbeilles suspendues et rocailles, à feuillage vert foncé maculé de vert pâle, de carmin, de jaune et de blanc, d'un très-gracieux effet. Elle donne de longs filaments, à l'extrémité desquels naissent de jeunes plantes.

- Scutellaria Mociniana** . . . . . 2 "  
 — **pulchella purpurea** . . . . . 2 "

- Sedum carneum foliis variegatis** . . . . . 50 "  
**Sempervivum Bollii** . . . . . 50 "  
 — **velutinum** . . . . . 1 "  
**Senecio macroglossus (FLORE, XXI, 67)** . . . . . 1 "  
*Senecio* grimpant à feuilles de Lierre d'un vert gai, à grandes fleurs d'un jaune clair, propre pour orner les colonnettes, treillis, etc.  
 — **pulcher** . . . . . 1 "

- Skimmia japonica** . . . . . 1 "  
*les deux* . . . . . 10 "

Charmant arbuste à fleurs blanchâtres, odorantes, auxquelles succèdent de belles baies d'un rouge corail, en panicle.

- — **floribus roseis (rubella)** . . . . . 1 "  
 — — **fœmina** . . . . . 1 "  
 — — **mascula** . . . . . 1 "  
 — — **oblata** . . . . . 1 "  
 — — — **foliis variegatis** . . . . . 3 "

- Solanum Capsicastrum fol. var., tête**  
**greffée** . . . . . 1 à 3 "

Très-joli arbuste à feuillage panaché se couvrant de fleurs blanches, auxquelles succèdent de petits fruits du plus bel orange.

- **hybridum macrocarpum** . . . . . 50 "  
 Variété à très-gros fruits.

- — **Weatherhillii foliis variegatis** . . . . . 2 "

- Sollya heterophylla** . . . . . 1 "  
 Arbustes grêles, volubiles, à nombreuses fleurs en clochettes, d'un beau bleu.

- Sparmannia africana** . . . . . 2 à 20 "  
 Arbuste du Cap de Bonne-Espérance, à feuillage cotonneux, à nombreuses fleurs en grappes, très-jolies, blanches à anthères jaunes, se renouvelant constamment.

- — **flore pleno** . . . . . 2 "

- Spiranthes convallarioides** . . . . . 15 "

- Stauntonia hexaphylla** . . . . . 5 à 10 "  
 — **latifolia** . . . . . 5 à 10 "

- Stenocarpus Cunninghamii (Agnostus**  
**sinuatus) (FLORE, III, 189)** . . . . . 4 à 25 "  
 — — **integrifolius** . . . . . 3 à 40 "

Arbrisseaux d'un aspect ornemental, à larges feuilles luisantes, à fleurs en élégantes ombelles axillaires, d'un beau rouge, avec styles jaunes.

- Swainsonia alba** . . . . . 2 "  
 — **Ferrandi atropurpurea** . . . . . 2 "  
 — **Grayi** . . . . . 2 "  
 — **Osbornei** . . . . . 2 "  
 — **Rollisoni** . . . . . 2 "

Les *Swainsonia* sont ligneux et prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs rouges, roses ou blanches.

- 70. Tacsonia exoniensis** . . . . . 2 "  
**26. — fulgens** . . . . . 3 "  
**82. — Jamesonii** . . . . . 3 "

- 56. — mollissima** . . . . . 2 "  
**47. — sanguinea** . . . . . 2 "  
**59. — Van Volkemii** . . . . . 2 "

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment, pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés; on les fait grimper sur les colonnettes, treillis, etc., où elles s'attachent par les vrilles dont elles sont munies. Ce sont des fleurs charmantes et du plus gracieux effet.

- Tecoma capensis** . . . . . 1 "  
 — **jasminoides** . . . . . 1 "  
 — — **alba magna** . . . . . 2 "  
 — — **splendida** . . . . . 2 "

	Fr. C.
<b>Tecoma mirabilis</b> . . . . .	2 "
— <b>rosea</b> . . . . .	2 "
Remarquable plante grimpante portant de longs racèmes de grandes fleurs en forme de trompette, d'un lilas rosé.	
Les <i>Tecoma</i> sont des arbustes à tiges droites, ou grimpants, à feuilles ailées, à fleurs en grappes, assez grandes, fort belles, diversement colorées.	
<b>Testudinaria elephantipes (Tamus)</b> . . . . .	3 "
très-forts troncs . . . . .	10 à 25 "
Plante curieuse et remarquable par sa souche qui ressemble à une carapace de tortue; les tiges annuelles, qui sortent du sommet de cette masse, sont grêles et portent des feuilles cordiformes à nervures réticulées, et des fleurs en grappes axillaires pendantes, ressemblant à des châteaux jaune verdâtre.	
<b>Thea Bohea</b> . . . . .	3 à 6 "
— <b>japonica foliis argenteo-marginalis</b> . . . . .	2 à 4 "
— <b>viridis</b> . . . . .	3 "
Les feuilles des <i>Thea</i> constituent le thé du commerce, dont l'usage est aujourd'hui si universellement répandu.	
<b>Thibaudia acuminata</b> . . . . .	5 "
— <b>macrophylla</b> . . . . .	6 "
— <b>vacciniifolia</b> . . . . .	2 à 5 "
Les <i>Thibaudia</i> sont des arbrisseaux à grand feuillage, à fleurs tubuleuses ou en grelot allongé, très-distinguées.	
<b>Torreya bogotensis</b> . . . . .	5 à 10 "
<b>Tremandra verticillata</b> . . . . .	3 "
<b>Tropæolum flore pleno Frieda Thalacker</b> . . . . .	1 "
Capucine à fleurs doubles rouges.	
— <b>majus plenissimum</b> . . . . .	1 "
Variété à fleurs doubles comme une Renoncule, d'un beau jaune soufre maculé de noirâtre, fleurissant une partie de l'hiver.	
<b>Vaccinium erythrinum (FLORE, XI, 81)</b> . . . . .	5 "
— <b>serpens</b> . . . . .	2 "
Charmanes fleurs rouges, en grelots.	

	Fr. C.
<b>Veronica, L'Éblouissante (Bouch.)</b> . . . . .	1 50
Rouge vif nuancé de capucine; coloris le plus foncé qui ait été obtenu jusqu'à ce jour. Plante d'une floraison précoce et abondante.	
— <b>12 variétés avec noms</b> . . . . .	5 "
Les <i>Veronica</i> sont des plantes sous ligneuses donnant des grappes de fleurs violettes, bleu clair, roses, rouges, blanches, etc.	
<b>Viburnum Tinus (Laurus Tinus)</b> . . . . .	1 à 25 "
— <b>en pyramide, ou à tige surmontée d'une belle couronne. Les dimensions et prix seront donnés par correspondance.</b>	
Le <i>Laurier-Tin</i> est un bel arbrisseau ornemental, donnant de nombreuses ombelles de fleurs blanches.	
<b>Witsenia corymbosa</b> . . . . .	4 à 8 "
Iridée ligneuse à feuillage élégant, en éventail, à petites fleurs d'un bleu vif garnies d'étamines jaunes, formant un charmant corymbe.	
<b>Yucca aloifolia</b> . . . . .	2 à 4 "
— <b>foliis variegatis, forts</b> . . . . .	4 à 10 "
— <b>Desmetiana</b> . . . . .	3 "
— <b>gloriosa medio striata (FLORE, XXIII, 53)</b> . . . . .	50 à 300 "
Variété hors ligne à feuilles raides et dressées, panachées d'un ruban blanchâtre dans leur milieu.	
<b>Yucca quadricolor, forts</b> . . . . .	3 à 20 "
— <b>recurvata</b> . . . . .	1 à 5 "
— <b>stricta (angustifolia)</b> . . . . .	5 à 30 "
— <b>Whipplei</b> . . . . .	5 à 10 "
Les <i>Yucca</i> sont des plantes de beaucoup d'effet, à feuillage lancéolé ou ensiforme, à tige florale formant une jolie pyramide de fleurs pendantes, blanchâtres, de la forme d'une petite Tulipe.	

## SPECIALITÉS DE SERRE FROIDE.

### AZALEA INDICA,

disponibles d'août en mars-avril.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

### CACTÉES.

Les *Cactées* sont des plantes grasses à tiges très-charnues, de formes très-bizarres, très-étranges et très-diverses, ordinairement sans feuilles, à fleurs généralement très-belles, d'une ampleur insolite, de coloris diversifiés, riches et éclatants; le blanc, l'orange, le jaune, le rouge vif, etc., y étalent leurs nombreuses nuances et un grand nombre d'entre elles exhalent de suaves odeurs. Elles sont d'une culture facile, requièrent peu de place et n'exigent que très-peu de soins. Les amateurs qui deviennent de plus en plus nombreux, les collectionnent avec passion.

	Fr. C.		Fr. C.
2. <b>Cereus Bonplandii</b> . . . . .	2 "	10. <b>Cereus Macrogonus</b> . . . . .	5 "
3. — <b>colubrinus</b> . . . . .	2 "	11. — <b>Martianus</b> . . . . .	2 "
4. — <b>Donckelaarii</b> . . . . .	2 "	12. — <b>nycticalus</b> . . . . .	2 "
5. — <b>flagriformis</b> . . . . .	2 "	13. — <b>obtusius</b> . . . . .	2 "
6. — <b>geometrizans</b> . . . . .	3 à 5 "	14. — <b>Ocamponis</b> . . . . .	2 "
7. — <b>grandiflorus</b> . . . . .	2 "	15. — <b>peruvianus monstrosus</b> . . . . .	3 à 5 "
8. — <b>leptophis</b> . . . . .	2 "	18. — <b>Spachianus</b> . . . . .	3 à 8 "
9. — <b>Macdonaldi</b> . . . . .	2 "	19. — <b>speciosissimus</b> . . . . .	2 "



Fr. C.

Fr. C.

45. <i>Echinocactus acutatus bourantii</i> . . . . .	4 "
46. — <i>Cachetianus</i> . . . . .	3 "
26. — <i>concinus</i> . . . . .	4 "
47. — <i>cornigerus</i> . . . . .	3 "
28. — <i>denudatus</i> . . . . .	4 "
48. — <i>gibbosus</i> . . . . .	3 "
49. — <i>leucodictus</i> . . . . .	5 "
151. — <i>heteracanthus</i> . . . . .	4 "
150. — <i>helophorus</i> . . . . .	5 "
152. — <i>Lecontei</i> . . . . .	8 "
44. — <i>leucodictus</i> . . . . .	3 "
30. — <i>mamillosus</i> . . . . .	2 "
31. — <i>rubescens</i> . . . . .	2 "
32. — <i>minax</i> . . . . .	15 "
43. — <i>Monvilli</i> . . . . .	5 à 8 "
42. — <i>Myslei</i> . . . . .	3 "
34. — <i>Ottonis</i> . . . . .	1 à 10 "
153. — <i>tenuispinus</i> . . . . .	3 "
154. — <i>tortuosus</i> . . . . .	4 "
35. — <i>Ourselianus</i> . . . . .	5 "
37. — <i>pumilus</i> . . . . .	3 "
40. — <i>scopa</i> . . . . .	3 "
155. — <i>candida</i> . . . . .	4 "
41. — <i>cristata</i> . . . . .	4 "
157. — <i>stenogonus</i> . . . . .	3 "
155. — <i>submamulosus</i> . . . . .	5 "
39. — <i>tabularis</i> . . . . .	2 "
50. <i>Echinocereus Blankii</i> . . . . .	3 "
51. — <i>candicans</i> . . . . .	3 à 15 "
158. — <i>castaneus</i> . . . . .	2 "
53. — <i>cinerascens</i> . . . . .	2 à 4 "
56. — <i>pentalophus</i> . . . . .	2 "
58. — <i>pleiogonus</i> . . . . .	2 à 3 "
59. — <i>trichacanthus</i> . . . . .	2 à 3 "
60. <i>Echinopsis Eyriesii</i> . . . . .	2 "
61. — <i>Fauveli</i> . . . . .	2 à 15 "
72. — <i>Lagermani</i> . . . . .	2 "
63. — <i>multiplex</i> . . . . .	1 à 10 "
70. — <i>cristata</i> . . . . .	3 5 "
65. — <i>Pentlandii</i> . . . . .	3 à 4 "
66. — <i>Schelhasii</i> . . . . .	3 à 5 "
68. — <i>turbinata</i> . . . . .	3 à 6 "
69. — <i>Zuccariniana cristata</i> . . . . .	3 "
149. <i>Euphorbia meloformis</i> . . . . .	3 "
147. — <i>neriifolia</i> . . . . .	3 "
148. — <i>polygona</i> . . . . .	1 "
80. <i>Malacocarpus corinoides</i> . . . . .	2 à 4 "
159. — <i>tetracanthus</i> . . . . .	3 "
82. <i>Mamillaria angularis</i> . . . . .	2 à 5 "
83. — <i>Bocasana</i> . . . . .	3 à 4 "
122. — <i>Caracassana</i> . . . . .	2 "
123. — <i>Celsiana</i> . . . . .	8 "
110. — <i>centricirrho</i> . . . . .	3 à 8 "
84. — <i>cirrhiifera</i> . . . . .	2 à 6 "
85. — <i>rufispina</i> . . . . .	3 "
86. — <i>varietas</i> . . . . .	2 à 5 "
120. — <i>clava</i> . . . . .	5 "
87. — <i>conopsea</i> . . . . .	4 "

88. <i>Mamillaria crassispina</i> . . . . .	5 à 10 "
90. — <i>decipiens</i> . . . . .	2 à 10 "
91. — <i>densa</i> . . . . .	2 "
161. — <i>rubra</i> . . . . .	5 "
93. — <i>elephantidens</i> . . . . .	3 "
119. — <i>elongata</i> . . . . .	3 "
121. — <i>gigantothela</i> . . . . .	1 à 2 "
94. — <i>Scheidweleriana</i> . . . . .	2 "
95. — <i>gracilis</i> . . . . .	1 à 2 "
162. — <i>Haageana</i> . . . . .	3 "
163. — <i>Hevernicki</i> . . . . .	3 "
117. — <i>impexicoma</i> . . . . .	4 "
164. — <i>Krameri</i> . . . . .	3 "
96. — <i>longimamma</i> . . . . .	4 "
165. — <i>gigantothela</i> . . . . .	4 "
166. — <i>melaleuca</i> . . . . .	5 "
114. — <i>multiceps</i> . . . . .	1 à 3 "
167. — <i>Nuttali caespitosa</i> . . . . .	3 "
98. — <i>pentacantha</i> . . . . .	2 à 10 "
99. — <i>polyedra</i> . . . . .	3 à 5 "
118. — <i>pretiosa rubrispina</i> . . . . .	2 "
169. — <i>procera nigra</i> . . . . .	4 "
168. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	3 "
101. — <i>quadrispina</i> . . . . .	3 à 6 "
111. — <i>rhodanta</i> . . . . .	6 "
170. — <i>sanguinea</i> . . . . .	3 "
172. — <i>Scheideana</i> . . . . .	4 "
104. — <i>sphacelata</i> . . . . .	5 "
173. — <i>spinosissima</i> . . . . .	3 "
105. — <i>stellaris</i> . . . . .	1 "
171. — <i>sulcolonata</i> . . . . .	5 "
106. — <i>uberiformis</i> . . . . .	3 "
174. — <i>valida</i> . . . . .	4 "
175. — <i>viridis cristata</i> . . . . .	4 "
108. — <i>Wildiana</i> . . . . .	2 à 5 "
176. — <i>cristata</i> . . . . .	4 "
131. <i>Opuntia claviroides cristata</i> . . . . .	5 "
130. — <i>cylindrica</i> . . . . .	3 "
128. — <i>cristata</i> . . . . .	5 "
124. — <i>diademata</i> . . . . .	3 "
132. — <i>fulvispina</i> . . . . .	3 "
133. — <i>glaucophylla</i> . . . . .	3 "
177. — <i>maculacantha</i> . . . . .	3 "
129. — <i>microdasys</i> . . . . .	2 à 3 "
178. — <i>monacantha</i> . . . . .	3 "
180. — <i>Schottii</i> . . . . .	3 "
179. — <i>senilis</i> . . . . .	3 "
181. — <i>sulphurea</i> . . . . .	3 "
126. — <i>tunicata</i> . . . . .	2 à 3 "
136. <i>Phyllocactus anguliger</i> . . . . .	2 "
134. — <i>crenatus atrosanguineus</i> . . . . .	2 "
135. — <i>Edwardsii</i> . . . . .	2 "
140. <i>Pilocereus Dautwitzii</i> (FLORE,	
XXI, 33) . . . . .	15 à 40 "
141. — <i>fossulatus</i> . . . . .	10 "
143. — <i>Haworthi</i> . . . . .	5 "
144. — <i>Ruselianus</i> . . . . .	5 "
142. — <i>senilis</i> . . . . .	8 à 25 "

# CAMELLIAS, disponibles d'août en mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

## CANNA (BALISIER D'INDE).

Les *Canna* ou *Balisiers d'Inde* se développent luxueusement en pleine terre et en plein air, pendant l'été, et y étalent leurs amples feuilles diversement colorées, surmontées de superbes épis de fleurs de teintes variées, allant du jaune pâle au jaune foncé, à l'orange, au saumon et aux rouges de divers tons. On les plante quand les gelées ne sont plus à craindre; on les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fosse garnie de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau, le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau dans les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

100 CANNA en plusieurs variétés distinctes, à notre choix : 20 francs.

*Pièce* : 50 centimes. — *Douze variétés* : 5 francs.

Nos		Hauteur.	Nos		Hauteur.
1.	<b>Discolor</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 00	19.	<b>Liseré d'or</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 30
	Feuillage pourpre.			Vert.	
2.	<b>Annei</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 50	20.	<b>Alégatière</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 20
	Vert glauque.			Pourpre noirâtre.	
3.	<b>Caledoniensis</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 20	21.	<b>Original</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 10
	Vert.			Vert.	
4.	<b>Involventifolia</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 50	22.	<b>Souvenir de Barillet-Deschamps</b>	1 <sup>m</sup> 70
	Vert.			Pourpre noirâtre.	
5.	<b>Zebrina nana</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 00	24.	<b>Nigricans</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 00
	Pourpre.			Pourpre noirâtre.	
6.	<b>Peruviana</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 00	25.	<b>Ch. Reboul (Crosy)</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 30
	Vert.			Vert pourpre, épis nombreux, grandes fleurs amarante.	
7.	<b>Louis Gullino</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 00	26.	<b>Emblématique ( n )</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 00
	Vert nervuré de pourpre.			Pourpre foncé métallique, fleurs moyennes, orange.	
8.	<b>Maréchal Vaillant</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 30	27.	<b>Pretiosa ( n )</b> . . . . .	0 <sup>m</sup> 80
	Pourpre.			Vert, épis nombreux, fleurs orange et jaune.	
11.	<b>Daniel Hooibrenk</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 50	29.	<b>Conquête ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 00
	Vert.			Vert, grandes fleurs rouge violacé, très-florifère.	
12.	<b>Prémice de Nice</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 50	30.	<b>Eclat ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 00
	Vert.			Vert, forts épis, grandes fleurs, pourpre cocciné.	
13.	<b>Brenningsii</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 10	31.	<b>Revol-Massot ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 00
	Vert strié de jaune.			Vert, grandes et nombreuses fleurs grenat.	
14.	<b>Admiration</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 00	34.	<b>Safrano ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 20
	Vert nervuré de pourpre.			Vert, grandes et belles fleurs safran pur.	
15.	<b>Coquet</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 40	35.	<b>Eccentric ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 50
	Vert nervuré de pourpre.			Vert, nombreuses fleurs, feu et tigré jaune.	
16.	<b>Surprise</b> . . . . .	2 <sup>m</sup> 00	36.	<b>Tigré ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 20
	Vert.			Vert, fleurs tigrées jaune et orange.	
17.	<b>Président Faivre</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 00	37.	<b>Louis Roempler ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 10
	Pourpre noirâtre.			Vert, fleurs rouge vif.	
			38.	<b>Iridiflora Ehrenbergii ( n )</b> . . . . .	1 <sup>m</sup> 20
				Vert, épis de nombreuses fleurs pendantes, rouge carmin vif.	

## CHRYSANTHÈMES,

à grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre catalogue de plantes vivaces, arbustes, etc.



# CHRYSANTHÈMES D'ÉLITE.

*En jeunes plantes.*

## Variétés à grandes fleurs.

*Pièce : 1 franc. — Les douze : 10 francs.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>1480. <b>Golden Christine.</b><br/>Jaune d'or, revers lilas.</p> <p>1481. <b>Mount Etna.</b><br/>Rouge brun légèrement orange.</p> <p>1482. <b>Bronze Jardin des plantes.</b><br/>Jaune bronzé.</p> <p>1484. <b>Mrs. Cobay.</b><br/>Rouge rubis.</p> <p>1487. <b>Triomphe du Nord.</b><br/>Rouge lie de vin.</p> <p>1488. <b>La Nympe.</b><br/>Rose tendre.</p> <p>1489. <b>Mrs. Forsyth.</b><br/>Blanc pur.</p> <p>1490. <b>Beverley.</b><br/>Blanc de neige.</p> | <p>1491. <b>Emily Dale.</b><br/>Jaune beurre.</p> <p>1492. <b>Hetty Barker.</b><br/>Blanc, extrémité des pétales rose lilacé.</p> <p>1493. <b>Léon Leguay.</b><br/>Carmin lilacé, revers argenté.</p> <p>1494. <b>George Glenney.</b><br/>Blanc crème.</p> <p>1495. <b>Mrs. W. Haliburton.</b><br/>Blanc pur.</p> <p>1496. <b>L'Africaine.</b><br/>Rouge lie de vin et jaune d'or au centre.</p> <p>1497. <b>Cullingfordii.</b><br/>Rouge brun vif, revers violet.</p> |
|---|--|

## Variétés Japonaises.

*Pièce : 1 franc. — Les douze : 10 francs.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>1687. <b>Bond Or.</b><br/>Jaune d'or.</p> <p>1688. <b>Belle Valentinoise.</b><br/>Amarante lie de vin.</p> <p>1689. <b>Garnett.</b><br/>Rouge sang foncé velouté.</p> <p>1690. <b>Meg Merrilies.</b><br/>Blanc jaunâtre.</p> <p>1691. <b>Général de Lartigue.</b><br/>Rouge brun, revers vieil or.</p> <p>1692. <b>Abd-el-Kader.</b><br/>Rouge brun foncé, revers vieil or.</p> <p>1693. <b>M. Lemoine.</b><br/>Rouge brun, revers vieil or.</p> <p>1694. <b>Sourced'or.</b><br/>Jaune orange brillant, nuancé de feu.</p> <p>1695. <b>Tasselled Yellow.</b><br/>Jaune canari.</p> <p>1696. <b>Beaumont.</b><br/>Jaune clair jaspé d'orange foncé.</p> <p>1697. <b>Fulton.</b><br/>Jaune d'or.</p> <p>1699. <b>Riche bouquet.</b><br/>Rose lilacé bordé de blanc, pointé de jaune au centre.</p> <p>1700. <b>Isidore Féral.</b><br/>Rose violacé lavé de blanc et de jaune clair au centre.</p> <p>1702. <b>Gloire rayonnante.</b><br/>Rose lilacé.</p> <p>1704. <b>Day Gahkoi.</b><br/>Rouge brun, revers des pétales vieil or.</p> <p>1705. <b>Mad. John Laing.</b><br/>Rose bordé de blanc, pointé de jaune au centre.</p> <p>1706. <b>Japonais.</b><br/>Jaune orange reflété de brun buffle.</p> <p>1707. <b>Cœur fidèle.</b><br/>Blanc pur.</p> <p>1708. <b>Fée rageuse.</b><br/>Blanc, jaunâtre au centre.</p> <p>1709. <b>M. Freeman.</b><br/>Rose lilacé vif, revers des pétales argenté.</p> <p>1710. <b>Secrétaire général Astré.</b><br/>Blanc lavé de lilas très-pâle, légèrement jaunâtre au centre.</p> | <p>1711. <b>M. Alfred Chantrier.</b><br/>Jaune orange teinté de lie de vin.</p> <p>1712. <b>Mon bijou.</b><br/>Rouge jaunâtre reflété de rouge sang, revers des pétales vieil or.</p> <p>1713. <b>M. Cochet.</b><br/>Blanc légèrement teinté de violet pâle.</p> <p>1714. <b>Blanche neige.</b><br/>Blanc pur.</p> <p>1715. <b>La frisure.</b><br/>Lilas mauve très-pâle.</p> <p>1716. <b>Mess<sup>rs</sup> Paul and Son.</b><br/>Orange foncé strié de brun.</p> <p>1717. <b>Enchanteresse.</b><br/>Rose lilacé tendre.</p> <p>1719. <b>Robert Owen.</b><br/>Jaune vieil or teinté de brun.</p> <p>1720. <b>Rose suprême.</b><br/>Amarante lilacé.</p> <p>1721. <b>Rozain Boucharlat.</b><br/>Aventurine.</p> <p>1722. <b>Rose pointillé.</b><br/>Rose lilacé pointillé de blanc.</p> <p>1723. <b>Hiver fleuri.</b><br/>Jaune clair pourtour lilacé.</p> <p>1724. <b>Amarantina.</b><br/>Rose violacé, revers des pétales blanc.</p> <p>1725. <b>Madem. Juliette Dordan.</b><br/>Blanc légèrement teinté de lilas pâle et de jaune.</p> <p>1726. <b>Fair Maid of Guernsey.</b><br/>Rose lilacé lavé de blanc jaunâtre au centre.</p> <p>1727. <b>La Triomphante.</b><br/>Blanc lavé de lilas très-pâle.</p> <p>1728. <b>Souvenir d'Angèle Amiel.</b><br/>Blanc pur.</p> <p>1729. <b>M. Plancheneau.</b><br/>Lilas très-clair lavé de blanc.</p> <p>1730. <b>Beauté des Jardins.</b><br/>Amarante clair et brillant.</p> <p>1731. <b>M. Frederic Marouch.</b><br/>Jaune citron.</p> <p>1732. <b>Mad. la M<sup>ise</sup> de Mun.</b><br/>Rose lilacé, strié de blanc.</p> |
|--|--|

**1733. Novelty.**

Blanc légèrement lilacé

**1734. D<sup>r</sup> Barrié.**

Jaune d'or teinté de lie de vin.

**1735. M. Déliaux.**

Rouge sang noirâtre.

**1736. La France.**

Magenta clair, revers des pétales argenté.

**1737. Laciniation.**

Blanc légèrement teinté de rose lilacé.

**1738. Diamond.**

Rouge bronze, bouts des pétales jaune d'or.

**1739. William Robinson.**

Jaune d'or et chamois.

**1740. Mad. B. Rendatier.**

Jaune soufre.

**1741. Bouquet fait.**

Rose lilacé éclairé de blanc.

**COLEUS.**

Les **Coleus** sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de superbes corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert pâle jusqu'au noir fais. Ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées, striées, tachetées différemment; elles sont entières, ou déchiquetées, ou laciniées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, ils constituent aussi un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

*Notre collection se compose d'environ 25 sortes, dont on trouvera l'énumération dans nos précédents Catalogues; nous les offrons, avec noms, aux prix suivants :*

*Pièce : 50 centimes. — Les douze : 4 francs. — Les vingt-cinq : 8 francs. — Le cent : 25 francs.*

**DAHLIAS D'ÉLITE.**

Inutile de faire ressortir ici le rôle considérable que les Dahlias jouent dans l'aménagement des jardins, soit en massifs, soit en corbeilles, etc.; les nuances les plus diverses du blanc, du jaune, de l'orangé et du rouge dans tous ses tons, soit pures soit mélangées par teintes fondues, soit enfin entremêlées d'une manière heurtée, y sont brillamment représentées.

**PREMIÈRE SÉRIE.****DAHLIAS A PETITES FLEURS.**

CHARMANTES MINIATURES POUR LA CONFECTION DES BOUQUETS.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

A notre choix : — *Pièce : 60 centimes. — 12 variétés : 6 francs. — 25 variétés : 10 francs.*

Livrables, dès à présent, en bons TUBERCULES.

*Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.*

**11. Julius Hammer (Deegen).**

Jaune d'or pointé d'écarlate cramoisi.

**12. Nicolaus Lenau (Deegen).**

Rose pointé de rose plus foncé.

**13. Deutscher Zinnoberprinz (Deegen).**

Rouge laque.

**14. Prachtröschen (Deegen).**

Cinabre carmin pointé de blanc.

**15. Édouard Möricke (Deegen).**

Jaune d'or pointé d'écarlate, ou saumon clair bordé de jaune d'or et d'écarlate.

**17. Georg Röbel (Deegen).**

Cramoisi foncé.

**18. Citronvogel (Deegen).**

Jaune citron.

**19. Alma Sonntag (Sieckmann).**

Blanc pur.

**20. Kleines Silberöschen (Deegen).**

Lilas argenté, souvent pointé de blanc.

**22. Lilliputprinz (Sieckmann).**

Très-petite fleur d'un rouge grenat foncé.

**24. Linda (Henderson).**

Jaune orangé bordé de capucine rougeâtre.

**26. Scadow (Deegen).**

Très-petite fleur d'un rose foncé.

**27. Hulda (Deegen).**

Rouge cerise pourpré foncé, pointé de rose et de blanc.

**31. Décoration.**

Blanc nuancé et fortement bordé de rose.

**32. Little Arthur.**

Amarante cramoisi.

**33. Panorama.**

Jaune abricoté pointé de carmin.

**35. Unermüdliche (Sieckmann).**

Rose vif pointé de pourpre.

**37. Fairy Prince.**

Jaune isabelle pointé de jaune plus clair.

**38. Hindoo.**

Rouge orangé, centre écarlate.

**40. Vénus.**

Cramoisi nuancé et pointé de pourpre.

**41. Théodore Heymann (Deegen).**

Rouge très-foncé, centre noirâtre.

**44. Prinzessin Liebreiz (Deegen).**

Blanc légèrement rosé, strié de pourpre.

**46. Amalia Härtalt (Deegen).**

Jaune d'or, centre et pointes d'un rouge violacé.

**47. Blumenfalter (Deegen).**

Rose très-pur.

**49. Tijo Wylle (Sieckmann).**

Très-petite fleur d'un rouge cochenille clair.

**189. Boule de Neige (Schlachter).**

Blanc pur en forme de renoncule, bombée, à pétales bien tuyautés.

**190. Le nain (Schlachter).**

Fleur petite, en forme de renoncule, bombée, à pétales bien tuyautés; très-jolie nuance chamois bronzé.



## DEUXIÈME SÉRIE.

## DAHLIAS A GRANDES FLEURS.

Collection débarrassée des variétés qui ne sont pas de tout premier mérite.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES :

Pièce : 60 centimes. — 12 variétés : 6 francs. — 25 variétés : 10 francs. — 50 variétés : 18 francs.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs. — 50 variétés : 25 francs.

51. John Bennett (*Rawlings*).

Jaune fortement bordé d'écarlate.

52. Virginalis (*Abbé Berten*).

Grande fleur d'un blanc pur.

56. Proserpine (*Saller*).

Rouge laque pointé de rose.

57. Conspicua (*Guéneaux*).

Jaune primevère pointé de carmin.

60. Incomparable (*Keynes*).

Jaune pointé de violet.

## 66. Président Brongniart.

Jaune mat bordé de jaune d'or.

## 70. M. Martin.

Fleur grande, jaune vif légèrement pointé de rouge.

## 75. Mad. Brossart.

Fleur grande, rose nuancé de pourpre clair.

## 80. Gloire des Amandiers.

Fleur grande, jaune strié, ligné et marbré de pourpre.

## 81. Iris.

Fleur grande, ocre pointé de jaune.

## 83. Charivari.

Fleur grande, pourpre marbré et piqué de jaune.

85. Eclat (*Deegen*).

Fleur grande, lilas violacé pointé de blanc.

86. M. Arthur de Warelles (*Delesalle*).

Brunâtre nuancé de rose, strié et ligné de marron foncé.

87. M. Grau-Despature (*Grau-Despature*).

Fleur très-grande rose vif refleté de lilas foncé.

88. Triomphe de l'Exposition de Tourcoing (*A. Holbecque*).

Orange nuancé de brun.

## 93. Docteur Faucher.

Orange saumoné nuancé de rose.

## 95. Gem.

Pourpre foncé pointé de jaune.

## 97. Donald Beaton.

Pourpre marron.

102. M. Graindorge (*Graindorge*).

Blanc crème nuancé de jaunâtre et bordé de lilas carminé.

106. M. Lecerf (*Couvreux*).

Pourpre foncé velouté.

## 108. Brunette.

Blanc crème fortement bordé de camaïso.

109. Comtesse de Sinety (*Anseau*).

Brun buffle et orange nuancées de lilas.

110. Clémence Isaure (*Anseau*).

Fleur énorme, jaune légèrement pointé de lilas.

## 114. Pointe de la Chapelle.

Rouge cerise vif rayé et pointé de blanc.

124. Lord Hawke (*Turner*).

Jaune d'or piqué de rouge.

125. Duke of Edinburgh (*Fellowes*).

Jaune foncé.

126. Crimson King (*Keynes*).

Rouge vif.

## 128. Miss Browning.

Jaune clair bordé de blanc.

134. Mr Dix (*Hobbs*).

Ecarlate.

136. King of Primroses (*Rawlings*).

Jaune primevère.

141. Cremorne (*Eckford*).

Jaune bordé de camaïso.

142. Duke of Cambridge (*Fellowes*).

Jaune safran nuancé et pointé de carmin.

143. Hubert Turner (*Turner*).

Blanc de lait nuancé de lilas.

145. Star of the morning (*Keynes*).

Orange safrané.

146. Rev. Dr Moffat (*Keynes*).

Jaune bordé de pourpre marron noirâtre.

150. George Goodhall (*Keynes*).

Ecarlate nuancé d'orange sur le bord des pétales.

151. John Cocker (*Keynes*).

Le plus foncé de tous les Dahlias, pourpre noirâtre.

152. Rival (*Harris*).

Rose pourpre violacé.

153. Mrs. Stancombe (*Keynes*).

Jaune canari légèrement pointé de carmin.

157. Negro Boy (*Keynes*).

Pourpre noirâtre nuancé de marron.

160. John Lamont (*Keynes*).

Brun/marron strié de noirâtre.

163. Empress of Austria (*Turner*).

Jaune strié de camaïso et pointé de lilas.

166. Vicomte de Kermoisin (*Pierre*).

Chamois isabelle pointé de jaune.

167. Souvenir de M. Alfred Moreau (*Delesalle*).

Fleur énorme, de forme parfaite, d'un rose carminé nuancé de blanc glacé.

168. Madem. Anna (*Delesalle*).

Fleur grande, bien faite, blanc bordé et nuancé de bleuâtre.

169. Augustine Rougier (*Parmin*).

Grande fleur bombée, pourpre très-clair, souvent à moitié blanche.

171. Gloire de Guiscard (*Parmin*).

Grande fleur, orange pointé de blanc.

172. Comte Adhémar de Bousies (*Scalabre-Delcour*).

Fleur de première grandeur, bien tuyautee, de forme parfaite, d'un beau chamois nuancé d'orange.

174. **M. E. Vandendriessche** (*Scalabre-Delcours*).

Fleur de forme parfaite, bombée, à pétales tuyautés; gris foncé passant au gris clair.

176. **Malvina** (*V. de Ressegulier*).

Rose agate, glacé de rose plus foncé et pointé de blanc.

177. **Alexandre Cramond** (*Keynes*).

Grande fleur, marron ombré de jaunâtre, d'un brillant effet.

178. **James Service** (*Keynes*).

Cramoisi foncé pourpre.

179. **Royal Queen** (*Eckford*).

Grande fleur d'un blanc crème fortement bordé de cramoisi pourpre.

180. **M. J. D. Reid** (*Keynes*).

Grande fleur de la meilleure tenue, jaune d'oere.

181. **M. Emile Damsaux** (*Scalabre-Delcours*).

Grande fleur, pétales d'un rouge orangé bordé à la base de rose clair, pour finir en un beau jaune diversement nuancé.

182. **Félix Muller** (*Scalabre-Delcours*).

Grande fleur rouge cramoisi, bien tuyautée et de forme parfaite.

184. **Florent Pauwels**.

Jaune d'or vif, à fond rougeâtre au centre.

185. **Triomphe de Lorraine**.

Jaune ombré et ligné de carmin clair.

186. **Arlequin**.

Jaune d'or vif strié d'écarlate vif.

187. **Empereur du Maroc**.

Carmin très-foncé, pointé d'incarnat.

188. **Mrs. Hodgson** (*Keynes*).

Jaune clair strié de cramoisi, grandes fleurs.

191. **Mandarin**.

Jaune clair, légèrement strié de rose pâle.

192. **M. Ryckewaert**.

Oeillet jaune avec stries rouge foncé.

193. **Sir Gréville Smith**.

Pourpre.

194. **M. Jadoul**.

Fond jaunâtre passant au rose lilacé, revers des pétales bleuâtre.

195. **Mont doré**.

Orange foncé, à reflets couleur feu.

196. **Miss. Bond**.

Fond blanc bordé et légèrement strié de pourpre.

197. **Mad. Carmin**.

Cramoisi foncé.

198. **Marie Wouters**.

Jaune d'or parfois légèrement bordé de rouge.

199. **Souhait de la Grandeur**.

Rouge brique.

200. **M. L. Van Houtte** (*Scalabre-Delcours*).

Fleur très-grande, d'une parfaite imbrication, très-pleine, d'un jaune pâle ligné de carmin, bien tuyautée et parfaite de forme; extra.

202. **M. Desaegeher**.

Grande fleur d'un rouge feu nuancé de noir, de forme parfaite, pétales bien tuyautés.

203. **Mad. Elisa Lenglet**.

Fleur d'un rose lilacé, de forme admirable, pétales bien tuyautés.

206. **Le Miroir**.

Orange doré à larges bords jaune brillant.

207. **Perry noir**.

Noir velouté avec les pointes des ligules blanches.

208. **Mad. A. Paulnier**.

Jaune isabelle strié de rose.

209. **Duc du Touquet**.

Marron.

210. **Burgundy**.

Riches pourpre foncé mêlé de marron clair.

211. **Beacon**.

Jaune d'or à reflets écarlates, revers lilas, strié de marron.

212. **Polly Sandel**.

Jaune citron, pointé de rose pâle.

213. **Lady Antrobus**.

Rouge pointé de blanc pur.

214. **Vinoy**.

Carmin foncé pointé de blanc.

215. **Roi des Pays-Bas**.

Jaune vif pointé de rouge capucine.

216. **Cyrilla**.

Jaune d'or pointé de blanc.

217. **Madem. Ant. Wouters**.

Écarlate foncé ombré de jaune d'or.

218. **Mrs. Shirley Hibbert**.

Rose tendre finement pointé de violet.

219. **M. Rodolphe Levesque**.

Écarlate brillante.

220. **Carl Steffeck**.

Rouge brun, revers lilacé.

221. **Souvenir de J. Hudeline**.

Magenta foncé à lignes jaunes.

222. **François Wyot**.

Rouge magenta, énorme.

223. **John Dory**.

Rouge pointé de blanc.

224. **Striata grandis**.

Couleur isabelle strié de cramoisi.

225. **Professeur Burvenich** (*Scalabre-Delcours*).

Jaune saumoné lavé de carmin.

226. **Victor Duflo**.

Pourpre velouté.

227. **Mon ami**.

Rouge vermillon.

## TROISIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1886.

La pièce : 2 francs.

228. **Président Delrue-Schrevens** (*Scalabre-Delcours*).

Grande fleur bien pleine, bien tuyautée, de forme parfaite, rose pourpre légèrement violacé.

Cette superbe variété a obtenu un premier prix à l'Exposition de Tournai, en 1886.

229. **Commandant Zinck** (*Scalabre-Delcours*).

Grande fleur, bien pleine et parfaite de forme, fond chamois

lavé de rose violacé à l'extrémité des ligules; a également obtenu un prix à l'exposition de Tournai, en 1886.

230. **Madem. Van den Driessche** (*Scalabre-Delcours*).

Rose foncé ligné de brun, revers des pétales lilas clair,

Ces trois variétés nouvelles ont été gagnées par Monsieur SCALABRE-DELCOUR, propriétaire à Tourcoing (Nord).



## QUATRIÈME SÉRIE.

## DAHLIAS A FLEURS SIMPLES.

Les *Dahlias à fleurs simples* sont fort recherchés en ce moment pour la formation des grands massifs en plein air, où ils produisent beaucoup d'effet par leur abondante floraison. On voit parfois une cinquantaine de fleurs, et plus, ouvertes à la fois sur un seul sujet.

Au choix, *Pièce* : 75 centimes. — *Les douze* : 8 francs.

503. *Scarlet Dwarf.*

Écarlate orangé clair.

504. *Painted Lady.*

Fleur bien étalée, moyenne, d'un beau rose pourpre.

505. *Yellow Gem.*

Fleur très-bien faite, d'un beau jaune pâle.

507. *Paragon.*

Riche brun marron velouté, liseré de pourpre sur le bord des pétales, centre d'un jaune clair.

509. *Beauty of Cambridge.*

Très-grande fleur bien faite, plate, écarlate très-foncée.

510. *White Queen.*

Très-grande fleur plate, larges pétales bien en forme, blanc très-légèrement teinté de rose violacé pâle.

512. *Ascalon.*

Fleur moyenne, bien faite, pourpre vif.

513. *Lutea grandiflora.*

Très-grande fleur, bien faite, d'un beau jaune canari.

514. *Mauve Queen.*

Très-grande fleur, bien faite, plate, très-larges pétales bien arrondis, d'un superbe mauve vif.

515. *Rob Roy.*

Fleur moyenne, cramoisi vif velouté.

517. *Darkness.*

Fleur moyenne, carmin sombre velouté.

521. *M. Scalabre-Delcœur.*

Belle fleur étalée, jaune citron lavé d'orange à la pointe des pétales.

522. *Charles Castelyn.*

Fleur étalée, violet pensée passant au violet clair à la pointe des pétales.

524. *Madem. Léonie Van Houtte.*

Belle fleur étalée, incarnat foncé.

525. *Madem. Clara de Meulenaere.*

Très-belle fleur étalée, rose lilacé à l'intérieur des pétales, base des pétales jaune d'or lavé de rose.

526. *Alphonse Karr.*

Fleur étalée, jaune soufre lavé et légèrement strié de rose lilacé à la pointe des pétales.

528. *Prince Albert Victor.*

Belle fleur étalée, rouge saumon flammé d'incarnat.

530. *Camille Thienpont.*

Fleur étalée, carmin violacé.

532. *Mad. Scalabre-Delcœur.*

Belle fleur étalée, carmin jaunâtre à reflets changeants.

534. *John Cowan.*

Brun marron velouté ligné de pourpre au milieu des pétales centre jaune clair.

## CINQUIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1888.

## DAHLIAS A FLEURS SIMPLES STRIÉES.

Livrables en mai-juin en boutures.

*La pièce* : 4 francs.

600. *Emile Brandt (L. Van Houtte).*

Fond jaune chamois lavé de lie de vin avec des mouchetures et des stries irrégulières rouge sang.

601. *Mad. Blondet ( " ).*

Fond jaune clair moucheté et irrégulièrement strié de grenat.

602. *Docteur Billy ( " ).*

Fond jaune citron flammé de saumon clair avec des mouchetures et des stries carmin foncé.

603. *Victor Biebueyk ( " ).*

Fond carmin vineux strié de rouge sang foncé velouté.

604. *M. Bernier d'Hongerswal ( " ).*

Fond blanc pointillé et strié de carmin foncé.

605. *M. Bauchart (L. Van Houtte).*

Fond rose lilacé, centre des pétales jaune ligné de carmin.

606. *Mad. L. Batley ( " ).*

Centre des pétales jaune clair avec stries blanches et carminées.

607. *Dr Eugène Azam ( " ).*

Rouge vif strié de carmin et de jaune.

608. *Marie Audent ( " ).*

Jaune strié de rouge.

## DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

Livrables en bons TUBERCULES.

*Pièce* : 75 centimes. — 12 plantes : 9 francs. — 25 plantes : 15 francs.

1. *Alba nana.*

Grande fleur d'un blanc pur, de forme parfaite; la plus naine des variétés.

2. *Colibri.*

Petite fleur écarlate avec un petit bouton vert au centre.

3. *Solfatara.*

Petite fleur d'un jaune vif.

6. *Roi des nains.*

Rouge groseille carminé; grandes fleurs.

Les quatre variétés ci-dessus conviennent surtout pour corbeilles et massifs; elles n'atteignent que 50 centimètres de hauteur et n'ont pas besoin de tuteur. Leur floraison est abondante; leurs coloris, nets et tranches, produisent un charmant effet.

## DAHLIAS CACTUS.

	Fr. C.		Fr. C.
450. <b>Etoile du diable</b> ( <i>Jaurezi</i> ) . . . " 75		453. <b>Lord Lyndhurst</b> . . . " 75	
Rouge étincelant.		Pourpre foncé.	
451. <b>Picta formosissima</b> . . . " 75		454. <b>Constance</b> . . . 2 "	
Jaune orange, bordé d'écarlate pourpré; de grand effet.		Blanc pur.	
452. <b>Mrs. Stait</b> . . . 2 "			
Blanc pur, fimbrié, la fleur ressemblant à un Chrysanthème de Chine.			

## AUTRES DAHLIAS.

5. **Vert** (*Stechmann*) (FLORE, XIX, III). — (75 centimes).

Fleur moyenne, pleine, entièrement verte.

4. **Imperialis**. — (1 franc).

Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupes de trois plantes dans les pelouses, mais ne fleurissant pas en plein air.

DIANTHUS (*OEILLET*S).

Les *œillets* sont de charmantes plantes, dont l'éloge n'est plus à faire, et sont aujourd'hui répandus dans tous les jardins, même les plus modestes. Ils opèrent leur floraison aussi bien en plein air qu'en orangerie, suivant le traitement qu'on leur applique. Les variétés obtenues par l'hybridation sont nombreuses et des plus belles; elles rivalisent de richesse pour les coloris, où se rencontrent le blanc pur, l'incarnat, le rose, le rouge dans tous ses tons, le lilas, le violet, le jaune et les nuances intermédiaires; un très-grand nombre d'entre elles sont panachées, striées, flammées, pointillées, etc.; elles ont toutes des fleurs doubles à pétales entiers ou fimbriés, exhalant la plus suave odeur.

Tout ce qui n'est pas de premier ordre a été supprimé  
dans les collections.

1907. <b>Souvenir de la Malmaison</b> (FLORE, XII, 131). Variété de premier ordre. Fleur très-grande, bien double, blanc reflété d'incarnat tendre . . . . .	fr. " 50
<i>les douze</i> . . . . .	" 5 "
1908. <b>Mad. Éd. Pynaert</b> . Fleur ample, coloris rose carminé de la plus grande richesse et très-florifère; fleur extraordinairement grande, rappelant parfaitement, quant à la forme, le " <i>Souvenir de la Malmaison</i> ,"; variété de tout premier ordre . . . . .	" 1 "
<i>les douze</i> . . . . .	" 10 "
1909. <b>Prince d'Orange</b> . Fleur jaune, finement striée de rouge vif . . . . .	" 1 50
1913. <b>Madem. Else de Bleichroeder</b> . Variété aussi robuste que la précédente, très-naine, à fleurs rose carminé vif de la plus grande richesse; coloris très-constant . . . . .	" 1 50
<i>les douze</i> . . . . .	" 15 "
1914. <b>Nec plus ultra</b> . Fleur blanche, double, fimbriée, de forme parfaite et constante . . . . .	" 1 "
<i>les douze</i> . . . . .	" 10 "
<b>The Governor</b> . Fleur de forme parfaite, d'un beau blanc carné, de tout premier ordre . . . . .	" 2 "
<b>Janira</b> . Fond jaune fortement strié de marron . . . . .	" 2 50

## OEILLET S A GRANDES FLEURS JAUNES.

<b>Chromatella</b> . Jaune soufre . . . fr. 1 50	<b>Bell Halliday</b> . Jaune canari. . . fr. 1 50
<b>Lady Cathcart</b> . Jaune soufre clair. " 1 50	<b>Mrs. Dannis</b> . Jaune pâle . . . " 1 50

## OEILLET S HYBRIDES.

Variétés nouvelles ornées de larges macules sur les pétales, toujours blancs en dessous. Les fleurs, parfaitement doubles, de ces beaux œillets rappellent celles de l'œillet de Chine par la fraîcheur et la vivacité de leurs coloris et ont l'avantage de ne jamais crever.

*La pièce* . . . . . 1 50 fr.

<b>Geneviève</b> . Fond blanc maculé de pourpre violacé.	<b>Adrienne</b> . Fond blanc légèrement maculé de rose tendre.
<b>Gilberte</b> . Fond blanc largement maculé de rose saumoné.	<b>Raymonde</b> . Fond blanc maculé de vermillon brillant.
<b>Berthe</b> . Fond blanc maculé de carmin vif.	



**CEILLETS FLAMANDS** (*Dianthus Caryophyllus*).

25 plantes en plusieurs variétés, avec noms . . . . .	20 francs.
50 — — — — —	55 "

**CEILLETS REMONTANTS.**

25 plantes en plusieurs variétés, avec noms . . . . .	20 francs.
50 — — — — —	35 "

**CEILLETS DE FANTAISIE.**

Magnifique collection, en plusieurs variétés sans noms, remarquables par la vivacité de leurs coloris.

Pièce . . . . .	fr. " 75
25 plantes en plusieurs variétés . . . . .	" 16 "
50 — — — — —	" 30 "

**1915. CEILLETS DE POÈTE BOUQUETS PARFAITS** (*Dianthus barbatus*).

Variétés de semis, sans noms, en beau mélange; les douze . . 3 francs.  
le cent. . . 20 "

**FUCHSIA D'ÉLITE.**

Les *Fuchsia* sont des abrisseaux d'un port élégant, d'une culture facile, qui décorent aussi bien la serre froide que les parterres en plein air, en été; ils y étalent leurs jolies fleurs en pendeloques, simples ou doubles, des coloris les plus vifs et les plus variés.

**PREMIÈRE SÉRIE.**

Au choix de l'amateur. — Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

A notre choix. — Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

Les variétés dont les noms sont précédés d'un astérisque (\*), ont des fleurs doubles.

1. Don Giovanni (*Banks*).
2. Lucrezia Borgia (*Banks*).
3. Lady Heylesbury (*Bull*).
5. Aurora Superba (*H. Demay*).
6. Erecta (*Williams*).
7. Elegance (*Bull*).
9. Duchesse de Gérolstein (*Lemoine*).
11. Phenomenal (*Banks*).
12. \*M. Fillion (*Crouse*).
13. \*Troubadour (*Bull*).
14. \*Conqueror (*Felton*).
15. \*Tower of London (*Henderson*).
16. \*Formosa (*Williams*).
19. Sunray (*Th. Milner*).
25. \*Admiration (*Bull*).
26. Baroness (*Bull*).
28. Général Nansouty (*Lemoine*).
34. Beatrice (*Williams*).
37. \*Schneewittchen (*Klein*).
38. Earl of Beaconsfield (*Laing*).
39. \*Capitaine Boyton (*Lemoine*).
41. \*Norma (*H. Demay*).
45. \*Géant des batailles (*Boucharlat*).
46. Justine Weinrich (*Weinrich*).
48. M. Dufaure (*Lemoine*).
51. Royal Osborne (*Todman*).
53. \*Alph. Daudet (*Lemoine*).
55. \*Paris-Murcie (*Lemoine*).

56. Reine des fées (*Feenkönigin*) (*Rosenkränzer*).
57. \*Périclès (*H. Demay*).
64. Gracieux (*Lemoine*).
65. \*Joseph Rosain (*Boucharlat*).
70. Président (*G. Smith*).
71. \*Spectabilis (*Boucharlat*).
79. \*Minstrel (*Bull*).
81. \*Phénoménal (*Boucharlat*).
82. \*Rubens (*Puteaux-Chaimbault*).
83. Tulip (*Bull*).
87. \*Coriolan (*H. Demay*).
90. \*Amiral Courbet (*Lem.*).
92. Duchess of Albany (*Lye*).
93. \*Esméralda (*Bouch.*).
94. Flocon de neige (*Lem.*).
96. \*Grafin Szereny (*Tverd.*).
97. Harlequin (*Eckford*).
98. Mad. Carrière (*Aubin*).
100. Mad. Thibaut (*Aubin*).
102. Progress (*Eckford*).
103. \*Frau Emma Töpfer (*W. P.*).
104. \*Capitaine Lainé (*E. A.*).
106. \*M. Lecordier (*E. A.*).
107. \*M. Lecureur (*E. A.*).
108. Cupidon (*Hoste*).
109. \*La France (*Lem.*).

## DEUXIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1887.

Pièce : fr. 1-50.

Livable en mai-juin en boutures.

113. **A. De Leau (Rozain).**

Tube long, sépales larges, pourpre foncé veiné de cramoisi, corolle très-grande, très-pleine, amarante violacé.

114. **Henri Etienne (Rozain).**

Sépales larges, rouge pourpre carminé, corolle très-large, pleine, sphérique, amarante moiré azuré.

115. **Patrie (Rozain).**

Tube et sépales rose carminé, corolle large, pleine, blanc très-pur; plante vigoureuse, compacte, de belle tenue.

116. **Ville de Lyon (Rozain).**

Tube gros, sépales rouge cramoisi, corolle énorme, double, blanc fortement veiné de carmin; plante vigoureuse.

117. **Belle Havraise (Ed. Arr.).**

Plante vigoureuse, sépales rose carminé, corolle très-double, blanc pur, très-florifère.

118. **M. Cl. Cloquet (H.).**

Énormes fleurs doubles, beau bleu violacé, sépales larges, carmin brillant; plante d'un beau port.

119. **M. Fr. Pittet (H.).**

Corolle de grande dimension, violet rose, sépales horizontaux énormes formant la plus grande fleur qui existe dans les Fuchsias simples; plante érigée.

120. **Reine Hovat (H.).**

Corolle blanche en forme de cloche évasée, sépales relevés, rouge vineux.

## HÉLIOTROPES.

Les *Héliotropes*, cultivés depuis longtemps en serre pour leur délicieuse odeur, ont donné, par le semis, des variétés fort jolies, de nuances diverses, et qui font un très-bon effet dans les parterres en plein air, pendant l'été.

Pièce : 50 centimes. — Bleus et blancs pour massifs, le cent : 35 francs.

1. **Triomphe de Liège.**3. **Mulâtre (H. Demay).**8. **Swanley Giant.**9. **White Lady (Bruant).**10. **Albert Delaux (Delaux).**11. **incanum. — 2 francs.**

## LANTANA.

On forme, avec les variétés de ce petit arbuste, de jolies corbeilles en pleine terre, à exposition chaude, en plein soleil, où elles produisent un charmant effet par la diversité des coloris et leurs fleurs qui s'étalent en petits bouquets au dessus du feuillage; les *Lantana*, croissent même dans les mauvais terrains et ne demandent presque pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève les plantes en motte pour les hiverner dans une serre bien sèche.

Pièce : 50 centimes. — 12 à notre choix : 5 francs.

1. **Alba violacea (Rougier).**3. **Cauvin (Cauvin).**4. **Colibri (Hans).**5. **Delicatissima (Chauvrière).**6. **Fabiola (Rendatler).**8. **Goeschke.**9. **La neige (Lemoine).**10. **Mad. Rougier.**11. **M. Schmidt (Lemoine).**12. **Pluie d'or (Lemoine).**13. **Sémillant (Crousse).**14. **Toison d'or (Lemoine).**



## GERANIUM ZONALE DITS SCARLET.

Les *Geranium zonale*, si universellement répandus dans les jardins, voient continuer la vogue dont ils jouissent à juste titre. Ils ont le double privilège d'orner les serres froides et de garnir, pendant six mois de l'année, les corbeilles en plein air, où ils fleurissent sans interruption jusqu'aux gelées, et où ils produisent un admirable effet, par leurs fleurs brillantes et par les belles panachures du feuillage de bon nombre de variétés. Les ombelles sont devenues énormes par suite d'hybridations intelligemment opérées, et les fleurs, dans tous les coloris possibles, ont acquis presque de doubles proportions; ajoutons que les variétés à fleurs doubles ont complètement révolutionné ce beau genre.

Nos collections de GERANIUM ZONALE, tant simples que doubles, ont obtenu le premier prix (médaille d'or), à l'Exposition internationale d'Ostende en 1883 et aux Expositions de Gand en 1884, et les deux premiers prix au grand concours international d'Anvers en 1885.

Tout ce qui n'est pas de premier ordre a été supprimé.

### PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs. — Le cent : 30 francs.

- |   |   |
|---|---|
| <p>401. <b>Multiflora.</b><br/>Ombelles de moyenne grandeur, à fleurs rouge très-vif, très-naine et convenant parfaitement pour bordures.</p> <p>412. <b>Madem. Nilsson (H. Demay).</b><br/>Beau rose lilacé, centre blanc.</p> <p>453. <b>Comtesse de Courey (Boutard).</b><br/>Lilas, pétales supérieurs maculés de blanc.</p> <p>460. <b>Duchesse de Maillé (Boutard).</b><br/>Lilas carné nuancé de blanc sur les pétales supérieurs.</p> <p>463. <b>Avenir National (Lemoine).</b><br/>Carmin très-vif.</p> <p>478. <b>Lucretia (W. Paul).</b><br/>Blanc reflété d'incarnat.</p> <p>479. <b>M. J. George (W. Paul).</b><br/>Grande fleur écarlate orangé clair.</p> <p>481. <b>Ulysses (W. Paul).</b><br/>Écarlate orange vif.</p> <p>494. <b>M. Laine (Delesalle).</b><br/>Carmin vif reflété d'orange.</p> <p>496. <b>Triomphant (Delesalle).</b><br/>Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé de rose.</p> <p>503. <b>Berton-Seulin (De Lombaerde).</b><br/>Jaune chamois nuancé de rouge saumon.</p> <p>504. <b>Perfection (De Lombaerde).</b><br/>Rouge orange, centre blanc.</p> <p>505. <b>Candeur (De Lombaerde).</b><br/>Rose clair nuancé de lilas, grand centre blanc.</p> <p>515. <b>Admiranda (Bull).</b><br/>Incarnat tendre, base des pétales rouge saumon écarlate vif.</p> <p>526. <b>Progrès libéral (Lemoine).</b><br/>Rose violacé.</p> <p>536. <b>La Tour d'Auvergne (Lemoine).</b><br/>Rouge groseille clair.</p> <p>537. <b>Lieutenant Bellot (Lemoine).</b><br/>Rouge cinabre foncé.</p> <p>538. <b>R. Töpfer (Lemoine).</b><br/>Orange pâle marbré de rose.</p> <p>544. <b>Lucy Bosworth (Pearson).</b><br/>Rose clair.</p> <p>549. <b>Ellen (Pearson).</b><br/>Saumon bordé de blanc.</p> <p>553. <b>Pirate (Pearson).</b><br/>Écarlate carminé.</p> | <p>554. <b>Sir H. S. Stanhope (Pearson).</b><br/>Cramoisi très-foncé.</p> <p>560. <b>John Fellowes (Pearson).</b><br/>Rouge cerise vif.</p> <p>583. <b>Madem. Wilhelm (Bertier-Rendatler).</b><br/>Blanc mat, se teintant de rose à la fin de la floraison.</p> <p>584. <b>M. Paul Boselli (Boutard).</b><br/>Rose violacé-foncé, éclairé de blanc au centre.</p> <p>587. <b>Mad. Boselli (Boutard).</b><br/>Rose saumoné, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet.</p> <p>595. <b>D'Audiffret-Pasquier (Lemoine).</b><br/>Rouge laque carminée, nervure de rose clair sur les pétales supérieurs.</p> <p>596. <b>Sir J. Dyke (Cannell).</b><br/>Rose vif, pétales supérieurs blancs.</p> <p>597. <b>Général Chanzy (Lemoine).</b><br/>Violet clair.</p> <p>603. <b>Jeanne D'Arc (Lemoine).</b><br/>Blanc pur.</p> <p>604. <b>Paul-Louis Courier (Lemoine).</b><br/>Rouge vermillon.</p> <p>605. <b>Eugène Liébert (Lemoine).</b><br/>Rouge brique orangé.</p> <p>608. <b>R. F. Atkingson.</b><br/>Cramoisi très-foncé, centre blanc.</p> <p>611. <b>Étendard des amateurs (Aldebert et Denecker).</b><br/>Orange cuivré, centre blanc.</p> <p>613. <b>Californie (Delesalle).</b><br/>Rose carminé, nuancé de blanc au centre.</p> <p>630. <b>Mrs. Pollett.</b><br/>Rouge, centre blanc.</p> <p>631. <b>M. Lepère (Lemoine).</b><br/>Rouge laque violacé, pétales supérieurs rouge feu à la base.</p> <p>635. <b>Marie Mangin (Gerbeaux).</b><br/>Saumon rosé, légèrement nuancé de blanc sur les bords.</p> <p>638. <b>Soleil couchant (Boucharlat).</b><br/>Aurore feu, marbré de blanc sur le bord, centre plus vif.</p> <p>643. <b>Jules Favre (Lemoine).</b><br/>Rouge laque vif reflété de rouge grenadin.</p> <p>647. <b>L'Elysée (Lemoine).</b><br/>Orange, graduellement saumoné vers le centre.</p> <p>648. <b>Léo Delibes (Lemoine).</b><br/>Rouge saumon largement teinté de blanc.</p> |
|---|---|

650. **Marguerite Jacquot** (*Crousse*).  
Rose carné réticulé, centre rouge minium clair pointé de blanc.
653. **M. D'Astis** (*Bouchariat*).  
Violet rose intense, pétales supérieurs maculés de blanc.
656. **I've got it** (*Windsor*).  
Blanc pur; variété bonne pour le marché.
657. **Mad. Doublat** (*Crousse*).  
Rose abricoté, teinté de rouge cuivré et de violacé.
658. **E. Richard** (*Tallendier*).  
Rose de Chine très-tendre, œil blanc.
659. **Gloire lyonnaise** (*Bouchariat*).  
Earlate capucine, œil blanc au centre.
661. **Orange et jaune** (*Delesalle frères*).  
Orange jaunâtre; variété ramifiée, d'un beau port.
662. **Norma** (*Delesalle frères*).  
Vermillon reflété de carmin.
663. **Rose et Blanc** (*Delesalle frères*).  
Rose clair carminé reflété de blanc argenté.
664. **Antonin Proust** (*Crousse*).  
Carmin violacé, pétales supérieurs pourprés et cramoisis.
665. **Berthelot** (*Lemoine*).  
Violet solféréno, fortes macules capucine sur les pétales supérieurs.
668. **Gaston Tissandier** (*Lemoine*).  
Rose franc; variété florifère.
675. **Virginal** (*Bruant*).  
Rose carné nuancé de blanc.
676. **M. Charles Caulliez** (*Delesalle frères*).  
Très-fortes ombelles de fleurs bien fortes, cramoisi foncé velouté.
679. **M. Cornil** (*Delesalle*).  
Bouquet énorme, fleur très-grande, aurore carminé à reflets violacés, centre plus foncé.
682. **Joseph Smith** (*Hoste*).  
Ombelles d'une dimension extraordinaire, larges fleurs groseille violacé.
683. **Rembrandt** (*Bruant*).  
Plante très-naine, rouge anglais violacé foncé, les deux pétales supérieurs éclairés de capucine étincelant.
687. **Madem. Antoinette Wouters** (*J. Aldebert et Denecker*).  
Fleur grande et bien arrondie, rose carminé nuancé ardoisé, reflété de violet; pétales supérieurs maculés.

690. **Mad. Charles Hamet** (*D. F.*).

Très-fortes ombelles de grandes fleurs, joli coloris rose Cent-feuilles, maculé et ligné de carmin sur tous les pétales. Plante naine.

691. **Martinache** (*D. F.*).

Très-fortes ombelles, beau coloris rouge giroflée, fortement teinté d'amarante violacé.

694. **François Debergue** (*Bruant*).

Ombelles moyennes, fleurs à très-larges bords, blanc pur, centre saumon clair.

695. **Cosmos** (*Lemoine*).

Ombelles énormes, fleurs grandes, bien faites, saumon orangé vif, plus clair au centre.

697. **Le Colosse** (*Gerbeaux*).

Gros bouquet de fleurs énormes, saumon clair veiné de rose, centre rose tendre.

702. **M. Fr. Desarbres** (*Hoste*).

Enormes ombelles de superbes fleurs saumon foncé à centre orange feu; excellente pour massifs d'une seule couleur.

704. **George Bentham** (*Lem.*).

Grandes fleurs rose violacé clair, pétales supérieurs largement maculés de rouge brique.

705. **La Pureté** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Très-fortes ombelles de grandes fleurs blanches.

706. **Guermonprez** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Très-forte ombelle de grandes fleurs rouges à reflet capucine.

707. **Jules Martin** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Très-fortes ombelles de grandes fleurs rouge violacé, nuancé de carmin, avec œil blanc.

708. **Aline** (*Gerbeaux*).

Ombelles énormes, saumon brillant à centre blanc lilacé.

709. **Mad. Jules Chrétien** (*Hoste*).

Ombelles énormes de fleurs d'une forme distinguée; rose tendre avec liseré rose carmin, centre des pétales blanc pur.

710. **Mad. la V<sup>tesse</sup> de Roquefeul** (*Hoste*).

Blanc de cire teinté de rose saumoné; très-distingué.

711. **Général Brière** (*Roz. B.*).

Ombelles énormes; rouge écarlate, centre blanc.

712. **J. B. Dumas** (*Lemoine*).

Ombelles énormes; violet amarante, pétales supérieurs marqués de capucine.

714. **M. Albert Delaux** (*Rozain*).

Blanc teinté de rose et pointillé de carmin, avec des taches blanc de lait sur les pétales supérieurs.

715. **Mad. de la Roque** (*Bruant*).

Grosses ombelles de fleurs rondes, beau saumon vif, centre orange brillant; variété remarquable.

## DEUXIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1886.

Pièce : 1 franc. — Les douze : 10 francs.

720. **Hommage à Louis Van Houtte** (*P. de Septenville*).

Fleurs et ombelles énormes portées sur de solides pédoncules, de forme parfaite et d'un riche coloris abricot saumoné, flammé de blanc et éclairé de rose sur le bord des pétales.

721. **Christophe Colomb** (*Lemoine*).

Ombelles énormes de fleurs cinabre orangé; plante très-trapue.

722. **Ed. Pynaert** (*Delesalle*).

Solféréno brillant, maculé de capucine sur les pétales supérieurs.

723. **Le Cid** (*Bruant*).

Grandes fleurs cerise saumoné avec deux macules lilas; variété à gros bois.

724. **Mad. de Gentz** (*Gerbeaux*).

Grandes fleurs laque carminée, maculées de rose clair et nervurées de carmin; bonne variété pour massifs.

725. **M. Ed. Chartron** (*Bruant*).

Grandes fleurs rose mauve, pétales supérieurs légèrement maculés de blanc.

726. **Pauline Bossert** (*Pfétzer*).

Grandes ombelles du blanc le plus pur.

727. **Poète national** (*Lemoine*).

Grandes fleurs couleur chair foncée, centre blanc, pétales supérieurs teintés de saumon.

728. **Protée** (*Bruant*).

Très-grandes fleurs couleur chair lilacée, nuancée de blanc passant au rose tendre; variété à gros bois.

730. **Sceptre rose** (*Bruant*).

Rose vif saumoné, maculé de blanc sur les pétales supérieurs, bonne variété pour massifs.

731. **Téléphone** (*Gerbeaux*).

Fleurs amarante violacé à bords carmin avec une macule orange au centre; variété naine.

732. **Toussaint Louverture** (*Lemoine*).

Grandes ombelles de fleurs bien rondes, fuchsine foncée, centre et pétales supérieurs maculés de carmin et veines de pourpre noirâtre.

733. **Vicomte d'Etchegoyen** (*Bruant*).

Groseille clair; variété hâtive.



734. **Mad. la Baronne Huytens de Terbecq** (*Delom.*).

Ombelles énormes de grandes fleurs saumon clair reflété de rose.

735. **Mer rouge** (*Lem.*).

Ombelles énormes de fleurs rouge cramoisi; bon port.

736. **Mad. Blanche Moulas** (*Bruant*).

Grandes fleurs très-rondes, saumon frais, larges bords blancs; très-belle variété.

737. **Baron de Puynode** (*Bruant*).

Fleurs énormes, orange vermillonné à œil blanc.

738. **M. Maxime Cornu** (*De Bosschere*).

Saumon cuivré reflété de rose aurore.

739. **M. Johnston** (*Pearson*).

Grandes fleurs magenta vif.

740. **Louis Ulbach** (*Lemoine*).

Très-fortes ombelles de fleurs rouge écarlate brillant.

741. **Lord Chesterfield** (*Pearson*).

Grandes fleurs magenta vif.

742. **Arc-en-ciel** (*Delom.*).

Violet clair, bords carmin maculé d'orange vif.

### TROISIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1887.

Pièce : 2 francs.

Livrables en boutures en mai-juin.

743. **Louis Mayet** (*Rozain*).

Ombelles énormes de très-grandes fleurs, violet amarante bordé de cramoisi feu.

744. **Baronne de Hautpoul** (*Rozain*).

Fleurs des plus grandes, rose chair, centre blanc.

745. **Madem. Céline Bernin** (*Hoste*).

Blanc pur de tout premier ordre.

746. **Mélodie** (*Hoste*).

Jaune orange; plante très-vigoureuse.

747. **M. Alfred Mame** (*Bruant*).

Très-grandes fleurs rouge minium orangé très-brillant, avec deux macules lilas sur les pétales supérieurs.

748. **M. Bérat** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Très-grandes fleurs saumon vermillonné à œil blanc.

749. **Beauté suprême** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Fleurs grandes, très-bien faites, rouge feu nuancé; coloris nouveau.

750. **Guy** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Fleurs grandes et très-bien faites, rouge éclatant, œil blanc.

751. **Paule Dupuis** (*V<sup>e</sup> H. D.*).

Ombelles des plus grandes connues, blanc rosé, largement étoilé de carmin vif au centre.

752. **Pompéi**.

Grandes fleurs écarlate cinabre, légèrement maculées sur les pétales supérieurs, œil blanc pur très-apparent.

753. **Rosea perfecta** (*J. Ald. et Pen.*).

Ombelles énormes de fleurs rose vif avec macules blanc pur sur les pétales supérieurs.

754. **M. Bougard** (*J. Ald. et Pen.*).

Très-grandes ombelles d'une jolie nuance saumon pur bordé et glacé de blanc.

### QUATRIÈME SÉRIE.

Variétés très-recommandables, cultivées spécialement pour la confection des corbeilles en plein air, l'été. — Le cent : 25 francs.

526. **Progrès libéral** (*Lemoine*).

Rose violacé.

587. **Mad. Roselli**.

Très-fortes ombelles de très-grandes fleurs rose saumoné, leurs deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet.

400. **Tom Pouce**.

Variété très-naine à fleurs d'un rouge vif.

401. **Multiflora**.

Ombelles de moyenne grandeur à fleurs rouge très-vif. Cette

variété naine surpasse l'ancienne variété *Tom Pouce* par l'abondance de sa floraison; elle est d'un mérite exceptionnel pour bordures.

412. **Madem. Nilsson** (*H. Demay*).

Beau rose, lilacé, centre blanc.

604. **Paul Louis Courier**.

Fleurs énormes, rondes et bien faites, de la plus brillante couleur rouge vermillon, se couvrant d'une profusion d'ombelles très-grandes et des mieux faites.

### CINQUIÈME SÉRIE.

#### GERANIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs. — Le cent : 30 francs.

872. **M. Waddington** (*Lemoine*).

Rose vif bordé de vermillon.

873. **Montesquieu** (*Lemoine*).

Blanc légèrement rosé.

889. **Chambraloué** (*Delesalle*).

Rose vif argenté, très-grande macule blanche au milieu des pétales.

890. **M. Larident** (*Delesalle*).

Rouge orangé vif.

897. **Le Titien** (*Gerbeaux*).

Rouge saumon vif, liséré de blanc rosé.

900. **M. Florentier** (*Crousse*).

Rouge éclatant, centre écarlate velouté; variété naine.

904. **Grand chancelier Faidherbe** (*Lem.*).

Rouge solérino foncé teinté d'écarlate.

907. **Mad. L. Van Houtte** (*L. Van Houtte*).

Rose très-tendre bordé de rose plus foncé, avec des reflets blanchâtres du plus bel effet.

916. **Général Farre** (*Lemoine*).

Semi-double, rouge orangé au centre, rose saumoné au milieu des pétales.

917. **Ministre Constans** (*Lemoine*).

Orange très-clair, nuancé de rouge saumon.

919. **Perle des roses** (*Boucharlat*).

Rose vif nuancé de blanc.

922. **Comtesse de Tannberg** (*Mille-Mallet*).

Semi-double, rouge aurore vif vermillonné, reflété de carmin argenté.

928. **La candeur** (*Gerbeaux*).  
Lilas clair nuancé de blanc.
936. **Wilhelmine Inezedi** (*W. Pfitzer*).  
Fleur cramoisi étincelant ligné de blanc; variété florifère.
940. **M. Roche Alix** (*Hoste*).  
Ombelles compactes saumon rosé, le centre de la fleur saumon feu très-vif.
941. **Mad. Léonce de Beauregard** (*Bruant*).  
Fortes ombelles, pédoncule très-long, fleur large, saumon vif; chaque pétale bordé de blanc.
943. **Bruant** (*Bruant*).  
Fortes ombelles, fleurs simples ou semi-doubles du rouge vermillon le plus étincelant; petit feuillage épais et zoné; extra pour massifs.
945. **Belle France** (*Delaux*).  
Fleurs des plus grandes, ombelles bien rondes rose pourpre bordé d'amarante, pétales supérieurs maculés de blanc pur.
946. **Député A. Giard** (*J. Aldebert et Denecker*).  
Fleur très-grande et très-double, orange vermillon pur, plante florifère, d'un beau port.
953. **Souvenir de Louis Van Houtte** (*P. S.*)  
Grands bouquets de fleurs très-doubles d'un superbe carmin rose, coloris unique et hors ligne.
657. **Gustave Widdemann** (*Bruant*).  
Boules colossales, très-grandes fleurs abricot-cuiré vif; très-robuste et bien remontant.
958. **Panama** (*Lemvine*).  
Grandes ombelles de belles fleurs saumon vermillonné au centre et rose saumoné à la circonférence.
964. **A. Grossfürstin Wera** (*W. P.*).  
Belles ombelles de fleurs d'un coloris distingué, rappelant les fleurs du pommier et devenant plus foncé par la suite.
966. **Marie Hoste** (*H.*).  
Belle variété à fleurs d'un blanc pur; très-naine et très-florifère.
967. **Souvenir de F. Pertuzès** (*H.*).  
Ombelles et fleurs d'une forme parfaite, amarante violacé vif avec macules capucine; très-florifère et exceptionnellement naine, les variétés de ce coloris étant généralement élevées.
968. **Belle Nancéienne** (*Lemoine*).  
Ombelles énormes de fleurs compactes et régulières, blanches, légèrement marbrées et teintées de rose tendre, centre saumon vif.
969. **Le Nancéien** (*Gerbeaux*).  
Fleurs monstrueuses, d'une tenue parfaite, vermillon orangé nuancé de rouge.
970. **Baron Duranteau** (*Bruant*).  
Ombelles moyennes de grandes fleurs étalées, cramoisi noirâtre mêlé de violet vif et maculé de couleur feu.
972. **Général Billot** (*Lemoine*).  
Larges ombelles de grandes fleurs rouge laque teinté de feu.
976. **M. A. Piola** (*Bruant*).  
Énormes fleurs groseille carminé mêlé d'orange; variété à gros bois.
978. **Palmengarten - Inspector Siebert** (*Pfitzer*).  
Grandes ombelles cinabre foncé et écarlate feu.
980. **M. Outey** (*Bouch*).  
Saumon clair bordé de blanc.
981. **M. Ghys** (*V. H. D.*).  
Fleurs grandes, beau coloris rose vif.
983. **Gertrude** (*Gerb.*).  
Grandes fleurs semi-doubles, saumon clair à centre blanc.
984. **Gustave Wettge** (*Gerb.*).  
Énormes ombelles en boule de fleurs rose saumoné, liserées de blanc.
985. **Romulus** (*Gerb.*).  
Grandes fleurs semi-doubles, violet très-foncé avec une macule rouge vif au centre.
986. **Mad. Grillet** (*Roz. B.*).  
Grandes ombelles en boule, rose de Chine à reflet pourpre.
988. **M. Fabre** (*Delaux*).  
Énormes ombelles de grandes fleurs d'un beau cerise à reflet violet, centre orange pur.
989. **Bijou trouvé** (*Delaux*).  
Énormes ombelles de fleurs bien faites, rose carminé glacé de blanc violacé avec une macule blanche, au centre.
991. **Re Umberto** (*Bonfiglioli*).  
Fleurs semi-doubles rouge orange éblouissant.
993. **Mad. Ménoreau** (*Gerbeaux*).  
Très-grosses ombelles de grandes fleurs blanches, centre rose vif; variété naine.
994. **Mad. Hoste** (*Lemoine*).  
Grandes ombelles de fleurs couleur chair tendre, légèrement saumoné.
995. **Secrétaire Nicolas** (*Bruant*).  
Ombelles énormes rouge garance clair éclatant.
996. **Les Huguenots** (*Lemoine*).  
Larges ombelles de fleurs lilas argenté.

## SIXIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1886.

Pièce : 1 franc. — Les douze : 10 francs.

997. **Aimée Goubin** (*Delesalle*).  
Grandes fleurs violet cramoisi éclairé de feu.
998. **B<sup>ne</sup> de Lamberterie** (*Bruant*).  
Rose chair tendre, pétales supérieurs maculés de blanc.
999. **Contre-amiral Knorr** (*Goeschke*).  
Rouge cerise reflété de lilas, macules rouge feu sur les pétales supérieurs.
1000. **Espérance** (*Lemoine*).  
Très-jolie teinte rappelant la rose *Souvenir de la Malmaison*, avec centre saumon.
1001. **Général de Courcy** (*Lemoine*).  
Ombelles énormes, rouge brique au centre se dégradant en une teinte saumon.
1002. **Gloire de France** (*Lemoine*).  
Grandes fleurs saumon foncé au centre, bords des pétales blanc rosé.
1003. **Jules Lartigue** (*Gerbeaux*).  
Fleurs semi-doubles, pétales supérieurs carmin, ceux de la base laque violacée.
1004. **Météore** (*Gerbeaux*).  
Fleurs semi-doubles, vermillon orangé avec des tons jaunâtres.
1005. **M. Adrien Corret** (*Bruant*).  
Grandes ombelles cerise orangé clair devenant plus foncé à la fin de la floraison.
1006. **M. David** (*Rozain*).  
Rose carminé vif, maculé de blanc sur les pétales supérieurs.
1007. **M. François** (*Lemoine*).  
Ombelles sphériques de fleurs rouge cinabre; plantes trapues.
1008. **Ville de Lausanne** (*Hoste*).  
Grandes fleurs groseille teinté de minium.
1009. **Capitaine Poreau** (*De Lombaerde*).  
Grandes fleurs rose aurore lavé de rouge orangé brillant.
1010. **Capitaine Cambresy** (*De Lombaerde*).  
Ombelles compactes de grandes fleurs d'un rouge très-vif.
1011. **Georges De Lombaerde** (*De Lombaerde*).  
Gros bouquet de fleurs carmin cerise très-vif.



1012. **Paul De Lombaerde** (*De Lombaerde*).  
Grandes fleurs incarnat vif.
1013. **Jules De Lombaerde** (*De Lombaerde*).  
Fortes ombelles de fleurs rose lilacé pâle, centre blanc.
1014. **Mrs. Deken** (*Delom*).  
Enorme ombelle de grandes fleurs saumon vif lavé de rose pâle.
1015. **Prouvé** (*Lemoine*).  
Ombelles très-grandes, cerise vif plus foncé sur les pétales supérieurs.

1016. **Signora Virginia Rossi** (*Hoste*).  
Rouge orange vif bordé de saumon clair, très-florifère.
1017. **Samoa** (*Goeschke*).  
Ombelles hémisphériques, rouge amarante, centre plus clair.
1018. **Adolphe Grimminger**.  
Rouge feu velouté.
1019. **Germain Toulouse**.  
Ombelles énormes de grandes fleurs carmin et nankin.

## SEPTIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1887.

Pièce : 2 francs.

Livrables en boutures, en mai-juin.

1020. **Gloire de Schaerbeek** (*Delom*).  
Enormes ombelles rose violacé.
1021. **Charles Daniels** (*Rozain*).  
Fortes ombelles violet clair, pétales supérieurs à onglets orange; coloris nouveau.
1022. **M. Press** (*Rozain*).  
Ombelles colossales, fleurs des plus grandes connues, rose saumoné pourpre nuancé de carmin.
1023. **Félix Willem** (*J. W.*).  
Très-grandes fleurs bien faites semi-doubles, rouge vermillonné; variété naine très-florifère, excellente pour massifs.
1024. **P. Duchartre** (*Br.*).  
Rose tendre lavé de lilas violet passant au rose vif et allant jusqu'au carmin, fréquemment maculé de blanc.
1025. **Crépuscule** (*Br.*).  
Très-grandes fleurs cramoisi pourpre noirâtre, éclairé de violet vif, centre marqué de capucine.
1026. **Beauté Poitevine** (*Br.*).  
Enormes fleurs saumon brillant s'adoucisant graduellement en teintes plus claires sur les bords.
1027. **Oscar Boulet** (*V<sup>e</sup> H. D.*).  
Ombelles énormes de fleurs très-grandes et très-doubles, cerise vermillonné.
1028. **Raphaël** (*V<sup>e</sup> H. D.*).  
Fortes ombelles de fleurs grandes et bien faites, saumon vif, vermillonné au Centre.

1029. **Flora** (*V<sup>e</sup> H. D.*).  
Fortes ombelles de fleurs grandes et bien faites, capucine orangé.
1030. **Général Boulanger**.  
Fleurs très-larges, les pétales supérieurs vermillon, les inférieurs violet amarante. Lorsque les ombelles sont complètement épanouies ces deux nuances distinctes forment un contraste charmant.
1031. **L'admirable**.  
Fleurs semi-doubles, rose vif, les pétales supérieurs rose carminé très-vif, largement maculé de blanc crème veiné de carmin; coloris nouveau. Plante naine.
1032. **Triomphe du Nord** (*J. Ald. et Den.*).  
Enormes ombelles sphériques de très-grandes fleurs orange cuivré reflété de violet; plante naine très-florifère.
1033. **Président Hardy** (*Br.*).  
Fleurs très-grandes, bien ouvertes, semi-doubles, d'une très-belle nuance chamois cuivré mêlé d'orange; fréquemment les fleurs sont striées ou ponctuées de blanc.
1034. **Baronne de Layros** (*Br.*).  
Très-fortes ombelles de grandes fleurs du blanc le plus pur jusqu'à l'entière décoloration.
1035. **Le Caméléon** (*Ed. Pynaert*).  
Curieuse variété ayant des ombelles tantôt entièrement roses, tantôt entièrement écarlates et souvent mi-partie rose et écarlate.

## HUITIÈME SÉRIE.

## GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES, BRONZÉES, ETC.

	Fr. C.		Fr. C.
1100. <b>Alma</b> ( <i>Turner</i> ) . . . . .	50	1137. <b>Oriental</b> . . . . .	1 "
1102. <b>Silver Queen</b> ( <i>Kinghorn</i> ) . . . . .	50	1139. <b>Peter Grieve</b> ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	1 "
1104. <b>Flower of Spring</b> ( <i>Turner</i> ) . . . . .	50	1152. <b>Alpha</b> . . . . .	1 "
1107. <b>Mrs. Pollock</b> ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1153. <b>Mac-Mahon</b> . . . . .	50
1110. <b>Gold Pheasant</b> ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1156. <b>Goliath</b> . . . . .	1 "
1115. <b>Italia unita</b> ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1158. <b>Countess of Ashburnham</b> . . . . .	1 "
1117. <b>Artemus Ward</b> ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	50	1165. <b>Crystal Palace Gem</b> . . . . .	50
1123. <b>Countess of Tyrconnel</b> ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1172. <b>Gowrie</b> . . . . .	2 "
1125. <b>Lady Cullum</b> ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1173. <b>Freak of Nature</b> . . . . .	1 "
1126. <b>Star of India</b> ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	50	1175. <b>Triomphe de Brichard</b> ( <i>Brichard</i> ) . . . . .	1 "
1129. <b>Happy Thought</b> . . . . .	50	1176. <b>Mad. Sallerai = Le nain blanc</b> . . . . .	50
1132. <b>Autumn</b> ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	50	1177. <b>Lass O'Gowrie</b> . . . . .	2 "
1134. <b>Beautiful Star</b> . . . . .	50	1183. <b>M. Lain</b> . . . . .	50
1135. <b>Queen of Spain</b> . . . . .	50	1184. <b>Masterpiece</b> . . . . .	2 "
		1185. <b>Zulu</b> . . . . .	50

## GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES A FLEURS DOUBLES.

- Fr. C.
1140. **Sapho** (*Lemoine*). . . . . I "   
 Feuilles jaune bronze; fleur semi-double, jaune orangé vif.
1166. **Mrs. Strang** (*Williams*) . . . . . I "   
 Feuille verte zonée de brun rougeâtre et bordée de jaune; fleur semi-double écarlate.
1167. **Harmonie** (*Lemoine*) . . . . . I "   
 Feuille vert clair, zonée de bronze et bordée de blanc crème; fleur double, rouge saumon orangé.
1174. **Golden Jewel** . . . . . I "   
 Feuille verte fortement bordée de jaune; fleur très-double, cramoisi très-foncé; variété naine et florifère.
1180. **Mrs. Parker** (*Parker*) . . . . . I "   
 Feuille verte bordée de blanc; fleur double, rose tendre.

- Fr. C.
1181. **Triomphe de Gand** (*Snoeck*) . . . . . I "   
 Feuille verte au centre, bordée de blanc; fleurs semi-doubles, rose violacé, très-florifère, extra.
1186. **Princesse Clémentine** . . . . . I "   
 Plante très-naine, touffue, feuillage arrondi d'un jaune vif, fleurs nombreuses bien doubles rouge orange vif. Cette variété est d'un mérite exceptionnel pour bordures.
1187. **Roi des nains** . . . . . 2 "   
 Plante très-naine, touffue, feuillage d'un jaune vif, fleurs bien doubles, les plus rouges minium connues; sa grande vigueur fait que fleurs et feuilles résistent à tous les temps. Extra pour pleine terre.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS A CINQ MACULES.

Les *Pelargonium à grandes fleurs* sont de premier ordre comme plantes d'ornement de serre froide ou d'orangerie pendant l'été. Les fleurs sont élégantes de forme et brillent par la diversité et la beauté de leurs coloris.

La collection se compose d'environ 50 variétés que nous offrons, avec noms, aux prix suivants.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 20 francs.

PELARGONIUM A FEUILLES DE LIERRE (*lateripes*, *petatum*).

- Fr. C.
1301. **Princess Alexandra Thyra** (*Bull*) . . . . . 50   
 1302. **L'élégant**. . . . . " 50   
 Feuilles marginées de blanc.
1305. **Emperor** (*Henderson*) . . . . . " 50
1306. **Hederæfolium variegatum**. . . . . " 50
1308. **Hastia** (*Bull*). . . . . " 50
1309. **Leda** (*Bull*) . . . . . " 50   
 Fleur d'un rose carné. pétales supérieurs striés de cramoisi violacé, centre incarnat.
1312. **König Albert flore pleno** (*Oscar Liebmann*) . . . . . I "   
 Fleur double, d'un rose violacé.
1314. **La fiancée** (*Lemoine*) . . . . . I "   
 Fleur bien double, lilas tendre rayé de pourpre.
1321. **Madem. Jeanne Wouters** (*Lemoine*) . . . . . I "   
 Fleur grande, bien double, d'un rose vif, pétales supérieurs fortement veinés de carmin.
1322. **Mont blanc** (*Lemoine*) . . . . . I "   
 Fleur double, d'un blanc veiné de pourpre pur.
1323. **Mad. Crousse** (*Crousse*) . . . . . I "   
 Grande fleur double, d'un incarnat transparent.
1324. **Gloire d'Orléans** (*Foucart*) . . . . . I "   
 Fleur très-double, d'un rouge framboisé violacé.
1326. **Comtesse Horace de Choiseul** (*Lemoine*) . . . . . I "   
 Fleur parfaite, double, d'un beau rose tendre satiné et nuancé de blanc vers l'extrémité des pétales.

- Fr. C.
1328. **Marguerite Jacquot** (*Crousse*) . . . . . I "   
 Fleur double, d'un rose tendre argenté, centre saumoné.
1330. **Mad. Jules Menoreau** (*Crousse*). . . . . I "   
 Fleur bien double, à grands pétales rose de Chine nuancé de rouge cerise clair.
1331. **Emile Lemoine** (*Lem.*) . . . . . I "   
 Plante d'un bon port et florifère, portant des ombelles grandes et bien fournies de fleurs pleines, larges, bien épanouies, d'une couleur capucine feu d'un éclat complètement inconnu dans les *P. lateripes*.
1332. **Boucharlat aîné** (*Roz. B.*) . . . . . I "   
 Ombelle aussi forte que celle d'un *Geranium zonale*, grandes fleurs très-doubles, rouge cerise vif flammé de feu.
1333. **Alphonse Faille** (*Cr.*) . . . . . I "   
 Grandes fleurs bien doubles cerise foncée carminé à reflets très-vifs et nuancé d'amarante; fortes ombelles; plante très-florifère.
1334. **M. Léon Claeys** (*V<sup>e</sup> H. D.*) . . . . . 2 "   
 Grandes fleurs doubles rouge lie de vin teinté de cerise amarante peu sarmenteux.
1335. **Eden Marchi** (*Marchi*) . . . . . 2 "   
 Grandes fleurs bien doubles incarnat nuancé de cerise clair, plante excessivement trapue.
1336. **Alice Crousse** (*Cr.*) . . . . . I "   
 Enormes fleurs bien doubles violet pourpré et amarante vif; très-florifère et de tout premier mérite.



## ESPÈCES DIVERSES DE PELARGONIUM.

On a grand tort de dédaigner les diverses espèces de *Pelargonium* ci-dessous énumérées, dont la plupart sont remarquables, sinon par leur inflorescence, du moins par l'étrangeté de leur feuillage, dont les formes découpées, laciniées, lacérées, dentelées, sont très-diversifiées et d'un grand charme.

	Fr. C.
1350. <i>Pelargonium ardens majus</i> . . . 2 "	
Grandes feuilles allongées, decoupées; fleur d'un cramoisi vif.	
1361. — <i>bicolor</i> . . . . . I "	
Feuilles ovales, dentelées.	
1352. — <i>echinatum</i> . . . . . I "	
Fleurs blanches, pétales supérieurs marqués de cramoisi vif.	
1353. — — <i>Rosy Morn</i> . . . . . I "	
1355. — — <i>Spotted Gem</i> . . . . . I "	
Bouquet de jolies fleurs d'un rose vif, maculé de carmin à la base de chaque pétale.	
Tous les <i>Pelargonium echinatum</i> ont leurs tiges garnies d'épines.	
1356. — <i>erectum</i> . . . . . I "	
1351. — <i>laciniatum</i> . . . . . I "	
Jolies feuilles profondément laciniées.	
1362. — <i>quercifolium minus</i> . . . . . I "	
Feuilles longues, découpées comme celles du Chêne; fleur rose, à pétales supérieurs maculés de pourpre.	

	Fr. C.
1363. <i>Pelargonium quinquevulnerum</i> . . . I "	
Feuilles hispides, à 5 segments divisés en fissures lancéolées, linéaires, dentées; ombelle de fleurs d'un pourpre brunâtre, plus pâle sur le bord des pétales.	
1364. — <i>ribesifolium foliis variegatis</i> . . . 50 "	
Feuilles ressemblant à celle du Groseiller, bordées de blanc crème.	
1359. — — <i>Lady Plymouth</i> . . . . . n 50 "	
Feuilles quinquelobées, bordées de blanc.	
1354. — <i>ssepiflorens</i> . . . . . I "	
Feuilles rondes, fortement dentelées; fleurs d'un rose carné.	
1366. — <i>ternatum</i> . . . . . I "	
Belles feuilles cucullées, scabres, à 5 segments cunéiformes, incisés-dentés au sommet, le moyen bifide; tube de la fleur d'un vert glauque, pétales supérieurs marqués de lignes sanguines.	

## PETUNIA A FLEURS DOUBLES.

Les *Petunia* ont le mérite d'orner, en été, aussi bien la serre froide que les parterres. Leurs fleurs sont charmantes et de nuances tranchées.

Pièce : 75 centimes. — Les douze : 8 francs.

## SALVIA.

Les *Sauges* ornementales produisent de fort belles fleurs, de coloris très-brillants et très tranchés, et qui font aussi bel effet en pleine terre l'été, qu'en orangerie.

Pièce : 50 centimes.

1. *Salvia Bethelii*.
2. — *acalixifolia* (FLORE, XXII, 99).  
Grappe rameuse de brillantes fleurs d'un bleu indigo foncé.
3. — — *albo-striata*.  
Fleur d'un vermillon carminé, strié de blanc à l'entrée de la gorge; feuilles très-grandes, d'un vert sombre.
5. — *ianthina* (FLORE, IX, 73).  
Grande fleur violette ombrée de bleuâtre.
6. — *involverata Deschampsiana*.
7. — *lantasefolia*.
8. — *leucantha* (FLORE, XXII, 39).  
Remarquable par ses fleurs dont la corolle est d'un blanc de neige, tandis que le calice est d'un violet de lavande duveté. Les feuilles sont laineuses et blanchâtres en dessous.

10. *Salvia patens* (FLORE, V, 503).  
Grande fleur du plus beau bleu d'outremer.
11. — — *flore albo*.  
Variété à grandes fleurs blanches.
12. — — *M. Issanchou*.  
Longs épis de fleurs d'un blanc pur; calice blanc largement et régulièrement rubané de rouge vif.
14. — — *Soucheti* (FLORE, XI, 163).  
Fleur d'un rouge minium étincelant.
16. — *tricolor* (FLORE, XII, 108).  
Fleur blanche, avec une macule carmin violacé au sommet de laèvre supérieure et une autre plus ample, d'un minium carminé, sur le labelle de l'inférieure.

## PLANTES POUR MASSIFS, CORBEILLES, BORDURES, ETC.

Cette liste ne contient que les plantes le plus fréquemment employées pour massifs, corbeilles ou bordures; la plupart sont cultivées en pots et livrables en mottes, depuis le 15 avril jusqu'à la fin de mai. Les prix ci-après ne sont pas applicables à des quantités moindres que celles indiquées.

	La douzaine.	Le cent.
	Fr. C.	Fr. C.
<i>Achyranthes acuminata</i> , <i>Lindeni</i> , <i>Verschaffelti</i> et <i>Wallisii</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Althernanthera amabilis</i> , <i>amena</i> , <i>latifolia</i> , <i>paronychioides</i> et <i>spatulata</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Antennaria candida</i> . . . . .	3 "	15 "
<i>Balsamine Camellia</i> , en beau mélange . . . . .	1 50	8 "
<i>Canna indica</i> ( <i>Batister d'Inde</i> ), en plusieurs variétés vertes. . . . .	5 "	20 "

	La douzaine.	Le cent.
	Fr. C.	Fr. C.
<i>Centaurea candidissima</i> . . . . .	5 "	30 "
<i>Cineraria maritima</i> , feuilles blanchâtres . . . . .	3 "	15 "
— <i>candidissima</i> . . . . .	3 "	15 "
<i>Coleus Nero</i> , variété à feuillage pourpre noirâtre, rustique . . . . .	4 "	25 "
— <i>Verschaffelti</i> . . . . .	4 "	25 "
— en plusieurs variétés . . . . .	4 "	25 "
<i>Dahlia alba nana</i> petites fleurs d'un blanc pur, pour corbeilles, en boutures . . . . .	8 "	50 "
— <i>Colibri</i> , petite fleur écarlate avec un petit bouton vert au centre . . . . .	8 "	50 "
— <i>Solfatare</i> , petites fleurs d'un jaune vif, pour corbeilles, en boutures . . . . .	8 "	50 "
<i>Fuchsia</i> , en plusieurs variétés à fleurs simples ou doubles . . . . .	5 "	40 "
<i>Geranium zonale</i> à fleurs simples ou doubles, en plusieurs variétés . . . . .	5 "	30 "
— — à feuillage panaché, en plusieurs variétés . . . . .	6 "	40 "
<i>Gnaphalium lanatum</i> . . . . .	3 "	15 "
— — <i>foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .	3 "	15 "
<i>Héliotropes</i> , bleu et blanc . . . . .	5 "	35 "
<i>Lantana</i> , en plusieurs variétés . . . . .	5 "	35 "
<i>Lobelia erinoides</i> <i>Crystal Palace</i> . . . . .	2 "	10 "
<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> variegatum, <i>Ficoïde</i> à feuilles panachées . . . . .	4 "	20 "
<i>Pensées Anglaises</i> var. <i>Odier</i> , belles plantes . . . . .	2 "	10 "
<i>Perilla nankinensis</i> , beau feuillage pourpre noirâtre métallique . . . . .	2 "	12 "
<i>Petunia</i> , variétés de semis en beau mélange . . . . .	2 "	10 "
<i>Phlox Drummondii</i> , variétés de semis en beau mélange . . . . .	1 50	8 "
<i>Pyrethrum partheniifolium</i> aureum ( <i>Golden Feather</i> ), feuillage jaune d'or, pour bordures; semis repiqués en terrines . . . . .	" "	2 "
<i>Reines-Marguerites</i> pyramidales <i>Truffaut</i> , variétés en beau mélange . . . . .	1 50	8 "
— — naines, en beau mélange . . . . .	1 50	8 "
<i>Ricinus</i> , en beau mélange . . . . .	3 "	" "
<i>Sedum</i> , en plusieurs variétés . . . . .	3 "	20 "
<i>Sempervivum</i> , en plusieurs variétés . . . . .	3 "	20 "
<i>Teleianthera versicolor</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Verbena hybrida</i> , variétés de semis en mélange, pour corbeilles . . . . .	5 "	35 "
<i>Viola cornuta</i> , grande <i>Violette</i> à fleurs bleues, pour bordures . . . . .	3 "	15 "
— — <i>alba</i> , grande <i>Violette</i> à fleurs blanches, pour bordures . . . . .	3 "	15 "
<i>Zinnia elegans</i> , variétés à fleurs doubles, en mélange . . . . .	1 50	8 "
<i>Zea foliis vittatis</i> , <i>Maïs</i> ornemental à feuilles bien rubanées de blanc . . . . .	2 "	10 "

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Abelia</i> . . . . .	115	<i>Agapanthus</i> . . . . .	115	<i>Anamirta</i> . . . . .	111
<i>Abutilon</i> . . . . .	81 et 115	<i>Agave</i> . . . . .	116	<i>Ananassa</i> . . . . .	96
<i>Acacia</i> . . . . .	111 et 115	<i>Ageratum</i> . . . . .	116	<i>Anchietea</i> . . . . .	111
<i>Acalypha</i> . . . . .	81	<i>Aglaonema</i> . . . . .	90	<i>Andromeda</i> . . . . .	116
<i>Acampe</i> . . . . .	101	<i>Agnostus</i> . . . . .	116	<i>Anemia</i> . . . . .	98
<i>Acanthophaenix</i> . . . . .	107	<i>Albizzia</i> . . . . .	111	<i>Anemopaegma</i> . . . . .	111
<i>Acanthorrhiza</i> . . . . .	107	<i>Alibertia</i> . . . . .	111	<i>Angiopteris</i> . . . . .	98
<i>Achyranthes</i> . . . . .	81	<i>Allamanda</i> . . . . .	82	<i>Angræcum</i> . . . . .	102
<i>Acineta</i> . . . . .	101	<i>Alloplectus</i> . . . . .	100	<i>Anguloa</i> . . . . .	102
<i>Acrocomia</i> . . . . .	107	<i>Alocasia</i> . . . . .	90	<i>Anigosanthus</i> . . . . .	116
<i>Acropera</i> . . . . .	101	<i>Aloe</i> . . . . .	116	<i>Anæctochilus</i> . . . . .	102
<i>Acrophorus</i> . . . . .	98	<i>Alpinia</i> . . . . .	110	<i>Anomatheca</i> . . . . .	111
<i>Acrostichum</i> . . . . .	98	<i>Alsophila</i> . . . . .	98	<i>Anona</i> . . . . .	111
<i>Ada</i> . . . . .	101	<i>Alternanthera</i> . . . . .	82	<i>Anoplophytum</i> . . . . .	96
<i>Adamia</i> . . . . .	82	<i>Amaryllidées</i> . . . . .	89	<i>Anopterus</i> . . . . .	116
<i>Adelaster</i> . . . . .	82	<i>Amaryllis</i> . . . . .	89	<i>Anthericum</i> . . . . .	116
<i>Adenandra</i> . . . . .	115	<i>Amasonia</i> . . . . .	82	<i>Anthurium</i> . . . . .	90
<i>Adiantum</i> . . . . .	98	<i>Amomum</i> . . . . .	110	<i>Antiaris</i> . . . . .	112
<i>Æchmea</i> . . . . .	96	<i>Amorphophallus</i> . . . . .	90	<i>Antigonon</i> . . . . .	82
<i>Aerides</i> . . . . .	101	<i>Ampelopsis</i> . . . . .	116	<i>Antigramma</i> . . . . .	99
<i>Æschynanthus</i> . . . . .	98	<i>Amphicome</i> . . . . .	116	<i>Aotus</i> . . . . .	116



	Pages.		Pages.		Pages.
Aphelandra . . . . .	82	Bois-joli, voir Daphne . . . . .	118	Cereus . . . . .	124
Apodytes . . . . .	82	Bombax . . . . .	112	Ceropegia . . . . .	83
Aponogeton . . . . .	116	Bonsapartea . . . . .	117	Ceroxylon . . . . .	107
Aralia . . . . .	82, 112 et 116	Boronia . . . . .	117	Cestrum . . . . .	83 et 117
Araucaria . . . . .	116	Bougainvillea . . . . .	83	Chamædorea . . . . .	107
— à rain, voir Artocar-		Bouvardia . . . . .	117	Chamærops . . . . .	107
pus . . . . .	82 et 112	Brachysema . . . . .	117	Chavica . . . . .	112
— aux parasols, voir Coc-		Brahea . . . . .	107	Cheilanthes . . . . .	99
coloba . . . . .	83 et 112	Brassavola . . . . .	102	Chevalliera . . . . .	96
— à soie, voir Bombax . . . . .	112	Brassia . . . . .	102	Chlorocodon . . . . .	112
— du voyageur, voir Ra-		Bromelia . . . . .	96 et 117	Choisya . . . . .	117
venala . . . . .	111 et 114	Bromeliacées . . . . .	96	Chorizema . . . . .	118
Ardisia . . . . .	82	Brownea . . . . .	83	Chrysanthèmes . . . . .	126
Areca . . . . .	107	Brugmansia . . . . .	117	Chrysophyllum . . . . .	112
Arenga . . . . .	107 et 112	Bucklandia . . . . .	112	Chysis . . . . .	102
Ariopsis . . . . .	91	Buphane . . . . .	89	Cibotium . . . . .	99
Arisæma . . . . .	91	Burbridgea . . . . .	110	Cienkowskia . . . . .	110
Aristolochia . . . . .	82 et 116	Buxus . . . . .	117	Cinchona . . . . .	112
Aroïdées . . . . .	99	Cacotier, voir Theobroma . . . . .	115	Cineraria . . . . .	117
Arpophyllum . . . . .	102	Cactées . . . . .	124	Cinnamomum . . . . .	112 et 117
Arrabidaea . . . . .	82	(Cæ)lpinia . . . . .	118	Cissus . . . . .	83
Artabotrys . . . . .	112	Cafier, voir Coffea . . . . .	112	Citronnier, voir Citrus . . . . .	118
Artocarpus . . . . .	82 et 112	Caladium . . . . .	91	Citrosma . . . . .	112
Arundo . . . . .	116	Calamus . . . . .	107	Citrus . . . . .	118
Asparagus . . . . .	82	Calanthe . . . . .	102	Clausena . . . . .	112
Aspidistra . . . . .	82	Calceolaires herbacées . . . . .	117	Clematis . . . . .	118
Aspidium . . . . .	99	Calceolaria . . . . .	117	Clerodendron . . . . .	83
Asplenium . . . . .	99	Calebassier, voir Crescentia . . . . .	113	Clethra . . . . .	118
Astelia . . . . .	116	Calla, voir Richardia . . . . .	93 et 123	Cleyera . . . . .	118
Astelma . . . . .	117	Callipsyche . . . . .	89	Clianthus . . . . .	118
Astrapæa . . . . .	82	Calonyction . . . . .	83	Cobæa . . . . .	118
Astrocaryum . . . . .	107	Calophyllum . . . . .	112	Coburgia . . . . .	89
Ataccia . . . . .	82 et 112	Calypttrion . . . . .	83	Coca, voir Erythroxylon . . . . .	118
Athyrium . . . . .	99	Camellia . . . . .	126	Coccoloba . . . . .	83 et 112
Attalea . . . . .	107	Camphrier, voir Laurus		Cocculus . . . . .	112
Attrape-mouche, voir Dio-		camphora . . . . .	121	Cochliostema . . . . .	84
næa . . . . .	82 et 110	Campomanesia . . . . .	112	Cocos . . . . .	108 et 112
Avocatier, voir Persea . . . . .	111	Campsidium . . . . .	83	Codiaeum, voir Croton . . . . .	84
Azalea indica . . . . .	124	Camptopus . . . . .	83	Cœlia . . . . .	102
Balanium . . . . .	99	Camptosema . . . . .	117	Cœlogyne . . . . .	102
Balister, voir Canna . . . . .	126	Campylobotrys, voir Hig-		Coffea . . . . .	112
Bambusa . . . . .	82 et 117	ginsia . . . . .	86	Colax . . . . .	102
Bananier, voir Musa . . . . .	114	Campyloneuron . . . . .	99	Colea . . . . .	84
Banksia . . . . .	117	Canna . . . . .	126	Coleus . . . . .	127
Barbacenia . . . . .	82	Cannelier, voir Cinnamo-		Colletia . . . . .	118
Barringtonia . . . . .	112	mum . . . . .	112 et 118	Colocasia . . . . .	92 et 113
Bassia . . . . .	112	Cantua . . . . .	117	Columnea . . . . .	100
Battemania . . . . .	102	Caoutchouc (Arbre à), voir		Combretum . . . . .	84
Baumier du Pérou, voir		Ficus elastica . . . . .	85, 113 et 120	Comparettia . . . . .	102
Myroxylon . . . . .	114	Capucine, voir tropæolum . . . . .	124	Convolvulus . . . . .	118
Beaucarnea . . . . .	117	Caraguata . . . . .	96	Cookia . . . . .	113
Beaumontia . . . . .	112	Carapa . . . . .	112	Coprosma . . . . .	118
Begonia discolor Rex . . . . .	95	Cardwellia . . . . .	117	Coronilla . . . . .	118
— herbacée . . . . .	95	Carrissa . . . . .	112	Correa . . . . .	118
— semi-vigneux . . . . .	95	Carludovica . . . . .	83, 107 et 112	Coryanthelium . . . . .	84
— tubereux . . . . .	93 et 94	Caryota . . . . .	107 et 112	Corynocarpus . . . . .	118
Benthamia . . . . .	112 et 117	Cassia . . . . .	112 et 117	Corynostylis . . . . .	84
Berberidopsis . . . . .	117	Castanospermum . . . . .	83	Corypha . . . . .	108
Berberis . . . . .	117	Cattleya . . . . .	102	Cosbæa . . . . .	118
Bertholletia . . . . .	112	Cavanillea . . . . .	112	Costus . . . . .	110
Bertolonia . . . . .	82	Centaurea . . . . .	117	Cotyledon . . . . .	118
Beschorneria . . . . .	117	Centradenia . . . . .	83	Crassula . . . . .	118
Bignonia . . . . .	83 et 117	Centropogon . . . . .	83	Cratæva . . . . .	113
Billbergia . . . . .	96	Centrosolenia . . . . .	83 et 100	Crescentia . . . . .	84 et 113
Bixa . . . . .	112	Cephalis . . . . .	112	Crinum . . . . .	89
Blechnum . . . . .	99	Cephalotus . . . . .	83 et 110	Crossandra . . . . .	84
Bletia . . . . .	102	Cerantonia . . . . .	112 et 117	Croton . . . . .	84 et 113
Blighia . . . . .	112	Ceratopetalum . . . . .	117	Crowea . . . . .	118
Boehmeria . . . . .	112	Cerbera . . . . .	112	Cryptanthus . . . . .	96

	Pages.		Pages.		Pages.
Cryptophragmium . . . . .	84	Elisena . . . . .	89	Griffinia . . . . .	89
Cupania . . . . .	113	Embothrium . . . . .	119	Guarea . . . . .	86
Cuphea . . . . .	118	Encholirion . . . . .	96	Guayacum . . . . .	113
Curculigo . . . . .	84	Epacris . . . . .	119	Guilandina . . . . .	113
Curcuma . . . . .	110	Epidendrum . . . . .	103	Gustavia . . . . .	86
Curmeria . . . . .	92	Epiphyllum . . . . .	85	Guzmannia . . . . .	96
Cyanophyllum . . . . .	84	Epipremnum . . . . .	92	Gymnogramma . . . . .	99
Cyathea . . . . .	99	Episcia . . . . .	101	Gynocardia . . . . .	113
Cycadées . . . . .	97	Eranthemum . . . . .	85	Hakea . . . . .	120
Cycas . . . . .	97	Eria . . . . .	103	Hæmatoxylon . . . . .	113
Cyclamen . . . . .	118	Erica du Cap . . . . .	119	Hæmanthus . . . . .	89
Cymbidium . . . . .	102	Eriobothrya . . . . .	113 et 119	Hardenbergia . . . . .	120
Cyperus . . . . .	84 et 113	Eriocaema . . . . .	85	Haworthia . . . . .	120
Cyphomandra . . . . .	84	Eriostemon . . . . .	119	Hebeclinium . . . . .	86
Cypripedium . . . . .	102	Erythrina . . . . .	113 et 119	Hechtia . . . . .	96
Cyrtandracees . . . . .	98	Erythroxyton . . . . .	113	Hedychium . . . . .	110
Cyrtanthanthera . . . . .	84	Escallonia . . . . .	119	Hedysarum . . . . .	86
Cyrtoceras . . . . .	84	Eucalyptus . . . . .	119	Helichrysium . . . . .	120
Cyrtodeira . . . . .	100	Eucharis . . . . .	89	Heliconia . . . . .	110
Cyrtopodium . . . . .	103	Eugenia . . . . .	85, 113 et 119	Heliotropes . . . . .	134
Cyrtosiphonia . . . . .	84 et 113	Eulalia . . . . .	119	Hemitelia . . . . .	99
Cytisus . . . . .	118	Eupatorium . . . . .	119	Heritiera . . . . .	113
Dahlia . . . . .	128	Euphorbia . . . . .	85 et 125	Hexacentris . . . . .	86
Dalechampia . . . . .	84	Eupodium . . . . .	99	Hibbertia . . . . .	120
Dammara . . . . .	118	Eurya . . . . .	119	Hibiscus . . . . .	86
Daphne . . . . .	118	Eurybya . . . . .	120	Higginsia . . . . .	86
Darlingtonia . . . . .	110	Eurycles . . . . .	89	Himantophyllum . . . . .	89
Dasylirion . . . . .	119	Eutaxia . . . . .	120	Hippobromus . . . . .	113
Datura, voir Brugmansia . . . . .	117	Euterpe . . . . .	108 et 113	Hippomane . . . . .	113
Davallia . . . . .	99	Fagelia . . . . .	120	Hoplophyton . . . . .	96
Dendrobium . . . . .	103	Fagtea . . . . .	85	Houlletia . . . . .	104
Dendrochilum . . . . .	103	Ferdinanda . . . . .	85	Hoya . . . . .	86
Desfontainia . . . . .	119	Ficoides, voir Mesembryan-		Hymenocallis . . . . .	90 et 120
Dianella . . . . .	119	temum . . . . .	121	Hymenodium . . . . .	99
Dianthus . . . . .	132	Ficus . . . . .	85, 113 et 120	Hyphorbe . . . . .	108
Dichorisandra . . . . .	85	Filices . . . . .	98 à 100	Illicium . . . . .	113 et 120
Dicksonia . . . . .	99	Fittonia . . . . .	86	Impatiens . . . . .	86
Didymocarpus . . . . .	98	Fitz-Roya . . . . .	120	Ioichroma . . . . .	120
Dieffenbachia . . . . .	92	Fougères . . . . .	98	Ionopsis . . . . .	104
Dietes . . . . .	119	Fourcroya . . . . .	86	Ipomœa . . . . .	86
Dillenia . . . . .	113	Franciscea . . . . .	86	Iresine, voir Achyranthes . . . . .	81
Dillwynia . . . . .	119	Fuchsia . . . . .	153	Ixora . . . . .	86
Dionœa . . . . .	85 et 110	Galeandra . . . . .	104	Jacaranda . . . . .	86
Dioscorea . . . . .	85	Galipea . . . . .	113	Jambosa . . . . .	113
Diosma . . . . .	119	Garcinia . . . . .	113	Jasmin du Chili, voir Man-	
Diplazium . . . . .	99	Gardenia . . . . .	86	devillea . . . . .	121
Diplotenium . . . . .	108	Garrya . . . . .	120	Jasminum . . . . .	86 et 120
Dipterix . . . . .	113	Gasteria . . . . .	120	Jonesia . . . . .	113
Disa . . . . .	103	Gelsemium . . . . .	113 et 120	Jovellana . . . . .	120
Dischidia . . . . .	113	Genetyllia . . . . .	120	Jubœa . . . . .	108
Doodia . . . . .	99	Genipa . . . . .	113	Juncus . . . . .	120
Dorstenia . . . . .	113	Geonoma . . . . .	108	Kadsura . . . . .	120
Doryanthes . . . . .	89	Geranium zonale, dits Scar-		Kæmpferia . . . . .	111
Doryopteris . . . . .	99	let . . . . .	135	Karatas . . . . .	96
Dourian, voir Durio . . . . .	113	— — doubles . . . . .	137	Kennedya . . . . .	120
Dracæna . . . . .	85, 113 et 119	— — à feuilles panachées . . . . .	139	Kentia . . . . .	108
Drymonia . . . . .	101	Gesneria . . . . .	101	Kleinia . . . . .	120
Drimys . . . . .	119	Gesnériacées . . . . .	100	Kopsia . . . . .	113
Drosera . . . . .	110	Gleichenia . . . . .	99	Lachenalia . . . . .	120
Durio . . . . .	113	Globba . . . . .	110	Lælia . . . . .	104
Dyckia . . . . .	119	Gloriosa . . . . .	101	Landolphia . . . . .	114
Echeveria . . . . .	119	Gloxinia . . . . .	101	Lantana . . . . .	134
Echinocactus . . . . .	125	Gnaphalium . . . . .	120	Lapageria . . . . .	120
Echinocereus . . . . .	125	Gnetum . . . . .	113	Lasiandra, voir Pleroma . . . . .	121
Echinopsis . . . . .	125	Gongora . . . . .	101	Lastrea . . . . .	99
Echinostachys . . . . .	96	Graptophyllum . . . . .	86	Latania . . . . .	108
Elæagnus . . . . .	119	Grenadier, v. punica . . . . .	118 et 123	Laurier-Rose, voir Nerium . . . . .	126
Elæis . . . . .	108	Grevillea . . . . .	120	Laurier-Tin, voir Viburnum . . . . .	124
Elæococca . . . . .	113	Greya . . . . .	86 et 120	Laurus . . . . .	114 et 121



Pages.	Pages.	Pages.
Lavatera . . . . . 121	Myrtus . . . . . 114 et 121	Phyllotaenium . . . . . 92
Leea . . . . . 87	Nandina . . . . . 121	Phymatodes . . . . . 99
Leptospermum . . . . . 121	Napoleona . . . . . 87	Physianthus . . . . . 122
Leptotes . . . . . 104	Nepenthes . . . . . 87 et 110	Physocalyx . . . . . 114
Libertia . . . . . 121	Nephelaphyllum . . . . . 105	Pilea . . . . . 87
Libonia . . . . . 121	Nephrodium . . . . . 99	Pilocarpus . . . . . 114
Licuala . . . . . 108	Nephrolepis . . . . . 99	Pilocereus . . . . . 125
Ligularia . . . . . 121	Nerium . . . . . 121	Pimelea . . . . . 122
Ligustrum . . . . . 121	Nertera . . . . . 122	Pinanga . . . . . 108
<i>Liliacées</i> . . . . . 101	Nidularium . . . . . 96	Pincenectitia, voir Beau-
Limatodes . . . . . 104	Nierembergia . . . . . 122	carnea . . . . . 117
Lindenia . . . . . 87	Nipholobus . . . . . 99	Piper . . . . . 87 et 114
Lissochilus . . . . . 104	Ochna . . . . . 122	Pisonia . . . . . 88
Lithospermum . . . . . 121	Odontoglossum . . . . . 105	Pistia . . . . . 92
Litobrochia . . . . . 99	<i>Billets flamands</i> . . . . . 133	Pitcairnia . . . . . 96
Livistona . . . . . 108	— <i>remontants</i> . . . . . 133	Pittosporum . . . . . 22
Lobelia . . . . . 121	<i>Oleandra</i> , voir Nerium . . . . . 121	Plagiolirion . . . . . 90
Locheria . . . . . 101	Oleobachia . . . . . 122	<i>Plantes carnivores voir Sa-</i>
Lomaria . . . . . 99	Oncidium . . . . . 105	<i>raceniés etc.</i> . . . . . 110
Lomatia . . . . . 121	Oncosperma . . . . . 108	— <i>pour massifs, corbeil-</i>
Lophospermum . . . . . 121	Onychium . . . . . 99	<i>les bordures, etc.</i> . . . . . 141
Lycaste . . . . . 104	Ophiopogon . . . . . 122	<i>Plantes utiles, officinales, etc.</i> . . . . . 111
Macadamia . . . . . 121	Oplismenus . . . . . 87	Platonia . . . . . 114
Machærium . . . . . 114	Opuntia . . . . . 125	Platycerium . . . . . 100
Mackaya . . . . . 87	<i>Oranger</i> , voir Citrus . . . . . 118	Plectocomia . . . . . 108
Macrozamia . . . . . 97	<i>Orchidées exotiques</i> . . . . . 101	Plectranthus . . . . . 88 et 114
Magnolia . . . . . 87 et 121	Oreodoxa . . . . . 108	Pleione . . . . . 106
Mahonia . . . . . 121	Oreopanax . . . . . 122	Pleroma . . . . . 122
Malacocarpus . . . . . 125	Ormosia . . . . . 87	Plumbago . . . . . 88
Mamillaria . . . . . 125	Otacanthus . . . . . 87	Podocarpus . . . . . 122
Mandevillea . . . . . 121	Oxalis . . . . . 122	Pogostemon . . . . . 114
<i>Mangostan</i> , voir Garcinia . . . . . 113	Pachyphytum . . . . . 122	Poinsettia . . . . . 88
Mantisia, voir Globba . . . . . 110	<i>Palmiers</i> . . . . . 107	<i>Poirier</i> , voir Piper . . . . . 87 et 114
Maranta . . . . . 111 et 114	Pancratium . . . . . 90	Polianthes . . . . . 122
Marattia . . . . . 99	<i>Pandanes</i> . . . . . 109	Polygala . . . . . 122
Marica . . . . . 121	Pandanus . . . . . 109 et 114	Polymnia . . . . . 88
Martinezia . . . . . 108	<i>Passiflores</i> . . . . . 109	Polypodium . . . . . 100
Masdevallia . . . . . 104	Passiflora . . . . . 109, 114 et 122	Pontederia . . . . . 88
Maxillaria . . . . . 105	<i>Patchouli</i> , voir Pogostemon . . . . . 114	Porphyrocoma . . . . . 88
Medinilla . . . . . 87	Paullinia . . . . . 87 et 114	Portea . . . . . 96
Memecylon . . . . . 114	Pavetta . . . . . 87	Pothos . . . . . 93
Mesembryanthemum . . . . . 121	Pavonia . . . . . 87	Pourretia . . . . . 96
Mesospindium . . . . . 105	Pearcea . . . . . 102	Primula . . . . . 22
Methonica, voir Gloriosa . . . . . 101	Pelargonium à grandes	Pritchardia . . . . . 108
Metrosideros . . . . . 121	<i>fleurs</i> . . . . . 140	Promenæa . . . . . 106
Meyenia . . . . . 87	— <i>à feuilles de Lierre</i>	Prostanthera . . . . . 122
Micrococos . . . . . 108	(lateripes, peltatum) . . . . . 140	Psychotria . . . . . 88
Microlepis . . . . . 99	Pelargonium espèces . . . . . 141	Pteridophyllum . . . . . 88
Microstylis . . . . . 105	Pellionia . . . . . 87	Pteris . . . . . 100
Mikania . . . . . 87	Peperomia . . . . . 87	Ptychosperma . . . . . 108
Miltonia . . . . . 105	Pepinia . . . . . 96	Pultenæa . . . . . 123
Mitraria . . . . . 121	Persea . . . . . 111	Punica . . . . . 114 et 123
Monnina . . . . . 121	Pescatorea . . . . . 106	Puya . . . . . 96
Monochaetum . . . . . 87 et 121	Petræa . . . . . 87	Pyrethrum . . . . . 123
Monodora . . . . . 114	Petunia . . . . . 141	Quercus . . . . . 123
Monstera . . . . . 92	Phajus . . . . . 106	Quesnelia . . . . . 96
Moræa . . . . . 121	Phalænopsis . . . . . 106	Quillaia . . . . . 123
Morenia . . . . . 108	Philesia . . . . . 122	<i>Quinquina</i> , voir Cinchona . . . . . 115
Morinda . . . . . 114	Philodendron . . . . . 92	Quivisia . . . . . 114
Mormodes . . . . . 105	Phœnicophorium . . . . . 108	Raphiolepis . . . . . 125
Moussonia . . . . . 101	Phoenix . . . . . 108	Ravenala . . . . . 111 et 114
Murraya . . . . . 114	Pholidophyllum . . . . . 96	Ravenea . . . . . 108
Musa . . . . . 111 et 114	Phormium . . . . . 104 et 122	Reidia . . . . . 88
<i>Muscadier</i> , voir Myristica . . . . . 114	Phrynium . . . . . 111	Rhapis . . . . . 109
Myoporum . . . . . 121	Phycella . . . . . 122	Rhipidodendron . . . . . 123
Myristica . . . . . 114	Phygellus . . . . . 122	Rhodea . . . . . 123
Myroxylon . . . . . 114	Phylca . . . . . 122	Rhopala . . . . . 88
Myrrhinium . . . . . 114	Phyllagathis . . . . . 87	Rhynchosia . . . . . 88
	Phyllocactus . . . . . 125	Rhynchospermum . . . . . 123

	Pages.		Pages.		Pages.
Richardia . . . . .	93 et 123	Sonerilla . . . . .	88	Tillandsia . . . . .	97
Rochea . . . . .	123	Sophronitis . . . . .	106	Todea . . . . .	100
<i>Roucou</i> , voir <i>Bixa</i> . . . . .	114	Sparmania . . . . .	123	<i>Tonka (Fève de)</i> , voir <i>Dip-</i>	
Rœzlia . . . . .	123	<i>Spécialité de serre chaude</i>		<i>terix</i> . . . . .	113
Rogiera . . . . .	88	<i>et tempérée</i> . . . . .	89	Torenia . . . . .	88
Rondeletia . . . . .	123	— — <i>froide</i> . . . . .	124	Tornelia, voir <i>Monstera</i> . . . . .	92
Ronnbergia . . . . .	97	Sphærogyne . . . . .	88	Torreya . . . . .	124
Rubus . . . . .	123	Spiranthes . . . . .	123	Toxicophlæa . . . . .	88
Rudgea . . . . .	88	Stadmannia . . . . .	114	Trachycarpus, voir <i>Cha-</i>	
Ruellia . . . . .	88	Stanhopea . . . . .	112	<i>mærops</i> . . . . .	107
Russelia . . . . .	88	Stauntonia . . . . .	123	Tradescantia . . . . .	88
Sabal . . . . .	109	Stenocarpus . . . . .	123	Tremandra . . . . .	124
Saccharum . . . . .	114	Stenomesson . . . . .	90	Trichomanes . . . . .	100
Saccolabium . . . . .	106	Sterculia . . . . .	114	Trichopilia . . . . .	106
Salvadora . . . . .	114	Stephanotis . . . . .	88	Trichosma . . . . .	106
Salvia . . . . .	141	Stereocentrum . . . . .	88	Tropæolum . . . . .	124
Salchezia . . . . .	88	Steudnera . . . . .	93	<i>Tubéreuse</i> , voir <i>Polianthes</i> . . . . .	122
Sansevieria . . . . .	88	Stevensonia . . . . .	108	<i>Upas</i> , voir <i>Antiaris</i> . . . . .	122
Sapindus . . . . .	114	Stravadium . . . . .	115	Uropedium . . . . .	106
Sapota . . . . .	114	Strelitzia . . . . .	111	Urostigma . . . . .	115
Sarcopodium . . . . .	106	Streptocalix . . . . .	97	Urvillea . . . . .	115
Sarracenia . . . . .	110	Streptocarpus . . . . .	98	Utricularia . . . . .	107
<i>Saracénies</i> . . . . .	110	Stromanthe . . . . .	115	Vaccinium . . . . .	124
<i>Sauvages ornementales</i> , voir		Swainsonia . . . . .	123	Vallota . . . . .	90
Salvia . . . . .	141	Swietenia . . . . .	115	Vanda . . . . .	107
Saxifraga . . . . .	123	Tabernæmontana . . . . .	88	Vanguiera . . . . .	115
Schismatoglottis . . . . .	93	Tacsonia . . . . .	123	Vanilla . . . . .	107 et 115
Schomburgkia . . . . .	106	Tamarindus . . . . .	115	Veitchia . . . . .	109
<i>Scitaminées</i> . . . . .	110	Tamus, voir <i>Testudinaria</i> . . . . .	126	Veronica . . . . .	124
Scutellaria . . . . .	88 et 123	Tapeinotes . . . . .	101	Verschaffeltia . . . . .	109
Scuticaria . . . . .	106	Tecoma . . . . .	123	Viburnum . . . . .	124
Seafortia . . . . .	109	<i>Télégraphe (Plante)</i> , voir		Victoria . . . . .	88
Sedum . . . . .	123	Hedysarum . . . . .	86	Vriesea . . . . .	97
Selaginella . . . . .	100	Teleianthera . . . . .	88	Wallichia . . . . .	109
Selenipedium . . . . .	106	Terminalia . . . . .	115	Warrea . . . . .	107
Selliguea . . . . .	100	Testudinaria . . . . .	124	Warszewiczella . . . . .	107
Sempervivum . . . . .	123	Tetrapanax . . . . .	115	Washingtonia . . . . .	109
Senecio . . . . .	123	Thamnopteris . . . . .	100	Witsenia . . . . .	124
<i>Serre chaude et tempérée</i>	81	<i>Thé</i> , voir <i>Thea</i> . . . . .	115 et 124	Woodwardia . . . . .	100
— <i>froide</i> . . . . .	115	Thea . . . . .	115 et 124	Xanthochymus . . . . .	115
Sideroxylon . . . . .	114	Theobroma . . . . .	115	Xanthosoma . . . . .	93
Simaraba . . . . .	114	Theophrasta . . . . .	88	Xylobium . . . . .	107
Skimmia . . . . .	123	Thibaudia . . . . .	124	Yucca . . . . .	124
Smilax . . . . .	114	Thrinax . . . . .	109	Zamia . . . . .	97
Sobralia . . . . .	106	Thunbergia . . . . .	88	Zygopetalum . . . . .	107
Solanum . . . . .	123	Thunia . . . . .	106		
Sollya . . . . .	123	Thyrsacanthus . . . . .	88		




## TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un quart de siècle, ces appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prôtons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 80 centimètres de hauteur, sur 50 centimètres de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune garçon de quinze ans,

peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.



Ce tonneau locomobile est solidement construit et parfaitement conditionné ; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — L'Établissement en vend chaque année une centaine, preuve que leur utilité est bien reconnue.

PRIX : 75 francs, port non compris.

## TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère de toute première qualité, entièrement neuve, aux prix de 115 francs les 100 hectolitres et de 1-50 l'hectolitre, emballage non compris ; port à la charge de l'acheteur.

## OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

### RAPHIA.

La meilleure des ligatures pour palissages et tous usages horticoles. — *Le kilogr.* : 3 fr.

## PANIER A ORCHIDÉES.

Ces paniers sont solidement confectionnés en sapin rouge de Riga ; les dimensions ci-dessous sont prises à l'intérieur.

### Paniers carrés.

N° 1.	— 10 cent.	de côté,	7 cent.	de profondeur,	la pièce . . .	40 cent.
" 2.	— 12	—	8	—	— . . .	45 "
" 3.	— 15	—	9	—	— . . .	65 "
" 4.	— 17	—	10	—	— . . .	75 "

### Paniers ronds (en cône tronqué).

La hauteur de ces paniers est égale au plus grand diamètre.

N° 1.	— 13 centimètres,	la pièce . . .	40 cent.
" 2.	— 16	— . . .	45 "
" 3.	— 18	— . . .	65 "
" 4.	— 20	— . . .	75 "



# FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

## ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE,

Vingt-trois volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment près de 2500 planches supérieurement coloriées au pinceau, 2000 planches noires et vignettes, et environ 4900 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-trois volumes est de 812 francs, payables au comptant, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement, qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 23 volumes aux conditions suivantes : 272 francs payables au comptant, 270 francs à un an et les 270 francs pour solde à deux ans de terme.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII peuvent s'acquérir *séparément* au prix de :

Belgique : 36 francs. — Union Postale : 38 francs.

Pour les autres Pays, — le port en plus.

L'Etablissement se charge de toute espèce de reliure, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'exposition internationale de la Société royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — A la 10<sup>me</sup> exposition internationale de Gand, le 31 Mars 1878, la FLORE a obtenu le **premier prix**, distinction qui lui avait également été accordée à **toutes** les expositions antérieures. — Pareil honneur lui est échu aux expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, Saint-Nicolas, Vienne, etc.



dresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,

Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge,

à GAND (Belgique).

Correspondant de la Flore pour la France : M. A. GHIO, libraire-éditeur,  
Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à PARIS.

En vente à l'établissement de L. VAN HOUTTE :

## DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,

Publié par feu **André LEROY**, pépiniériste à Angers,

Avec la collaboration de M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Cet important ouvrage, le fruit de dix-sept années de travail, offre la description, la figure et l'histoire de 1755 variétés fruitières et de 7,000 synonymes; il comprend :

1<sup>o</sup> Les **Poires**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 615 et 776 pages

2<sup>o</sup> Les **Pommes**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 444 et 436 pages.

3<sup>o</sup> Les **Fruits à noyaux**, 1<sup>re</sup> partie: **Abricots et Cerises**, 1 vol. grand in-8<sup>o</sup>, de 400 pages.

4<sup>o</sup> — — 2<sup>me</sup> partie: **Pêches**, 1 volume grand in-8<sup>o</sup>, de 350 pages.

**PRIX** : 30 francs les 6 volumes grand in-8<sup>o</sup>, 3,000 pages, port non compris.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)